


Viruela Símica



cresi   



LA VIRUELA SÍMICA ES UNA ENFERMEDAD VIRAL CONTAGIOSA, CAUSADA POR EL VIRUS DE LA VIRUELA SÍMICA, QUE SE TRANSMITE DE ANIMALES A HUMANOS Y TAMBIÉN DE UNA PERSONA A OTRA POR CONTACTO CON LA ERUPCIÓN O LESIONES QUE SE PRODUCEN EN LA PIEL DE LA PERSONA ENFERMA, LOS LÍQUIDOS CORPORALES (COMO LA SALIVA, Y EL LÍQUIDO, PUS O SANGRE DE LESIONES CUTÁNEAS), Y LAS COSTRAS QUE SE FORMAN LUEGO.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Puede transmitir de humano a humano durante el contacto íntimo, incluyendo: Relaciones sexuales orales, anales y vaginales. Tocar los genitales o el ano de una persona infectada. Abrazos, besos, caricias y masajes. Contacto cara a cara. Tocar telas u objetos durante la relación sexual que fueron utilizados por una persona con la viruela símica como ropa de cama, toallas y juguetes sexuales. El período de incubación de la viruela del simio suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.



cresi   



SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN

Los síntomas frecuentes son: Lesiones en la piel, que pasan por distintos estadios hasta formar una costra que luego se cae. Fiebre. Dolor de cabeza, muscular o de espalda. Inflamación de ganglios. Cansancio. Ante la aparición de síntomas es necesario aislarse para evitar el contacto con otras personas, y realizar una consulta médica rápida. La principal medida de prevención es evitar el contacto cercano con personas que hayan confirmado tener la infección o con personas que tengan síntomas compatibles.

**HACER CONTROL
MÉDICO**