

Soluzioni del compito 00049

1) Sia

$$F(t) = \int_{-8}^t [7e^{3|x|} + \sin(6x)] dx.$$

1A) La funzione $F(t)$ non è derivabile per qualche t in \mathbb{R} .

Falso: Dato che la funzione $f(x) = 7e^{3|x|} - \sin(6x)$ è continua su \mathbb{R} , per il teorema fondamentale del calcolo integrale la funzione $F(t)$ è derivabile per ogni t in \mathbb{R} , e si ha $F'(t) = f(t)$ per ogni t .

1B) Si ha $F(-8) = 0$.

Vero: Si ha

$$F(-8) = \int_{-8}^{-8} [7e^{3|x|} + \sin(6x)] dx = 0,$$

dato che gli estremi di integrazione coincidono.

1C) La funzione $F(t)$ è strettamente crescente su \mathbb{R} .

Vero: Si ha

$$F'(t) = 7e^{3|t|} + \sin(6t) \geq 7 \cdot 1 - 1 = 6 > 0,$$

dato che $e^{3|t|} \geq 1$ e che $\sin(6t) \geq -1$. Dato che la derivata di $F(t)$ è strettamente positiva per ogni t , $F(t)$ è strettamente crescente su \mathbb{R} .

1D) Si ha $F(-14) < 0$.

Vero: Ricordando (si veda l'esercizio **1C**) che la funzione $F(t)$ è strettamente crescente, e che $F(-8) = 0$ (si veda l'esercizio **1B**), si ha

$$F(-14) < F(-8) = 0.$$

2) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

2A)

$$\int_0^1 (12x^3 - 6x^2 - 6x + 2) dx \neq 0.$$

Falso: Si ha

$$\int_0^1 (12x^3 - 6x^2 - 6x + 2) dx = (3x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x) \Big|_0^1 = 3 - 2 - 3 + 2 = 0.$$

2B)

$$\int_0^\pi x \cos(12x) dx = 0.$$

Vero: Si ha, integrando per parti (derivando x e integrando $\cos(12x)$),

$$\int x \cos(12x) dx = \frac{x \sin(12x)}{12} - \frac{1}{12} \int \sin(12x) dx = \frac{x \sin(12x)}{12} + \frac{\cos(12x)}{144} + c,$$

dove si è usato che una primitiva di $\cos(12x)$ è $\sin(12x)/12$, e che una primitiva di $\sin(12x)$ è $-\cos(12x)/12$. Pertanto,

$$\int_0^\pi x \cos(12x) dx = \frac{x \sin(12x)}{12} + \frac{\cos(12x)}{144} \Big|_0^\pi = \frac{\pi \sin(12\pi)}{12} + \frac{\cos(12\pi)}{144} - \frac{0 \cdot \sin(0)}{12} - \frac{\cos(0)}{144} = 0,$$

dato che $\sin(12\pi) = 0$ e che $\cos(12\pi) = 1$.

2C)

$$\int_0^6 e^{9x} dx = \frac{e^{54} - 1}{9}.$$

Vero: Dato che

$$\int e^{9x} dx = \frac{e^{9x}}{9} + c,$$

si ha

$$\int_0^6 e^{9x} dx = \frac{e^{9x}}{9} \Big|_0^6 = \frac{e^{54} - 1}{9}.$$

2D)

$$\int_0^1 \frac{18x^2 + 12x}{4 + x^2 + x^3} dx = 6 \log\left(\frac{2}{3}\right).$$

Falso: Si ha

$$\frac{18x^2 + 12x}{4 + x^2 + x^3} = 6 \frac{3x^3 + 2x}{4 + x^2 + x^3} = 6 \frac{(4 + x^2 + x^3)'}{4 + x^2 + x^3}.$$

Pertanto,

$$\int_0^1 \frac{18x^2 + 12x}{4 + x^2 + x^3} dx = 6 \log(|4 + x^2 + x^3|) \Big|_0^1 = 6 (\log(6) - \log(4)) = 6 \log\left(\frac{3}{2}\right) \neq 6 \log\left(\frac{2}{3}\right).$$

Alternativamente, si poteva osservare che, essendo la funzione integranda positiva su $[0, 1]$, l'integrale non poteva essere negativo.

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

3A)

$$\int_{-5}^5 [x e^{9x^4} + x |x|^3] dx \neq 0.$$

Falso: Dato che la funzione integranda è dispari, e che l'intervallo di integrazione è simmetrico rispetto all'origine, l'integrale vale zero.

3B)

$$\int_{-7}^7 [8 \cos^2(x) + 2x^4] dx > 0.$$

Vero: L'integrale è positivo perché la funzione integranda è positiva.

3C)

$$\int_{-7}^6 [x^3 + \sin(7x)] dx < 0.$$

Vero: Dato che la funzione è dispari, il suo integrale sull'intervallo $[-6, 6]$ è nullo. Pertanto,

$$\int_{-7}^6 [x^3 + \sin(7x)] dx = \int_{-7}^{-6} [x^3 + \sin(7x)] dx + \int_{-6}^6 [x^3 + \sin(7x)] dx.$$

Quest'ultimo integrale è negativo perché la funzione integranda è negativa. Infatti, su tutto l'intervallo si ha

$$x^3 + \sin(7x) \leq -6^3 + 1 < -6 + 1 = -5 < 0.$$

3D)

$$\int_{-3}^5 [e^{8x^2} - \cos^2(6x)] dx > 0.$$

Vero: Dato che si ha, sull'intervallo $[-3, 5]$,

$$e^{8x^2} - \cos^2(6x) \geq e^0 - 1 = 0,$$

la funzione integranda è positiva e quindi l'integrale è positivo.

4) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

4A)

$$\int_8^9 \frac{dx}{x-7} = \int_{12}^{17} \frac{dx}{x-7}.$$

Vero: Si ha

$$\int \frac{dx}{x-7} = \log(|x-7|) + c.$$

Pertanto,

$$\int_8^9 \frac{dx}{x-7} = \log(|x-7|) \Big|_8^9 = \log(2) - \log(1) = \log(2),$$

e

$$\int_{12}^{17} \frac{dx}{x-7} = \log(|x-7|) \Big|_{12}^{17} = \log(10) - \log(5) = \log(2),$$

e quindi i due integrali sono uguali.

4B)

$$\int_0^1 \frac{dx}{(7x-14)^2} = \frac{1}{98}.$$

Vero: Si ha

$$\int \frac{dx}{(7x-14)^2} = \frac{1}{49} \int \frac{dx}{(x-2)^2} = \frac{1}{49} \frac{1}{2-x} + c.$$

Pertanto,

$$\int_0^1 \frac{dx}{(7x-14)^2} = \frac{1}{49} \left(\frac{1}{2-1} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{49} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{98}.$$

4C)

$$\int_9^{10} \frac{dx}{x^2-7x+12} = \log\left(\frac{36}{35}\right).$$

Vero: Si ha

$$x^2 - 7x + 12 = (x-4)(x-3),$$

e quindi

$$\int \frac{dx}{x^2-7x+12} = \frac{1}{4-3} \log\left(\left|\frac{x-4}{x-3}\right|\right) + c = \log\left(\left|\frac{x-4}{x-3}\right|\right) + c.$$

Pertanto,

$$\int_9^{10} \frac{dx}{x^2-7x+12} = \log\left(\left|\frac{x-4}{x-3}\right|\right) \Big|_9^{10} = \log\left(\frac{6}{7}\right) - \log\left(\frac{5}{6}\right) = \log\left(\frac{6}{7} \cdot \frac{6}{5}\right) = \log\left(\frac{36}{35}\right).$$

4D)

$$\int_3^7 \frac{dx}{x^2-6x+25} = \frac{\pi}{16}.$$

Vero: Si ha

$$x^2 - 6x + 25 = (x^2 - 6x + 9) + 16 = (x-3)^2 + 16 = 16 \left[\left(\frac{x-3}{4} \right)^2 + 1 \right].$$

Pertanto,

$$\int \frac{dx}{x^2-6x+25} = \frac{1}{16} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x-3}{4} \right)^2}.$$

Con la sostituzione $y = \frac{x-3}{4}$, da cui $dx = 4\,dy$, si ha

$$\int \frac{dx}{x^2 - 6x + 25} = \frac{1}{4} \int \frac{dy}{1 + y^2} = \frac{1}{4} \arctan(y) + c = \frac{1}{4} \arctan\left(\frac{x-3}{4}\right) + c.$$

Pertanto,

$$\int_3^7 \frac{dx}{x^2 - 6x + 25} = \frac{1}{4} \arctan\left(\frac{x-3}{4}\right) \Big|_3^7 = \frac{1}{4} (\arctan(1) - \arctan(0)) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{16}.$$

5) Determinare una primitiva delle funzioni $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ e $k(x)$, e calcolare gli integrali.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad f(x) &= x^2 \log(x), \quad \int_1^{e^2} f(x) dx, & \text{b)} \quad g(x) &= x^2 \cos(6x^3), \quad \int_0^{\sqrt[3]{5}\pi} g(x) dx, \\ \text{c)} \quad h(x) &= (5x^2 - 48x + 115)e^{5x}, \quad \int_4^6 h(x) dx, & \text{d)} \quad k(x) &= \frac{10x}{1+25x^4}, \quad \int_0^{1/\sqrt{5}} k(x) dx. \end{aligned}$$

Soluzione:

a) Integriamo per parti, derivando $\log(x)$ e integrando x^2 . Si ha

$$\int x^2 \log(x) dx = \frac{x^3 \log(x)}{3} - \int \frac{x^3}{3} \frac{1}{x} dx = \frac{x^3 \log(x)}{3} - \frac{x^3}{9} + c = \frac{x^3}{9} (3 \log(x) - 1) + c.$$

Pertanto,

$$\int_1^{e^2} f(x) dx = \frac{x^3}{9} (3 \log(x) - 1) \Big|_1^{e^2} = \frac{e^6}{9} (3 \log(e^2) - 1) + \frac{1}{9} = \frac{5}{9} e^6 + \frac{1}{9}.$$

b) Si ha, con la sostituzione $y = 6x^3$, da cui $x^2 dx = dy/18$,

$$\int x^2 \cos(6x^3) dx = \frac{1}{18} \int \cos(y) dy = \frac{\sin(y)}{18} + c = \frac{\sin(6x^3)}{18} + c.$$

Pertanto,

$$\int_0^{\sqrt[3]{5}\pi} g(x) dx = \frac{\sin(6x^3)}{18} \Big|_0^{\sqrt[3]{5}\pi} = \frac{\sin(30\pi) - \sin(0)}{18} = 0.$$

c) Ricordiamo che se $P_2(x)$ è un polinomio di grado 2, allora

$$\int P_2(x) e^{5x} dx = Q_2(x) e^{5x} + c,$$

dove $Q_2(x)$ è un polinomio di grado 2 tale che

$$5Q_2(x) + Q_2'(x) = P_2(x).$$

Scrivendo il generico polinomio di grado 2 come $Q_2(x) = ax^2 + bx + c$, si ha

$$5Q_2(x) + Q_2'(x) = 5ax^2 + (5b + 2a)x + 5c + b.$$

Imponendo l'uguaglianza

$$5ax^2 + (5b + 2a)x + 5c + b = 5x^2 - 48x + 115,$$

si ha che deve essere $5a = 5$, $5b + 2a = -48$ e $5c + b = 115$. Risolvendo il sistema, si trova $a = 1$, $b = -10$ e $c = 25$. Pertanto,

$$\int (5x^2 - 48x + 115)e^{5x} dx = (x^2 - 10x + 25)e^{5x} = (x - 5)^2 e^{5x} + c,$$

e quindi

$$\int_4^6 h(x) dx = (x - 5)^2 e^{5x} \Big|_4^6 = e^{30} - e^{20}.$$

d) Si ha, con la sostituzione $y = 5x^2$, da cui $25x^4 = y^2$ e $dy = 10x dx$,

$$\int \frac{10x}{1+25x^4} dx = \int \frac{dy}{1+y^2} = \arctan(y) + c = \arctan(5x^2) + c.$$

Pertanto,

$$\int_0^{1/\sqrt{5}} k(x) dx = \arctan(5x^2) \Big|_0^{1/\sqrt{5}} = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}.$$

6) Sia

$$F(t) = \int_2^t [8e^{x^2} + \arctan(5|x|)] dx.$$

- a) Dimostrare che $F(t)$ è derivabile per ogni t in \mathbb{R} .
- b) Calcolare $F(2)$ e $F'(0)$.
- c) Dimostrare che $F(t)$ è crescente, e non è né pari né dispari.
- d) Dimostrare che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = +\infty.$$

Soluzione:

a) Dato che la funzione $f(x) = 8e^{x^2} + \arctan(5|x|)$ è una funzione continua, per il teorema fondamentale del calcolo integrale la funzione $F(t)$ è derivabile per ogni t in \mathbb{R} , e si ha

$$(1) \quad F'(t) = f(t) = 8e^{t^2} + \arctan(5|t|), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

b) Si ha

$$F(2) = \int_2^2 [8e^{x^2} + \arctan(5|x|)] dx = 0,$$

e, dalla (1),

$$F'(0) = f(0) = 8.$$

c) Sempre dalla (1) si ha

$$F'(t) \geq 7 > 0,$$

e quindi $F(t)$ è strettamente crescente. Per quanto riguarda la parità e disparità, osserviamo che si ha

$$F(2) = 0.$$

Inoltre, dato che $F(t)$ è strettamente crescente, si ha

$$F(-2) < F(2) = 0,$$

e quindi $F(-2) \neq F(2)$ (cosicché $F(t)$ non è pari), e $F(-2) \neq -F(2)$ (cosicché $F(t)$ non è dispari).

d) Osserviamo innanzitutto che il limite di $F(t)$ esiste perché $F(t)$ è crescente. Inoltre, dato che

$$8e^{x^2} + \arctan(5|x|) \geq 8,$$

si ha, se $t \geq 2$,

$$F(t) = \int_2^t [8e^{x^2} + \arctan(5|x|)] dx \geq \int_2^t 8 dx = 8(t - 2),$$

da cui segue che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) \geq \lim_{t \rightarrow +\infty} 8(t - 2) = +\infty.$$