

Soluzioni del compito 00112

1) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y''(t) - 11 y'(t) + 12 y(t) = 0.$$

1A) L'equazione (1) ha una sola soluzione costante.

Vero: Se $y(t) = Q$, con Q in \mathbb{R} , si ha $y'(t) = y''(t) = 0$; si ha pertanto che $y(t) = Q$ è soluzione se e solo se

$$y''(t) - 11 y'(t) + 12 y(t) = 12 Q = 0,$$

ovvero se e solo se $Q = 0$. Ne segue che l'unica soluzione costante è la soluzione nulla.

1B) L'equazione (1) ha infinite soluzioni tali che $y(0) = 9$.

Vero: In generale, l'equazione (1) ha infinite soluzioni dipendenti da **due** parametri reali. Assegnando una sola condizione, si “fissa” uno solo dei due parametri (o, meglio, si fissa una relazione lineare tra i due parametri), lasciando libero l'altro; pertanto, esistono infinite soluzioni di (1) tali che $y(0) = 9$.

1C) Non esistono soluzioni di (1) tali che $y(0) = 11$, $y'(0) = 12$ e $y''(0) = 0$.

Falso: Assegnando le condizioni $y(0) = 11$ e $y'(0) = 12$ si ottiene un problema di Cauchy, che ha un'unica soluzione. Per tale soluzione si ha, sostituendo $t = 0$ nell'equazione, che

$$y''(0) = 11 y'(0) - 12 y(0) = 11 \cdot 12 - 12 \cdot 11 = 0.$$

In altre parole, l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 11$ e $y'(0) = 12$ verifica anche la condizione $y''(0) = 0$. Ne segue quindi che il problema proposto ha un'unica soluzione.

1D) Se $y(0) = 0$ e $y'(0) = 10$, si ha $T_2(y(t); 0) = 10t + 55t^2$.

Vero: Assegnando le condizioni $y(0) = 0$ e $y'(0) = 10$ si trova un'unica soluzione; sostituendo $t = 0$ nell'equazione, si ha

$$y''(0) = 11 y'(0) - 12 y(0) = 11 \cdot 10 - 12 \cdot 0 = 110.$$

Pertanto, si ha

$$T_2(y(t); 0) = y(0) + y'(0)t + \frac{y''(0)}{2}t^2 = 0 + 10t + \frac{110}{2}t^2 = 10t + 55t^2.$$

2) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y'(t) = e^{2t} \cos(y(t)).$$

L'equazione (1) è a variabili separabili, essendo della forma

$$y'(t) = f(t) g(y(t)),$$

con

$$(2) \quad f(t) = e^{2t}, \quad g(s) = \cos(s).$$

2A) L'equazione (1) non ha soluzioni costanti.

Falso: Essendo l'equazione a variabili separabili, se y_0 è tale che $\cos(y_0) = 0$, allora $y(t) \equiv y_0$ è una soluzione costante di (1). Dato che

$$\cos(\pi/2 + k\pi) = 0, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

l'equazione (1) ammette infinite soluzioni costanti date da

$$y_k(t) = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2B) Se $y(0) = 6\pi$, si ha $y'(0) = 1$.

Vero: Se $y(0) = 6\pi$ si ha, sostituendo $t = 0$ nell'equazione,

$$y'(0) = e^{2 \cdot 0} \cos(6\pi) = 1 \cdot 1 = 1.$$

2C) Esistono infinite soluzioni di (1) tali che $y'(0) = 0$.

Vero: Assegnando la condizione $y_0 = \frac{\pi}{2} + k\pi$, con k in \mathbb{Z} , si trova una soluzione $y_k(t)$ per la quale si ha

$$y'_k(0) = e^{2 \cdot 0} \cos(y_k(0)) = 1 \cdot \cos(\pi/2 + k\pi) = 1 \cdot 0 = 0.$$

Ne segue che esistono infinite soluzioni (dato che le $y_k(t)$ sono tutte diverse tra loro) tali che $y'(0) = 0$. Si noti che, per quanto detto nell'esercizio **2A**, e per l'unicità della soluzione, si ha

$$y_k(t) = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

2D) Se $y(0) = 0$, la soluzione di (1) è concava in un intorno dell'origine.

Falso: Se $y(t)$ è la soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$, si ha, derivando l'equazione, che

$$y''(t) = [e^{2t} \cos(y(t))]' = 2e^{2t} \cos(y(t)) - e^{2t} \sin(y(t)) y'(t).$$

Sostituendo $t = 0$ in tale identità, si ha (si noti che dato che $\sin(y(0)) = \sin(0) = 0$, non è necessario il calcolo di $y'(0)$)

$$y''(0) = 2e^{2 \cdot 0} \cos(y(0)) - e^{2 \cdot 0} \sin(y(0)) y'(0) = 2 > 0.$$

Dato che $y''(0) > 0$, per il teorema della permanenza del segno si ha $y''(t) \geq 0$ in un intorno dell'origine, e quindi $y(t)$ è convessa in tale intorno.

3) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y'(t) = 3(1 + y^2(t)) e^{-3t}.$$

L'equazione è a variabili separabili, della forma

$$y'(t) = f(t) g(y(t)),$$

con

$$f(t) = 3e^{-3t}, \quad g(s) = 1 + s^2.$$

Dato che $g(s) \neq 0$ per ogni s in \mathbb{R} , l'equazione non ha soluzioni costanti. Dividendo per $1 + y^2(t)$ si ha

$$\frac{y'(t)}{1 + y^2(t)} = 3e^{-3t}.$$

Integrando tra 0 e s si ha

$$\int_0^s \frac{y'(t)}{1 + y^2(t)} dt = \int_0^s 3e^{-3t} dt = -e^{-3t} \Big|_0^s = 1 - e^{-3s}.$$

Per il primo integrale si ha, con la sostituzione $z = y(t)$, da cui $y'(t) dt = dz$,

$$\int_0^s \frac{y'(t)}{1 + y^2(t)} dt = \int_{y(0)}^{y(s)} \frac{dz}{1 + z^2} = \arctan(z) \Big|_{y(0)}^{y(s)} = \arctan(y(s)) - \arctan(y(0)).$$

Si ha dunque che la soluzione di (1), con dato iniziale $y(0) = y_0$ è data in forma implicita da

$$\arctan(y(s)) - \arctan(y_0) = 1 - e^{-3s},$$

da cui segue, esplicitando,

$$(2) \quad y(t) = \tan(1 - e^{-3t} + \arctan(y_0)).$$

3A) L'equazione (1) non ammette soluzioni costanti.

Vero: La funzione $g(s) = 1 + s^2$ è sempre diversa da zero, e quindi l'equazione non ammette soluzioni costanti.

3B) La soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ è crescente in un intorno dell'origine.

Vero: Se $y(0) = 0$ si ha, sostituendo $t = 0$ nell'equazione,

$$y'(0) = 3(1 + y^2(0)) e^{-3 \cdot 0} = 3 \cdot 1 \cdot 1 = 3 > 0.$$

Dato che $y'(0) > 0$, per il teorema della permanenza del segno si ha $y'(t) \geq 0$ in un intorno dell'origine, e quindi $y(t)$ è crescente in tale intorno.

Alternativamente, dato che

$$3(1 + y^2(t)) e^{-3t} \geq 0,$$

si ha $y'(t) \geq 0$ per ogni t , cosicché *tutte* le soluzioni sono crescenti (a prescindere dalla condizione iniziale).

3C) La soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ è $y(t) = \tan(e^{-3t})$.

Falso: Dalla (2), dato che $\arctan(y_0) = \arctan(0) = 0$, si ha che la soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ è data da

$$y(t) = \tan(1 - e^{-3t}) \neq \tan(e^{-3t}).$$

3D) Se $y(t)$ è la soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$, si ha

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0.$$

Falso: Dalla (2), dato che $\arctg(y_0) = \arctg(0) = 0$, si ha che la soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ è data da

$$y(t) = \operatorname{tg}(1 - e^{-3t}),$$

e quindi

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \operatorname{tg}(1 - e^{-3t}) = \operatorname{tg}(1) \neq 0.$$

4) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y''(t) + A y'(t) + B y(t) = 10.$$

4A) Se $A = B = 0$, i polinomi di primo grado sono soluzioni di (1).

Falso: Se $A = B = 0$, l'equazione (1) diventa $y''(t) = 10$. Se $y(t) = at + b$ è un polinomio di primo grado, si ha $y'(t) = a$, e quindi $y''(t) = 0 \neq 10$. Ne segue che i polinomi di primo grado non sono soluzioni di (1). Si vede facilmente che le soluzioni di (1) sono del tipo

$$y(t) = 5t^2 + at + b,$$

con a e b in \mathbb{R} .

4B) Se $A = 9$ e $B = 20$, esiste almeno una soluzione costante di (1).

Vero: Se $A = 9$ e $B = 20$, l'equazione (1) diventa

$$y''(t) + 9y'(t) + 20y(t) = 10.$$

Se $y(t) = Q$, con Q in \mathbb{R} , si ha $y'(t) = y''(t) = 0$, e quindi $y(t)$ è soluzione di (1) se e solo se

$$20Q = 10 \quad \Longleftrightarrow \quad Q = \frac{1}{2},$$

da cui segue che $y(t) \equiv \frac{1}{2}$ è una soluzione costante di (1).

4C) Se $A = 0$ e $B = -49$, $y(t) = 9te^{7t}$ non è soluzione dell'equazione omogenea associata a (1).

Vero: Se $A = 0$ e $B = -49$, l'equazione omogenea associata a (1) è

$$(2) \quad y_0''(t) - 49y_0(t) = 0,$$

il cui polinomio caratteristico è

$$P(L) = L^2 - 49 = 0.$$

Risolvendo l'equazione $P(L) = 0$ si trova $L_{1,2} = \pm 7$, e quindi tutte (e sole) le soluzioni di (2) sono date da

$$y_0(t) = Ce^{7t} + De^{-7t},$$

con C e D numeri reali. Dato che non esiste alcun valore di C e D tale che $y_0(t) = 9te^{7t}$ per ogni t , ne segue che tale funzione non è soluzione dell'equazione omogenea associata a (1).

4D) Se $A = 3$ e $B = 0$, la funzione $y(t) = \frac{10}{3}t$ è soluzione di (1).

Vero: Se $A = 3$ e $B = 0$, l'equazione (1) diventa

$$y''(t) + 3y'(t) = 10.$$

Se $y(t) = \frac{10}{3}t$, si ha $y'(t) = \frac{10}{3}$ e $y''(t) = 0$. Pertanto,

$$y''(t) + 3y'(t) = 0 + 3 \cdot \frac{10}{3} = 10,$$

e quindi $y(t) = \frac{10}{3}t$ è soluzione di (1).

5) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y'(t) = 16t y(t) + \cos(t) e^{8t^2}.$$

a) Quante soluzioni ha (1)? E quante, con la condizione iniziale $y(3) = 5$?

b) Scrivere tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata a (1).

c) Calcolare $y''(0)$, dove $y(t)$ è la soluzione di (1) tale che $y(0) = 8$.

d) Calcolare la soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$.

Soluzione:

a) Rispettivamente, infinite (dipendenti da un parametro reale) e una sola (perché, assegnando la condizione iniziale, si ottiene un problema di Cauchy).

b) L'equazione omogenea associata a (1) è

$$(2) \quad y_0'(t) = 16t y_0(t).$$

In generale, tutte le soluzioni dell'equazione

$$y_0'(t) = a(t) y_0(t),$$

sono date da

$$y_0(t) = C e^{A(t)}, \quad \text{dove} \quad A(t) = \int_0^t a(s) ds,$$

e C è un numero reale. Nel nostro caso, $a(t) = 16t$, da cui segue $A(t) = 8t^2$ e quindi tutte le soluzioni di (2) sono date da

$$y_0(t) = C e^{8t^2},$$

con C numero reale.

c) Se $y(t)$ è la soluzione di (1) tale che $y(0) = 8$, si ha, dall'equazione,

$$y'(0) = 16 \cdot 0 \cdot y(0) + \cos(0) e^{8 \cdot 0^2} = 1.$$

Derivando l'equazione, si ha poi

$$y''(t) = 16y(t) + 16t y'(t) - \sin(t) e^{8t^2} + 16t \cos(t) e^{8t^2},$$

da cui segue che

$$y''(0) = 16 \cdot y(0) + 0 - 0 + 0 = 16 \cdot 8 = 128.$$

d) Ricordiamo che la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = a(t) y(t) + b(t), \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

è data da

$$y(t) = e^{A(t)} \left[y_0 + \int_0^t b(s) e^{-A(s)} ds \right], \quad \text{dove} \quad A(t) = \int_0^t a(s) ds.$$

Nel nostro caso, $a(t) = 16t$, da cui segue $A(t) = 8t^2$, e $y_0 = 0$. Pertanto, l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ è data da

$$y(t) = e^{8t^2} \left[\int_0^t \cos(s) e^{8s^2} e^{-8s^2} ds \right] = e^{8t^2} \left[\int_0^t \cos(s) ds \right] = \sin(t) e^{8t^2}.$$

6) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y''(t) - 24y'(t) + 128y(t) = 16e^{12t}.$$

- a) Quante soluzioni di (1) soddisfano la condizione $y(0) = 11$? E quante anche la condizione $y'(0) = 10$?
b) Scrivere tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata a (1).
c) Scrivere una soluzione particolare di (1) e scrivere tutte le soluzioni di (1).
d) Determinare la soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ e $y'(0) = 4$.
-

Soluzione:

a) Assegnando la sola condizione iniziale $y(0) = 11$ all'equazione (1), che è del secondo ordine, si ottengono infinite soluzioni, dipendenti da un parametro reale. Assegnando anche la condizione $y'(0) = 10$, si ottiene un problema di Cauchy, che ha una e una sola soluzione.

b) L'equazione omogenea associata a (1) è

$$(2) \quad y_0''(t) - 24y_0'(t) + 128y_0(t) = 0,$$

il cui polinomio caratteristico è

$$P(L) = L^2 - 24L + 128.$$

Risolvendo l'equazione $P(L) = 0$ si trova $L_1 = 8$ e $L_2 = 16$. Pertanto, tutte le soluzioni di (2) sono date da

$$(3) \quad y_0(t) = Ce^{8t} + De^{16t},$$

con C e D numeri reali.

c) Dato che e^{12t} non è soluzione dell'equazione omogenea associata a (1), cerchiamo una soluzione particolare di (1) nella forma

$$\bar{y}(t) = Qe^{12t},$$

con Q numero reale. Dato che

$$\bar{y}'(t) = 12Qe^{12t}, \quad \bar{y}''(t) = 144Qe^{12t},$$

si ha

$$\bar{y}''(t) - 24\bar{y}'(t) + 128\bar{y}(t) = [144 - 24 \cdot 12 + 128]Qe^{12t} = -16Qe^{12t}.$$

Pertanto, $\bar{y}(t)$ è soluzione di (1) se e solo se Q è tale che

$$-16Qe^{12t} = 16e^{12t},$$

ovvero se $Q = -1$. Ne segue che una soluzione particolare di (1) è data da

$$\bar{y}(t) = -e^{12t}.$$

Pertanto, ricordando la (3), tutte le soluzioni di (1) sono date da

$$(4) \quad y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t) = Ce^{8t} + De^{16t} - e^{12t},$$

con C e D numeri reali.

d) Dalla (4) si ha, derivando,

$$y'(t) = 8Ce^{8t} + 16De^{16t} - 12e^{12t}.$$

Pertanto,

$$y(0) = C + D - 1, \quad y'(0) = 8C + 16D - 12.$$

Imponendo le condizioni $y(0) = 0$ e $y'(0) = 4$ si ottiene il sistema

$$C + D - 1 = 0, \quad 8C + 16D - 12 = 4,$$

le cui soluzioni sono $C = 0$ e $D = 1$. Ne segue che l'unica soluzione di (1) che soddisfa le condizioni $y(0) = 0$ e $y'(0) = 4$ è

$$y(t) = e^{16t} - e^{12t}.$$