

Product data base-3 (in Bengali)/ 07.09.2025

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
ধান	বিপিএইচ (ব্রাউন প্লান্ট হপার)/কারেন্ট পোকা	হপার বার্ন, গাছ প্রথমে হলুদ হয়ে যায় ও পরে বাদামী হয়ে যায়, দূর থেকে মনে হয় ক্ষেতের ধান পুড়ে গেছে।	বিপিএইচ (ব্রাউন প্লান্ট হপার)/কারেন্ট পোকা	গেইন ২০ এসএল, গেইন সুপার ৭০ডব্লিউজি, ক্রিফেট ৭৫এসপি, লুথাম ৪০ডব্লিউজি, এবামিড ৩৮ডব্লিউজি, বেনিফিট ২০ইসি, সেবিয়ন ৬০ইসি	Products description has shared in a separate file
	সবুজ পাতা ফড়িং/খিন লিফ হপার/জিএলএইচ	বৃদ্ধি ব্যহত হয়ে যায়, গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায়, পাতা কমলা বা হলুদ হয়ে যায়, গাছ নেতিয়ে পরে, টিলারিং কমে যাওয়া।	সবুজ পাতা ফড়িং/খিন লিফ হপার/জিএলএইচ	সানটাপ ৫০এসপি	
	হলুদ মাজরা পোকা	গাছের ভেজিটেটিভ স্টেজ এ "ডেড হার্ট" (কেন্দ্রিয় অংকুর শুকিয়ে যায়) এবং প্রজনন পর্যায়ে "হোয়াইট হেড" (খালি সাদা পেনিকেল)	হলুদ মাজরা পোকা	সানটাপ ৫০এসপি, সানটাপ প্লাস ৫০ডব্লিউপি, ম্যাকনিল ৩জিআর, ম্যাকনিল প্লাস ২.৩জিআর, সেবিয়ন ৬০ইসি, ভিটা-সুপরা ০.৫জিআর	
	আগাছা (শ্যামা, পানি কচু, আরাইল, শাক-নটে, কাটা-নটে, গুশনি শাক, মুখা, বড় চুচা, চেচরা, জয়না, বন মরিচ, হেলেধা ইত্যাদি)	ধান পাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, খাদ্য উপাদান আলো-বাতাস ও জায়গার জন্য ভাগ বসায়, পোকা-মাকড়ের বসতবাড়ী হয়, ফলে ফলন কমে যায়।	বিভিন্ন আগাছা	পরিস্কার ১০ডব্লিউপি, সানচাল ১৮ডব্লিউপি, ট্রিপল গোল্ড ৩০ডব্লিউপি, হ্যালোফপ ২৪এমই, ম্যাকআউট ৩৯ইসি	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
ধান	খোল পোড়া/ শিখ ব্লাইট রোগ/খোল পচা রোগ	ধানের খোসার ক্ষত পাতার খোসার উপর জল-সিক্ত, সবুজ-ধূসর দাগের মাধ্যমে শুরু হয়, সাধারণত গাচের গোড়ার দিকে জরুরেখার কাছে, উক্ত ক্ষত গুলো একত্রিত হলে গোখরা সাপের চামড়ার মতো দেখায়	রাইজোকটোনিয়া সোলানী নামক ছত্রাক	সানফাইটার ২৫এসসি, সানজস্ক্রি ৩২.৫এসসি, নোইন ৫০ডব্লিউপি, ত্রিজল ৫ইসি	Products description has shared in a separate file
	ব্লাস্ট রোগ	ধানের ব্লাস্ট রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে পাতা ও পাতার খোলের উপর ধূসর কেন্দ্র এবং বাদামী সীমানা সহ স্পিন্ডল আকৃতির ক্ষত যা বড় হয়ে পাতা মরে যায়, এই রোগ কাণ্ডের নোডে হলে সেখানে কালো হয়ে ভেঙ্গে যায়, গাছের ঘাড়ের একই লক্ষণ দেখা যায় যাকে পেনিকেল ব্লাস্ট বলে।	পাইরিকুলারিয়া অরাইজি নামক ছত্রাক	ম্যাকভো ৭৫ডব্লিউজি, নোইন ৫০ডব্লিউপি, সানফাইটার ২৫এসসি	
আলু	আগাছা (বথুয়া, কাকড়া, কাটা-নটে, মাক-নটে ইত্যাদি)	আলু পাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, খাদ্য উপাদান আলো-বাতাস ও জায়গার জন্য ভাগ বসায়, পোকা-মাকড়ের বসতবাড়ী হয়, ফলে ফলন কমে যায়।	আগাছা	একটিভার ২৫ইসি, ম্যাকআউট ৩৯ইসি	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
আলু	আলুর আগাম পঁচা রোগ বা আরলি ব্লাইট, আলুর মড়ক রোগ/ লেইট ব্লাইট	আরলি ব্লাইট: পুরাতন পাতায় ছোট, গাঢ় দাগ যা বৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি, বাদামী থেকে কালো রঙত আকারে বিস্তৃত হয়, দাগ গুলো হলুদ বা সবুজাভ-হলুদ প্রভা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সংক্রমিত পাতা হলুদ, শুষ্ক এবং মারা যায়, প্রায়শই গাছের সাথে সংযুক্ত থাকে। লেইট ব্লাইট: জলে ভেজা অনিয়মিত আকৃতির দাগ যা দ্রুত প্রসারিত হয়ে পাতার শিরা জুড়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। অর্ধ ও ভেজা অবস্থায় সংক্রমিত পাতার নীচে সাদা ছত্রাকের বৃদ্ধি হয়, গাছ দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পরে, পচনের ফলে দুর্গন্ধ হয়ে যায়।	ফাইটোফথোরা ইনফেসটেন্স	সানোক্সানিল ৭২ডব্লিউপি, মোর ৭২০ডব্লিউপি ম্যাকজেব/ম্যাকজিডান সুপার ৮০ডব্লিউপি	Products description has shared in a separate file
তুলা	এফিড/জাবপোকা	গাছ খর্বাকার হয়ে যায়, পাতা হলুদ হয়ে বেঁকে/কুচকে যায়, কুঁড়ি ও বোল আকার বিকৃতি হয়ে যায়।	এফিড	গেইন ২০ এসএল, গেইন সুপার ৭০ডব্লিউজি, বেনিফিট ২০ইসি	
	জ্যাসিড	পাতা হলুদ ও বাঁকা/কুচকে হয়ে যায়, "ফড়িং পোড়া" রোগে পাতার কিনারা বাদামী হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফলন কমে যায়।	জ্যাসিড	বেনিফিট ২০ইসি	
	বোলওয়ার্ম	কুঁড়ি ও গুঁড়িতে ছিদ্র করা, যা পরে ফাপা হয়ে যেতে পাও, ফলে তরুন কুঁড়ি ঝরে পড়ে থাকা পুড়োনো গুঁড়িতে ফাটল ও পচন দেখা দেয়।	হেলিকোভার্পা আরমিজেরা	সানমেরিন ১০ইসি, সানথ্রিন ২.৫ইসি	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
চা	রেড স্পাইডার মাইট/ লাল মাকড়	পাতার মধ্যশিরা বরাবর হলুদ বা লালচে বাদামী দাগ বা ব্রোঞ্জ হয়ে যায়, অবশেষে পাতা ঝরে পরে।	অরিগোনাইগাছ কফিই	এবোম ১.৮ ইসি, এবোম সুপার ৩ইডব্লিউ, বিস্তা ২ইসি, ফেনমাইট ৫এসসি, সুমাইট ৫৭ইসি, পাইরিন ২০ডব্লিউপি, পরিসাফ ৮০ডাব্লিউজি	Products description has shared in a separate file
	উইপোকা/টারমাইট	চা গাছ শুকিয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত গাছ মারা যায়, আক্রান্ত গাছের মূল ফাঁপা হয়ে যায়, কাণ্ড মাটিতে ভরা থাকে।	উইপোকা/টারমাইট	গেইন ২০এসএল, সাইপারফস ৫৫ইসি	
	এফিড/জাবপোকা	গাছ খর্বাকার হয়ে যায়, পাতা হলুদ হয়ে বেকে/কুচকে যায়, কুঁড়ি ও বোল আকার বিকৃতি হয়ে যায়।	এফিড	গেইন ২০ এসএল, গেইন সুপার ৭০ডব্লিউজি, বেনিফিট ২০ইসি	
	ডাইব্যাক/আগামরা রোগ	চা গাছের পাতা ঝিমিয়ে পড়ে, পাতার রং হলুদ বা বাদামী হয়ে যায়, পাতা বুলে পড়ে, মৃত কাণ্ড যা শাখার ডগা থেকে নীচের দিকে ধীরে ধীরে মারা যায়, ধূসর বা কালো রং-এর উঁচু প্রান্ত থাকে। এই রোগের কারণে খাদ্য উপাদান ও পানি পরিবহনে বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে ব্যাপকভাবে পাতা মরে যায়।	ফিউজারিয়াম স্পেসিস	সানভিট ৫০ডব্লিউপি, পলিকো ৫০ডব্লিউপি, থিজা ২০এসসি	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
চা	চাঁএর মশা/টি হেলোপেলটিস/ টি মসকুইটো বাগ	আক্রান্ত গাছের পাতায় ব্যপক কালো দাগ হয়, পাতা কুঁচকে যায়, প্লাকিং এর অযোগ্য হয়ে যায়।	হেলোপেলটিস থিভোরা	সানমেরিন ১০ইসি সানথ্রিন ২.৫ইসি ইথার প্লাস ৪০ডব্লিউজি	Products description has shared in a separate file
	আগাছাসমূহ	পাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, খাদ্য উপাদান আলো- বাতাস ও জায়গার জন্য ভাগ বসায়, পোকা- মাকড়ের বসতবাড়ী হয়, ফলে ফলন কমে যায়।	মিশ্র আগাছাসমূহ	রিডউইড আরপি, ২.৪-ডি উইডার, উইডোক্সোন, ক্লিনোক্সোন, রেয়ারউইড ৩২এসসি, রিডউইড প্লাস ২৮ এসএল	
	ব্লাক রট/পচন রোগ	পাতার কিনারায় কৌনিক বা ভি-আকৃতির ক্লোরোটিক (হলুদ) ক্ষত, যা পরে কালো মিরি সহ বাদামী হয়ে যায়।	করটিকাম থি বা, করটিকাম ইনবিসাম,	পলিকো ৫০ডব্লিউপি	
	রেড রাস্ট/লাল মরিচা রোগ	পাতা ও কাণ্ডে মরিচা পড়ে বা লালচে বাদামী দাগ পড়ে।	সেফালোরাস স্পেসিস	পলিকো ৫০ডব্লিউপি নোইন ৫০ডব্লিউপি সানভিট ৫০ডব্লিউপি	
	ফ্লাস ওয়ার্ম	জুঁক, কুঁচকে যাওয়া চামড়ার মতো পাতা	ক্রিকুলা ট্রাইফেনেসট্রাটা পোকা	ম্যাকজিনেক্স ৬০ইসি	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
পেঁয়াজ	পার্পল ব্লচ রোগ	পেঁয়াজের উপর বেগুনি রঙের দাগের লক্ষণগুলি ছোট, ডুবে যাওয়া, সাদা দাগ হিসাবে শুরু হয় যা দ্রুত হলুদ সীমানা সহ উপবৃত্তাকার, বেগুনি-বাদামী ক্ষতগুলিতে পরিণত হয়, প্রায়শই ঘনকেন্দ্রিক বলয় তৈরি করে। এই ক্ষতগুলি ছড়িয়ে পড়তে পারে, পাতাগুলি মারা যেতে পারে এমনকি ফুলের ডালপালাও আটকে যেতে পারে, যার ফলে শুকিয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে যায়। সংরক্ষণের সময়, ছত্রাকের কারণে বালুর ঘাড়ে জলীয়, হলুদ থেকে লালচে পচন দেখা দিতে পারে, যা শুকিয়ে যায় এবং কালো হয়ে যায়।	অলটারনারিয়া পরী	সানোব্লানিল ৭২ডব্লিউপি, মোর ৭২০ডব্লিউপি ম্যাকজেব/ম্যাকজিডান সুপার ৮০ডব্লিউপি, কার্ডিওন ৫০ডব্লিউপি	Products description has shared in a separate file
মরিচ	মাকড়/লাল মাকড়	পাতা কুঁচকে যাওয়া, হলুদ হয়ে যাওয়া, বাদামী হয়ে যাওয়া, কুঁচকে যাওয়া এবং ভঙগুর পাতা, সেই সাথে বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং বিকৃত ফুল ও ফল	মাকড়	এবোম ১.৮ ইসি, এবোম সুপার ৩ইডব্লিউ, বিস্তা ২ইসি, ফেনমাইট ৫এসসি, সুমাইট ৫৭ইসি, পাইরিন ২০ডব্লিউপি, পরিসাফ ৮০ডাব্লিউজি	
আখ	উইপোকা/টারমাইট	গাছ শুকিয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত গাছ মারা যায়, আক্রান্ত গাছের মূল ফাঁপা হয়ে যায়, কান্ড মাটিতে ভরা থাকে। হলুদ পাতা, শুকনো কান্ড এবং গুল্ম যা ফাঁপা এবং মাটি বা কাদা দিয়ে ভরা।	উইপোকা/টারমাইট	গেইন ২০এসএল, সাইপারফস ৫৫ইসি	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
আখ	রেড রট/ লাল পঁচা রোগ	আখের লাল পচনের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া এবং ঝুলে পড়া, বিশেষ করে উপর থেকে তৃতীয় বা চতুর্থ অংশ, মধ্যশিরায লাল ক্ষত সহ। ভিতরে, কান্ডগুলিতে লাল বিবর্ণ টিস্যু সাদা দাগের সাথে মিশে থাকে এবং গাঁজন থেকে অ্যালকোহলযুক্ত গন্ধ নির্গত হয়। পরিপক্ক কান্ডগুলিতে তন্তু দিয়ে ভরা গর্তও থাকতে পারে এবং আখ হালকা হয়ে যায় এবং সহজেই ভেঙে যায়।	কলেটোট্রিকাম ফ্যাকাটাম	নোইন ৫০ডব্লিউপি	Products description has shared in a separate file
	সাদা বলসানো /হোইট ব্লাইট	আখের সাদা দাগের লক্ষণগুলির মধ্যে রপডছে পাতাড সাদা থেকে ক্রিম রঙের ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়, যা ছড়িয়ে পড়ে পুরো পাতা ঢেকে ফেলে। রোগটি বাড়ার সাথে সাথে এর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, অতিরিক্ত কুঁড়ি ঝোপঝাড়ের মতো দেখা যায় এবং প্রাণশক্তি হ্রাস পায়। পাতাগুলি সরু হয়ে যায় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে, পুরো গাছটি হ্রাস পেতে পারে, যা ফলনযোগ্য আখ উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়।	ফাইটোপ্লাজমা	ম্যাকনিল ৩জিআর, ম্যাকনিল প্রাস ২.৩জিআর	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
টমেটো	আরলি ব্লাইট/আগাম ধ্বসা রোগ	টমেটোর আগাম পচা রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে "ষাঁড়ের চোখের মতো" দাগ, যার পুরোনো পাতায় ঘনকেন্দ্রিক বলয় থাকে, যা হলুদ বলয় দ্বারা বেষ্টিত থাকে, যা পরে একত্রিত হতে পারে, যার ফলে পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। কাণ্ড এবং ফলের উপরও গাঢ়, ডুবে যাওয়া ক্ষত দেখা দিতে পারে এবং গুরুতর সংক্রমণের ফলে পাতা ঝরে পরে এবং ফলন হ্রাস পায়।	অলটারনারিয়া সোলানি	সিএম ৭৫ডব্লিউপি, ম্যাকজেব/ম্যাকজিডান সুপার ৮০ডব্লিউপি	Products description has shared in a separate file
	উইল্ট/ঢলে পড়া রোগ	টমেটো গাছের ঢলে পড়ার লক্ষণ রোগভেদে ভিন্ন হয়, তবে প্রায়শই পাতা ঝরে পড়া (বিশেষ করে বিকেলে), পাতা হলুদ বা রোঞ্জ হয়ে যাওয়া, বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং কাণ্ডের টিস্যু বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, যা কাটার সময় বাদামী দেখায়। ফলেও রিং বা দাগ দেখা যেতে পারে।	ফিউজারিয়াম এন্ড ভার্টিসিলিয়াম	ক্রেসিন সানসার্টো সানপুমা	
বেগুন	উইল্ট/ঢলে পড়া রোগ	বেগুন গাছের ঢলে পড়ার লক্ষণ রোগভেদে ভিন্ন হয়, তবে প্রায়শই পাতা ঝরে পড়া (বিশেষ করে বিকেলে), পাতা হলুদ বা রোঞ্জ হয়ে যাওয়া, বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং কাণ্ডের টিস্যু বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, যা কাটার সময় বাদামী দেখায়। ফলেও রিং বা দাগ দেখা যেতে পারে।	ফিউজারিয়াম এন্ড ভার্টিসিলিয়াম	ক্রেসিন সানসার্টো সানপুমা	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
বেগুন	উইল্ট/ঢলে পড়া রোগ	বেগুন গাছের ঢলে পড়ার লক্ষণ রোগভেদে ভিন্ন হয়, তবে প্রায়শই পাতা ঝরে পড়া (বিশেষ করে বিকেলে), পাতা হলুদ বা রোঞ্জ হয়ে যাওয়া, বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং কাণ্ডের টিস্যু বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, যা কাটার সময় বাদামী দেখায়। ফলেও রিং বা দাগ দেখা যেতে পারে।	ফিউজারিয়াম এন্ড ভার্টিসিলিয়াম	ক্রেসিন সানসার্টো সানপুমা	Products description has shared in a separate file
	মাকড়/লাল মাকড়	পাতা কুঁচকে যাওয়া, হলুদ হয়ে যাওয়া, বাদামী হয়ে যাওয়া, কুঁচকে যাওয়া এবং ভঙ্গুর পাতা, সেই সাথে বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং বিকৃত ফুল ও ফল	মাকড়	এবোম ১.৮ ইসি, এবোম সুপার ৩ইডব্লিউ, বিস্তা ২ইসি, ফেনমাইট ৫এসসি, সুমাইট ৫৭ইসি, পাইরিন ২০ডব্লিউপি, পরিসাফ ৮০ডাব্লিউজি	
	বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা/বেগুনের মাজরা পোকা/বিএসএফবি	কাণ্ডের ডগা এবং ফুল শুকিয়ে যাওয়া, কাণ্ডে ডেড হার্ট" এবং ফলের ছিদ্র দৃশ্যমান, যা কাওয়া ও বাজারে বিক্রির অযোগ্য করে তোলে।			
	এফিড/জাবপোকা	গাছ খর্বাকার হয়ে যায়, পাতা হলুদ হয়ে বেকে/কুচকে যায়, কুঁড়ি ও বোল আকার বিকৃতি হয়ে যায়।	এফিড	গেইন ২০ এসএল, গেইন সুপার ৭০ডব্লিউজি, বেনিফিট ২০ইসি	

Name of Crop (s)	Pest (s)/common issues	Symptom (s)	Cause/reason	Suggested MBL products/ Solution for treatment	Products description
কলা	সিগাটোকা	পাতায় কালো রেখা ও দাগ দেখা দেয় যার ফলে পাতা হলুদ, বাদামী এবং শেষে মারা যায়, যা সালোকসংশ্লেষণ এবং ফলন হ্রাস করে।	সিউডোসারকোম্পোরা ফিজিয়েনসিস এবং মাইকোস্ফারেলা ফিজিয়েনসিস	ক্রিজল ৫ ইসি, নোইন ৫০ ডব্লিউপি	Products description has shared in a separate file
	আগাছাসমুহ	গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, খাদ্য উপাদান আলো-বাতাস ও জায়গার জন্য ভাগ বসায়, পোকা-মাকড়ের বসতবাড়ী হয়, ফলে ফলন কমে যায়।	মিশ্র আগাছাসমুহ	ক্লিনোজোন ২৪ এসএল	
আম	এনথ্রাকনোজ	পাতা, ফুল, ডালপালা এবং ফলের উপর ছোট, কালো, নিমজ্জিত দাগ হয়	কোলেট্রোটিকাম গ্লোইম্পোরইডস	ডাজিম ৫০ ডব্লিউপি, ম্যাকজিডান সুপার ৮০ ডব্লিউপি, ক্রিজল ৫ ইসি, কার্ডিওন ৫০ ডব্লিউপি, সানজক্সি ৩২.৫ এসসি, সানফাইটার ২৫ এসসি, মোর ৭২০ ডব্লিউপি, পজিটিভ ৩০ এসই, নোইন ৫০ ডব্লিউপি, সানোঅ্যানিল ৭২ ডব্লিউপি	
	হপার	কচিপাতা হলুদাভ এবং নেতিয়ে পড়ে, ফুল বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং শুকিয়ে যায়, নিফ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা রস চুষে ফেলার কারণে ফলের ঝরে পড়া বৃদ্ধি ও মধুচক্র নিঃসরণ হয়।	ইডিকোপাস ক্লাইপেলিস এবং ইডিকোপাস নিভোম্পারসাস	সানমেরিন ১০ ইসি, সানভেলারেট ২০ ইসি, ল্যাম্বডাফস ৩৩ ইসি, নাইজিন ৮০ ডব্লিউডিজি	
	পাউডারি মিলডিউ	পাতা, ফুলের ডাটা, ফুল এবং কচি ফলের উপর সাদা, পাউডার সদৃশ কণা দেখা যায়	অইডিয়াম ম্যানজিফেরা	সানোঅ্যানিল ৭২ ডব্লিউপি	
গম	আগাছাসমুহ	গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, খাদ্য উপাদান আলো-বাতাস ও জায়গার জন্য ভাগ বসায়, পোকা-মাকড়ের বসতবাড়ী হয়, ফলে ফলন কমে যায়।	মিশ্র আগাছাসমুহ	সানফিনিটি ৫০.৭৫ ডব্লিউপি	

	গোড়া পঁচা ও চারার পঁচা রোগ	চারাগাছের গোড়ায় সঁাতসঁাতে ভাব, মূলের বিকাশ ভালো নাহওয়া, কান্ড বিবর্ণ হয়ে গাঢ় বাদামী রং ধারণ, চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বীজ কুঁচকে যায়।	ফিউজারিয়াম এবং মাইক্রোডোকিয়াম প্রজাতিসমূহ	এসাভেক্স ৪০ ডব্লিউপি	
	ছোট কেড়ি পোকা, ছোট শুঁড় পোকা, ছোট ঝুঁসরী পোকা	সাধারণত গুদামজাত গমের মধ্যে আর্দ্রতা বেড়ে গেলে, গুদামে সঁাতসঁাতে ভাব বেড়ে গেলে দেখা যায়		ভ্যানটেজ ৫৬%	
সরিষা	এফিড/জাবপোকা	গাছ খর্বাকার হয়ে যায়, পাতা হলুদ হয়ে বঁকে/কুচকে যায়, শক্তিশালী গাছও আন্তে আন্তে মারা যায়	এফিড উপদ্রব	সেবিয়ন ৬০ ইসি	
	লেইট ব্লাইট / নাবী ধ্বসা রোগ	পাতায় সমকেন্দ্রিক বলয়সহ ছোট, গাঢ় বাদামী বৃত্তাকার দাগ, যা বড় হয় এবং একত্রিত হয়, যার ফলে হলুদ হয়ে যায় এবং পাতা ঝরে পড়ে যায়।	অল্টারনারিয়া ব্রাসিকা এবং অল্টারনারিয়া ব্রাসিসিকলা	কার্ডিওন সুপার ৫০ ডব্লিউপি	
শসা	পাউডারি মিলডিউ	পাতা ও কান্ডে সাদা, পাউডারি দাগ যা গাছের হলুদ হয়ে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া এবং গাছের অকাল মৃত্যু হতে পারে।	ওডোশ্ফেরা জেছি এবং এসিফে সিকোরাসেরাম	সানকা ৫০ এসসি, সানজোল প্লাস ৭০ ডব্লিউপি	
মিষ্টি কুমড়া	পাউডারি মিলডিউ	পাতা, কান্ড ও ফলের উপর সাদা, পাউডারি দাগ যা পুরো গাছে ছড়িয়ে পড়ে বড়, বিবর্ণ দাগ তৈরী করে এবং গাছের পুরো পৃষ্ঠকে ঢেকে রাখে।	ওডোশ্ফেরা জেছি	ম্যাকসান ৬২.৫ ডব্লিউজি, ম্যাকভো ৭৫ ডব্লিউজি, সানপুমা ৫৪ ডব্লিউপি	
পাট	আগাছাসমূহ	গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, খাদ্য উপাদান আলো-বাতাস ও জায়গার জন্য ভাগ বসায়, পোকা-মাকড়ের বসতবাড়ী হয়, ফলে ফলন কমে যায়।	মিশ্র আগাছাসমূহ	সানওয়েল ৫ ইসি	
	লোমশ শুঁয়োপোকা	পাতা আঁচড়ে খাওয়া, জালের মতো দেখা যাওয়া, ঝড়ে পড়া, কঙ্কাল হয়ে যাওয়া এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।	স্পিলোসোমা অবলিকিউয়া	ভিটাব্রিল ৮৫ ডব্লিউপি	
লাউ	পাউডারি মিলডিউ	পাতা ও কান্ডে সাদা, পাউডারি দাগ যা গাছের হলুদ হয়ে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া এবং গাছের অকাল মৃত্যু হতে পারে।	ওডোশ্ফেরা জেছি	ম্যাকভিট ৮০ ডিএফ, পলিসাফ ৮০ ডব্লিউজি	
পেঁয়ারা	এনথ্রাকনোজ	কান্ডের আগা মরে যাওয়া, কাঁচা ফলের উপর গাঢ় বাদামী, রোদেপোঁড়া, উচ্ছল দাগ এবং পাতায় নেক্রোটিক ক্ষত দেখা যায়।	কোলেট্রোটিকাম গ্লোইস্পোরাইডস	নোইন ৫০ ডব্লিউপি	

তিল	লিফ স্পট/ পাতার দাগ রোগ	ছোট, গাঢ় দাগ যা হলুদ বা বেগুনি সীমানা সহ বড় নেক্রটিক ক্ষতে প্রসারিত হয় এবং প্রায়শই একত্রিত হয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে।	সারকোস্পোরা সিসেমি	সানভিট ৫০ ডব্লিউপি	
ভুট্টা	আগাছাসমূহ	গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, খাদ্য উপাদান আলো-বাতাস ও জায়গার জন্য ভাগ বসায়, পোকা-মাকড়ের বসতবাড়ী হয়, ফলে ফলন কমে যায়।	মিশ্র আগাছাসমূহ	মেজিন ৩৩ এসসি	