

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGUNAAN TOILET ATAU TOILETING PADA PASIEN STROKE		
1	PENGERTIAN	Toileting meliputi beberapa kegiatan yang dimulai dari keluar masuk toilet, beranjak dari kloset, merapikan pakaian sendiri, dan membersihkan organ ekskresi.
2	TUJUAN	Pasien mampu melakukan toileting secara mandiri
3	PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berpindah baik dengan berjalan atau menggunakan kursi roda menuju toilet. 2. Pasien berpindah atau beranjak ke jamban (kloset). Jika menggunakan kursi roda, pastikan kaki kursi roda telah terkunci sebelum berpindah. 3. Pasien melepaskan pakaian, sesuai keperluan. 4. Pasien melakukan BAB atau BAK. 5. Pasien menyiram dan membersihkan atau menyeka organ ekskresi dengan menggunakan air, tissue atau sesuai kebutuhan secara mandiri. 6. Pasien mengenakan pakaian kembali seperti semula. 7. Pasien berpindah dari jamban ke posisi berdiri atau ke kursi rodanya. 8. Pasien keluar dari toilet dan toileting selesai. <p>Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebaiknya gunakan kloset duduk, untuk mencegah resiko jatuh saat jongkok. ▪ Jika selama toileting merasa tidak mampu menjaga keseimbangan secara mandiri, maka minta bantuan pada orang lain, untuk mencegah terjadinya cedera baru.