

$$4. \quad xy'' + 2y' + y = 0$$

$$y(1) = -10 \quad y(5) = -18$$

• Frobenius: $y = x^\lambda \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j = \sum_{j=0}^{\infty} (c_j x^{\lambda+j})$

$$\left[\begin{array}{l} y' = \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda+j)(c_j) x^{\lambda+j-1} \\ y'' = \sum_{j=0}^{\infty} (c_j)(\lambda+j)(\lambda+j-1) x^{\lambda+j-2} \end{array} \right] \quad \left(\begin{array}{l} \text{first and} \\ \text{second deriv.} \end{array} \right)$$

• Solution: (by substitution into orig. ODE)

$$(x) \left[\sum_{j=0}^{\infty} (c_j)(\lambda+j)(\lambda+j-1) x^{\lambda+j-2} \right] + (2) \left[\sum_{j=0}^{\infty} (\lambda+j)(c_j) x^{\lambda+j-1} \right] + \left[\sum_{j=0}^{\infty} (c_j) x^{\lambda+j} \right] = 0$$

$$x^\lambda \left[\sum_{j=0}^{\infty} (c_j)(\lambda+j)(\lambda+j-1) x^{j-1} + \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda+j)(c_j) 2x^{j-1} + \sum_{j=0}^{\infty} (c_j) x^j \right] = 0$$

(get powers to match) $k=j$

$k=j$

$k=j+1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (c_k)(\lambda+k)(\lambda+k-1) x^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda+k)(c_k) 2x^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} (c_{k-1}) x^{k-1}$$

$$c_k \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda+k)(\lambda+k-1) x^{k-1} + (\lambda+k) 2x^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} (c_{k-1}) x^{k-1}$$

(evaluate first two groups at $k=0$ to get matching indices)

$$c_0 \left[\lambda(\lambda-1) x^{-1} + 2\lambda x^{-1} \right] + \sum_{k=1}^{\infty} \left[c_k (\lambda+k)(\lambda+k-1) + (\lambda+k) 2 + c_{k-1} \right] x^{k-1} = 0$$

$= 0$

indicial eqn for λ

recursion relation for c_j

$$\lambda^2 + \lambda = 0 \rightarrow \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = -1$$

given $y = x^\lambda \left[\sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j \right]$

$$c_k = \frac{-c_{k-1}}{(k+k)(k+k-1)(2k+2k)}$$

$$y_1 = x^0 [c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots]$$

$$c_k = \frac{-c_{k-1}}{(k)(k-1)(2k)}$$

$$y_2 = x^{-1} [d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + \dots]$$

$$c_k = \frac{-c_{k-1}}{(k-1)(k-2)(2k-2)}$$