

1.

$$m \left(\frac{dv}{dt} \right) = mg - c(v)^2 ; \quad v(0) = 0 \sim \frac{dv}{dt} = 0 @ v_s$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c(v)^2}{m}$$

Variables: v, t
parameters: g, c, m

$$\tilde{v} = \frac{v - v_r}{v_s}$$

$$\tilde{t} = \frac{t - t_r}{t_s}$$

$-_r$ = reference value
 $-_s$ = scaling factor

$$v(0) = 0 \rightarrow v_r, t_r = 0$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d(\tilde{v} \cdot v_s)}{d(\tilde{t} \cdot t_s)} \longrightarrow \frac{v_s}{t_s} \frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}}$$

$$m \frac{v_s}{t_s} \frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} = mg - c v_s^2 \tilde{v}^2$$

$$m \frac{v_s}{\frac{v_s}{g}} \frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} = mg - c v_s^2 \tilde{v}^2$$

non-dim

$$\left[\begin{array}{l} m \frac{v_s}{t_s} = mg \\ t_s = \frac{v_s}{g} \end{array} \right]$$

— divide by mg

$$\frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} = 1 - \frac{c}{mg} v_s^2 \tilde{v}^2$$

— choose v_c to be terminal velocity
 $\frac{dv}{dt} = 0 = g - \frac{cv^2}{m}$
 $v_c^2 = \frac{mg}{c}$

$$\frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} = 1 - \tilde{v}^2$$

- plot with Runge-Kutta
- set $v = 0.95$
- check $v = 1 \rightarrow \frac{dv}{dt} \text{ should} = 0$