

INSTRUTOR DO MÓDULO

Quem conduz este módulo de convivência e manejo seguro de animais



INSTRUTOR

1º TEN QOCBM GERALDO

Oficial Bombeiro Militar
Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco — CBMPE



FORMAÇÃO

Engenharia Química

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



PÓS-GRADUAÇÃO

Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

Base clínica para o socorro inicial a vítimas de trauma



ESPECIALIDADE

APH e Resgate Operacional

Experiência de campo em ocorrências de socorro e salvamento

ROTEIRO DO MÓDULO


Cinco blocos, uma ideia central: segurança primeiro



1

Mordeduras e arranhaduras

Como a lesão acontece e por que infecciona.



2

Prevenção de ataques

Ler o cão; posições de árvore e de tartaruga.



3

Primeiros socorros

Água, sabão, compressão e encaminhamento.



4

Profilaxia da raiva

Observação de 10 dias, vacina e soro.



5

Abelhas e marimbondos

Isolar, afastar pessoas e acionar o 193.

Fechamento: 2 casos simulados + quiz de 5 questões com gabarito comentado

POR QUE ESTE TEMA IMPORTA

Três números que orientam toda a conduta deste módulo

RAIVA APÓS OS SINTOMAS

≈100%


de letalidade — e totalmente evitável com profilaxia iniciada a tempo.



LAVAGEM DA FERIDA

15 MIN


de água corrente e sabão: o socorro mais eficaz contra a raiva.



OBSERVAÇÃO DO CÃO/GATO

10 DIAS

Se o animal seguir saudável, o caso é encerrado.



REGRA DE OURO PARA O PÚBLICO GERAL (SEM TREINAMENTO)

Sua segurança vem primeiro. Não se exponha ao animal nem ao enxame: afaste-se, proteja as pessoas ao redor e acione 193 (Bombeiros) ou 192 (SAMU).

MECANISMO DE LESÃO

Mordedura não é “só um corte”: o dente perfura, rasga e esmaga



TIPO 1 PERFURAÇÃO

- Dentes finos e pontiagudos (típico do gato).
- Orifício pequeno por fora, profundo por dentro.
- Bactérias ficam “seladas” no fundo: aparência enganosamente leve.



TIPO 2 LACERAÇÃO

- Dente + movimento da cabeça do animal rasgam pele e músculo.
- Bordas irregulares e sangramento visível.
- Pode expor tendões, vasos e nervos.



TIPO 3 ESMAGAMENTO

- Pressão da mandíbula, sobretudo em cães de grande porte.
- Hematoma e inchaço sem grande corte aparente.
- Tecido desvitalizado favorece infecção; pode haver fratura.

Lembre: toda mordedura que rompe a pele é uma ferida contaminada.

INFECÇÃO E TÉTANO

O perigo que não aparece na hora



RISCO 1

Bactérias da boca do animal


- **Pasteurella multocida:** principal agente em mordidas de gato e de cão; a infecção pode surgir em poucas horas.
- **Staphylococcus e Streptococcus:** da pele da vítima e da boca do animal.
- **Mordida de gato** infecciona com mais frequência que a de cão, por ser perfurante e profunda.



RISCO 2

Tétano

- Clostridium tetani vive no solo e em fezes de animais.
- Ferida perfurante e suja é a porta de entrada ideal.
- Leve a caderneta: a equipe avalia o reforço da vacina.



SINAIS DE INFECÇÃO

Apareceu algum? Volte ao serviço de saúde no mesmo dia.

- Vermelhidão que se espalha
- Calor e inchaço crescentes
- Pus ou mau cheiro
- Dor que piora com o tempo
- Febre ou mal-estar
- Riscos vermelhos subindo no membro


LINGUAGEM CORPORAL CANINA

O cão quase sempre avisa antes de morder: aprenda a ler os sinais



NÍVEL 1 RELAXADO

- Corpo solto e movimentos fluidos.
- Boca entreaberta, língua à mostra.
- Orelhas e cauda em posição natural.



NÍVEL 2 DESCONFORTO

- Lambe os lábios, boceja fora de hora.
- Desvia o olhar e mostra o branco dos olhos.
- Orelhas para trás, cauda baixa, corpo encolhido.



NÍVEL 3 — AFASTE-SE AMEAÇA

- Corpo rígido e olhar fixo.
- Rosna e mostra os dentes.
- Pelos do dorso eriçados; cauda alta e dura.

Atenção: cauda abanando NÃO significa cão amigável — pode ser excitação ou tensão. Leia o corpo inteiro.


SITUAÇÕES DE RISCO

Quando até um cão conhecido pode morder



Comendo

ou com comida por perto



Com osso ou brinquedo

que ele considera seu



Dormindo

ou acordado de surpresa




Com filhotes

a fêmea protege a ninhada




Ferido ou doente

a dor torna o cão reativo




Defendendo território

portão, quintal, carro



Alguém corre ou pedala

ativa o instinto de perseguição



Preso em corrente

ou solto e desconhecido


Mesmo o cão da família pode morder nessas situações. Respeite o espaço do animal.

DIANTE DE UM CÃO AMEAÇADOR

O que o público geral deve (e não deve) fazer

NÃO FAÇA

- Encarar o cão nos olhos: soa como desafio.
- Correr ou virar as costas: ativa a perseguição.
- Gritar, agitar os braços ou chutar.
- Separar cães brigando com as mãos.
- Aproximar-se de cão desconhecido, preso ou com filhotes.



FAÇA

- Pare e fique imóvel: seja uma “árvore”.
- Braços cruzados junto ao corpo; olhe para os próprios pés.
- Fale baixo e calmo, sem gestos bruscos.
- Quando ele perder o interesse, afaste-se devagar, de lado.
- Coloque um objeto (mochila, bolsa) entre você e o cão.



Se o cão avançar: ofereça a mochila ou o casaco para ele morder no lugar do seu corpo.

POSIÇÃO DA ÁRVORE

Quando o cão se aproxima e você ainda está de pé



POSIÇÃO DA ÁRVORE

Imóvel, firme e “sem graça” para o cão.

1

PARE

Fique imóvel. Não corra: correr ativa o instinto de caça do cão.

2

RAÍZES

Pés juntos e bem firmes no chão.

3

GALHOS RECOLHIDOS

Braços cruzados junto ao peito, mãos fechadas e protegidas.

4

OLHE PARA OS PÉS

Não encare o cão; respire e conte mentalmente até ele ir embora.

POSIÇÃO DA TARTARUGA

Se você for derrubado: vire uma “tartaruga” e proteja os órgãos vitais

1

ENCOLHA-SE

Deite de bruços com os joelhos dobrados sob o corpo, como uma bola.

2

MÃOS NA NUCA

Dedos entrelaçados atrás do pescoço; antebraços cobrindo orelhas e rosto.

3


IMÓVEL E EM SILÊNCIO

Não role, não grite, não se debata: o cão perde o estímulo.

4

SAIA DEVAGAR

Quando o cão se afastar, levante-se lentamente e recue sem correr.



POSIÇÃO DA TARTARUGA

O “casco” protege rosto, pescoço, tórax e abdome — as regiões onde a mordida pode matar.

CRIANÇAS E TUTORES


A prevenção de mordeduras começa dentro de casa



PREVENÇÃO

Crianças: as maiores vítimas


- **Altura:** rosto e pescoço ficam na linha da boca do cão.
- **Gestos:** abraçar, beijar e puxar são entendidos como ameaça.
- **Quem morde:** na maioria das vezes, um cão conhecido da família ou da vizinhança.
- **Regra:** nunca deixe criança pequena sozinha com cão; ensine a pedir licença ao tutor antes de tocar.



CONVIVÊNCIA

Tutor responsável

- Vacina antirrábica anual de cães e gatos (campanhas gratuitas).
- Guia e coleira em via pública; cão não fica solto na rua.
- Castração e socialização desde filhote.
- Local tranquilo para o cão comer e descansar, longe das crianças.



Ensine às crianças: “não é meu, não mexo” — sempre pedir ao tutor antes de tocar em qualquer cão.

SEQUÊNCIA DE SOCORRO

Mordedura ou arranhadura: a ordem certa das ações



Anote e informe: onde está o animal, quem é o tutor e se é vacinado. Isso define a profilaxia da raiva.



LAVAGEM: 15 MINUTOS

A medida mais eficaz dos primeiros socorros contra a raiva

TEMPO MÍNIMO DE LAVAGEM

15 MIN

Água corrente e sabão em abundância, logo após a exposição — e mesmo que a vítima chegue tarde.



COMO LAVAR

Simples, barato e o mais eficaz

- **Água corrente:** torneira, garrafa ou mangueira, com sabão comum ou neutro.
- **Por dentro da ferida:** deixe a água escorrer; ensaboe as bordas com suavidade, sem esfregar forte.
- **Olhos e boca:** lave só com água corrente ou soro fisiológico, em abundância.
- **Antisséptico** (ex.: povidona) é complemento — nunca substitui a lavagem.

Por que funciona?

A água e o sabão removem mecanicamente a saliva, o vírus e as bactérias, reduzindo muito a carga viral no local.

SANGRAMENTO E CURATIVO

Compressão, curativo limpo — e as crendices que pioram a ferida

NÃO FAÇA

- Pó de café, pasta de dente, fumo, terra, manteiga ou “remédio caseiro”.
- Fechar a ferida com fita, cola ou pontos caseiros.
- Usar álcool ou antisséptico NO LUGAR da lavagem com água e sabão.
- Matar ou sumir com o animal: ele precisa ser observado por 10 dias.
- Adiar o atendimento porque “a ferida é pequena”.




FAÇA

- Compressão direta e firme com pano limpo até o sangramento parar.
- Encharcou? Coloque outro pano por cima, sem retirar o primeiro.
- Cubra a ferida já lavada com gaze ou pano limpo, sem apertar.
- Retire anéis, relógio e pulseiras do membro atingido (vai inchar).
- Procure o serviço de saúde levando a caderneta de vacinação.



QUANDO PROCURAR ATENDIMENTO

Toda lesão que rompe a pele merece avaliação profissional



SERVIÇO DE SAÚDE (UBS / UPA)
No mesmo dia

- Qualquer mordedura ou arranhadura que rompeu a pele.
- Lamedura em olhos, boca ou pele já ferida.
- Qualquer contato com morcego, mesmo sem ferida visível.
- Animal desconhecido, silvestre ou que fugiu.



EMERGÊNCIA
Ligue 192 (SAMU)

- Sangramento que não para com compressão firme.
- Ferimentos no rosto, pescoço ou mãos, ou múltiplos.
- Ataque por vários cães, sobretudo em criança ou idoso.
- Palidez, suor frio, confusão: sinais de choque.



Animal agressivo solto ameaçando pessoas? Ligue 193 e não tente capturá-lo.

RAIVA: QUEM TRANSMITE

Zoonose viral pela saliva: letal após os sintomas, evitável antes deles

COMO SE TRANSMITE

- **Saliva do animal:** mordedura, arranhadura, lambedura de mucosas ou de pele ferida.
- **Pelos nervos:** o vírus caminha até o cérebro — ferimentos em cabeça, mãos e pés são mais graves.
- **Sem cura após sintomas:** a profilaxia precisa começar cedo.




Cão



Gato



Morcego



Sagui / mico



Raposa e silvestres



Bovinos e equinos

MORCEGO

Qualquer acidente com morcego é considerado grave — de qualquer espécie.

CLASSIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

A gravidade depende do local, da profundidade e do tipo de contato



SEM RISCO CONTATO INDIRETO

- Tocar ou alimentar o animal.
- Lamber em pele íntegra.
- Conduta: lavar com água e sabão; sem profilaxia.



EXPOSIÇÃO LEVE

- Mordedura ou arranhadura superficial e única.
- Em tronco ou membros, exceto mãos e pés.
- Lamber de pele com lesão superficial.



EXPOSIÇÃO GRAVE

- Cabeça, face, pescoço, mãos, dedos ou pés.
- Ferida profunda, múltipla ou extensa.
- Lamber de mucosa; qualquer acidente com morcego.



Quem classifica é o profissional de saúde. Ao público geral cabe lavar, proteger e encaminhar.

CONDUTA CONFORME O ANIMAL

Resumo do protocolo do Ministério da Saúde — decisão da equipe de saúde

Animal agressor	Exposição leve	Exposição grave
Cão ou gato sem sinais de raiva e passível de observação	Lavar + observar 10 dias; não iniciar profilaxia	Lavar + observar 10 dias; não iniciar profilaxia
Cão ou gato suspeito, morto, desaparecido ou não observável	Lavar + vacina (4 doses)	Lavar + vacina (4 doses) + soro
Morcego, sagui, raposa e outros silvestres; animais de produção	Lavar + vacina (4 doses)	Lavar + vacina (4 doses) + soro

Durante a observação, o animal adoeceu, morreu ou sumiu?

Procure imediatamente a unidade de saúde: a profilaxia será iniciada conforme a gravidade.

OBSERVAÇÃO

10 DIAS

Vale só para cão e gato. Por isso: não mate e não abandone o animal agressor.



PROFILAXIA: VACINA E SORO

Esquema pós-exposição definido e aplicado pela equipe de saúde



DIA 0

1ª dose — o quanto antes




DIA 3

2ª dose



DIA 7

3ª dose



DIA 14

4ª dose — esquema completo



VACINA

4 doses nos dias 0, 3, 7 e 14 — no músculo (deltoide; coxa em menores de 2 anos) ou intradérmica. Nunca no glúteo.



SORO (SAR OU IGHAR)

Só nas exposições graves com animal suspeito, não observável ou silvestre; infiltrado na ferida.



NÃO ABANDONE

Faltar a uma dose compromete a proteção. Guarde o cartão e siga as datas marcadas.


ABELHAS E MARIMBONDOS

Entenda o que você está vendo antes de agir



EM TRÂNSITO Enxame

- Aglomerado em galho, beiral ou poste, migrando.
- Pode ficar dias no local e seguir viagem.
- Menos defensivo — mas não se aproxime.



INSTALADA Colmeia ou ninho

- Favos em telhado, forro, muro ou caixa de luz.
- Muito defensiva: reage a ruído, vibração e aproximação.
- Remoção só por equipe treinada.

ABELHA AFRICANIZADA

Muito defensiva: ataca em massa e persegue por longas distâncias. Ao picar, deixa o ferrão com a bolsa de veneno.

MARIMBONDOS E VESPAS

Não deixam o ferrão e podem picar várias vezes. Ninhos de “papel” em beirais, forros e árvores.

AO AVISTAR UM ENXAME

Não se aproximar, não eliminar, afastar pessoas e acionar o 193

NUNCA

- Atear fogo, fazer fumaça ou jogar álcool.
- Jogar inseticida doméstico, água, pedras ou objetos.
- Tentar remover o enxame ou a colmeia por conta própria.
- Usar roçadeira, cortador de grama ou bater perto.
- Matar abelhas que se aproximam: isso atrai outras.



FAÇA

- Mantenha distância e saia da rota de voo.
- Afaste pedestres, crianças e animais domésticos.
- Isole a área e feche portas e janelas próximas.
- Acione o 193 — Corpo de Bombeiros.
- Oriente os demais até a chegada da guarnição.



Por quê? Água, veneno e fumaça agitam o enxame e podem provocar um ataque em massa.

EM CASO DE ATAQUE

Fuja, proteja o rosto e procure abrigo fechado

1

CORRA PARA LOCAL FECHADO

Casa, carro ou comércio — em linha reta, sem parar.

2

PROTEJA O ROSTO

Cubra olhos, nariz e boca com a camisa ou com as mãos.

3


NÃO PULE NA ÁGUA NEM SE ABAIXE

As abelhas esperam e voltam a atacar.

4

NÃO SE DEBATA

Nem tente matar as abelhas: isso libera o alarme do enxame.



EM LOCAL SEGURO Depois do ataque

- **Ferrões:** retire RASPANDO com a borda de um cartão — nunca com pinça ou apertando.
- **Lave** com água e sabão e aplique compressa fria.
- **Conte** e informe o número aproximado de picadas.
- **Observe** por algumas horas sinais de reação alérgica.

SINAIS DE GRAVIDADE

Alergia ou envenenamento por muitas picadas pode matar em minutos



ANAFILAXIA

Ligue 192 imediatamente

- Falta de ar, chiado ou rouquidão.
- Inchaço de lábios, língua, pálpebras ou garganta.
- Manchas vermelhas e coceira pelo corpo.
- Tontura, desmaio, pele fria e pálida.



MAIOR RISCO

Encaminhe mesmo sem sintomas

- Muitas picadas (ataque em massa).
- Picadas na boca ou na garganta.
- Crianças, idosos e cardíacos.
- Alérgico conhecido: use a adrenalina autoinjetável prescrita, se houver.



ENQUANTO O SAMU CHEGA

Falta de ar: sentada. Tontura ou fraqueza: deitada com pernas elevadas.
Inconsciente respirando: de lado.

CASO SIMULADO 1: MORDEDURA

Criança, cão desconhecido e um erro muito comum

CENÁRIO

Praça do bairro, 16h. Lucas, 8 anos, vê um cão desconhecido comendo restos perto de um banco e tenta abraçá-lo.

O cão morde o antebraço direito: laceração profunda, sangramento ativo, criança chorando. O animal recua, fica a poucos metros rosnando e ninguém sabe quem é o tutor.



PARA DISCUTIR

Você é a primeira pessoa a chegar. Qual a sequência exata de socorro?

CASO 1: RESOLUÇÃO

Sequência de socorro para o público geral

1

CENA SEGURA

Afastar a criança do cão sem correr. Não tente capturá-lo; se seguir agressivo, ligue 193.

2

SANGRAMENTO

Compressão direta e firme com pano limpo.

3

LAVAGEM

Água corrente e sabão por 15 minutos, assim que o sangramento permitir.

4

COBRIR E ACALMAR

Pano limpo sem apertar; retire relógio e pulseiras; conforte a criança.

5

ACIONAR

Ligue 192 se o sangramento não parar; senão, serviço de saúde imediatamente.

6

INFORMAR

Descreva o cão e onde estava: sem tutor, não é observável.

Análise: laceração profunda por cão desconhecido e não observável = exposição GRAVE; indicação típica de vacina + soro, a critério da equipe de saúde.

Prevenção: nunca abraçar cão desconhecido — e nunca um cão comendo.



CASO SIMULADO 2: ENXAME

Abelhas africanizadas no telhado de uma creche

CENÁRIO

Segunda-feira, 7h30. Um enxame de abelhas africanizadas se instala no telhado de uma creche, bem acima do pátio de entrada.

Pais e funcionários se aglomeram: um quer jogar água com a mangueira, outro traz inseticida e alguém sugere fazer fumaça. Dezenas de crianças estão chegando.



PARA DISCUTIR

Qual a orientação correta de isolamento e de acionamento do 193?

CASO 2: RESOLUÇÃO

Isolamento correto e acionamento do Corpo de Bombeiros

1

INTERROMPER

Ninguém joga água, inseticida, fumaça ou fogo.

2

AFASTAR

Suspenda a entrada pelo pátio; crianças por acesso alternativo.

3

ISOLAR

Feche portas e janelas daquele lado; silêncio, sem roçadeira.

4

ACIONAR O 193

Endereço, local exato do enxame, tamanho e presença de crianças.

5

AGUARDAR

Mantenha o isolamento; picados: ferrões raspados e 192 se houver alergia.



POR QUE NÃO ÁGUA, VENENO OU FOGO?

Eles agitam o enxame, liberam o feromônio de alarme e podem desencadear um ataque em massa — e fogo em telhado pode virar incêndio.

QUIZ • QUESTÃO 1 DE 5

Escolha uma alternativa — o gabarito comentado vem ao final

1

Qual é a medida de primeiros socorros mais eficaz para reduzir o risco de raiva após uma mordedura?



A

Aplicar pó de café para estancar o sangue

B

Lavar com água corrente e sabão por 15 minutos

C

Fechar a ferida com esparadrapo

D

Aguardar sintomas antes de procurar atendimento

QUIZ • QUESTÃO 2 DE 5

Escolha uma alternativa — o gabarito comentado vem ao final

2

Um cão desconhecido se aproxima rosnando. Qual é a conduta correta para o público geral?



A

Correr até um lugar seguro

B

Encarar o cão para mostrar domínio

C

Ficar imóvel como “árvore”, braços cruzados, olhando para os pés

D

Gritar e agitar os braços para espantá-lo

QUIZ • QUESTÃO 3 DE 5

Escolha uma alternativa — o gabarito comentado vem ao final

3

Uma pessoa foi mordida por um cão com tutor conhecido e sem sinais de raiva. O que fazer com o animal?



A

Sacrificá-lo imediatamente

B

Soltá-lo longe de casa

C

Nada: cão com tutor não transmite raiva

D

Mantê-lo em observação por 10 dias

QUIZ • QUESTÃO 4 DE 5

Escolha uma alternativa — o gabarito comentado vem ao final

4

Qual destas situações é classificada como exposição GRAVE à raiva?



A

Mordedura na mão

B

Lambedura em pele íntegra

C

Arranhadura superficial única na coxa

D

Alimentar um gato de rua

QUIZ • QUESTÃO 5 DE 5

Escolha uma alternativa — o gabarito comentado vem ao final

5

Um enxame de abelhas se instalou no muro de uma escola. Qual é a orientação correta?



A

Jogar água com a mangueira para dispersá-lo

B

Usar inseticida doméstico à distância

C

Fazer fumaça para afastar as abelhas

D

Afastar as pessoas, isolar a área e acionar o 193

GABARITO COMENTADO

Respostas fundamentadas nas diretrizes oficiais

Questão	Resposta	Comentário
1	B	Água corrente e sabão por 15 minutos removem saliva, vírus e bactérias (OMS; MS). Crendices contaminam a ferida.
2	C	Correr ativa a perseguição; encarar e gritar soam como desafio. A imobilidade faz o cão perder o interesse.
3	D	Cão e gato sem sinais de raiva e observáveis ficam 10 dias sob observação; seguindo saudáveis, o caso é encerrado (MS).
4	A	Mãos, pés, cabeça, face e mucosas são áreas de exposição grave: muito inervadas, levam o vírus mais rápido ao sistema nervoso.
5	D	Água, veneno e fumaça agitam o enxame e podem causar ataque em massa. A remoção é tarefa de equipe treinada: acione o 193.



5 de 5?

Você está pronto
para agir com
segurança.

