

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



TEMA 08
ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

Escorpiões, serpentes, aranhas e abelhas: primeiros socorros e combate aos mitos

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO

Material didático de apoio • Versão final



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO

BIOGRAFIA DO INSTRUTOR

Quem conduz este módulo

INSTRUTOR

1º TEN QOCBM

GERALDO

Oficial Bombeiro Militar

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco —
CBMPE

FORMAÇÃO

Engenharia Química

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

PÓS-GRADUAÇÃO

Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

Base técnica para o manejo de vítimas no ambiente pré-hospitalar

ESPECIALIDADE

APH e Resgate Operacional

Atuação prática em ocorrências de salvamento e emergência

OBJETIVOS DO MÓDULO

O que você deve saber fazer ao final desta aula

- **Reconhecer** os principais animais peçonhentos do Brasil e do Sertão pernambucano.
- **Identificar** sinais de gravidade em picadas de escorpião, serpente, aranha e abelha.
- **Aplicar** as regras de ouro do primeiro atendimento feito pelo público geral.
- **Combater** mitos e práticas caseiras que causam amputações e mortes.
- **Acionar** corretamente o socorro: 193, 192 e CIATOX (0800 722 6001).

REGRA DE OURO

Lavar, acalmar, manter em repouso e levar RÁPIDO ao hospital. O soro antiveneno só existe no hospital — nenhuma receita caseira substitui o tratamento.

PÚBLICO-ALVO

Público geral e pessoas sem treinamento: condutas simples, seguras e que não atrasam o socorro.

OS ANIMAIS PEÇONHENTOS DO MÓDULO

Quatro grupos, condutas parecidas, riscos diferentes

ARACNÍDEOS

ESCORPIÕES

- Gênero Tityus
- Principal causa de acidentes no país
- Grave em crianças

RÉPTEIS

SERPENTES

- Jararaca, cascavel, surucucu e coral
- Soro específico para cada gênero

ARACNÍDEOS

ARANHAS

- Aranha-marrom (Loxosceles)
- Armadeira (Phoneutria)

INSETOS

ABELHAS E VESPAS

- Múltiplas picadas = envenenamento
- Alérgicos: risco de anafilaxia

Atenção: os acidentes por escorpião são hoje os mais notificados entre os acidentes por animais peçonhentos no Brasil — e a casa é o principal local de ocorrência.

PEÇONHENTO × VENENOSO

Uma diferença simples que orienta a conduta

CONCEITO 1

PEÇONHENTO

- Produz veneno E possui estrutura para injetá-lo: presas, ferrão ou quelíceras.
- Exemplos: serpentes peçonhentas, escorpiões, aranhas, abelhas e vespas.

CONCEITO 2

VENENOSO

- Produz veneno, mas NÃO tem como injetá-lo.
- Intoxica por contato ou ingestão. Exemplos: sapo-cururu, baiacu.

FOCO DESTE MÓDULO: ANIMAIS PEÇONHENTOS

O veneno é inoculado ativamente na vítima — por isso o tempo até o soro no hospital é decisivo.

ESCORPIONISMO: ESPÉCIES

Gênero Tityus — os escorpiões de importância médica no Brasil

Tityus serrulatus

ESCORPIÃO-AMARELO

- Tronco escuro; patas e cauda amarelas
- Serrilha no dorso da cauda
- Reproduz sem macho — se espalha rápido nas cidades

Tityus bahiensis

ESCORPIÃO-MARROM

- Tronco marrom-escuro
- Patas com manchas escuras
- Frequente no Sul e Sudeste

Tityus stigmurus

AMARELO DO NORDESTE

- Faixa escura ao longo do dorso
- Espécie mais comum em Pernambuco
- Já causou óbitos infantis no estado

Onde se escondem: entulho, tijolos, madeira empilhada, ralos, esgoto, frestas de parede — e dentro de casa, em calçados, roupas, toalhas e camas.

ESCORPIÃO: SINTOMAS E GRAVIDADE

Sintomas locais e sistêmicos — reconheça a evolução

LEVE

SÓ SINTOMAS LOCAIS

- Dor intensa no local
- Formigamento, vermelhidão e suor local

MODERADO

SINAIS SISTÊMICOS ISOLADOS

- Dor intensa + náuseas
- Vômitos ocasionais, suor, agitação
- Coração e respiração acelerados

GRAVE

RISCO DE MORTE

- Vômitos repetidos e profusos
- Suor generalizado, sonolência ou agitação
- Arritmia, choque, edema pulmonar

SINAL DE ALERTA

Vômitos repetidos após picada de escorpião indicam envenenamento grave: socorro IMEDIATO.

ESCORPIÃO: GRUPOS DE RISCO

Gravidade crítica em crianças menores de 7 anos e idosos

IDADE DE MAIOR RISCO

< 7 ANOS

Menor peso corporal para a mesma quantidade de veneno. A evolução pode ser rápida — nas primeiras horas.

- **Choque cardiogênico:** o veneno sobrecarrega o coração, que deixa de bombear sangue de forma eficaz.
- **Edema agudo de pulmão:** líquido nos pulmões, falta de ar grave — principal causa de óbito.
- **Idosos e cardiopatas:** também têm menor reserva e maior risco de complicações.

CRIANÇA PICADA POR ESCORPIÃO

Levar SEMPRE e IMEDIATAMENTE ao hospital, mesmo que pareça bem nos primeiros minutos.

ESCORPIÃO: PRIMEIRO ATENDIMENTO

Condutas para o público geral, sem treinamento

1

Lavar o local com água e sabão.

2

Compressa morna no local para aliviar a dor.

3

Acalmar a vítima e mantê-la em repouso.

4

Levar ao serviço de saúde — crianças e idosos: imediatamente.

5

Fotografar o animal à distância, só se for seguro.

NÃO FAZER

Espremer, cortar, furar ou sugar o local.
Não aplicar álcool, querosene, alho ou "remédios" caseiros.

ACIONE

193 Bombeiros • 192 SAMU • CIATOX
0800 722 6001 (24 h)

PREVENÇÃO DO ESCORPIONISMO

A melhor conduta é evitar o acidente

DENTRO DE CASA

- Sacudir calçados, roupas e toalhas antes de usar
- Afastar camas e berços da parede
- Telar ralos e vedar frestas e rodapés
- Não andar descalço à noite

QUINTAL E TRABALHO

- Manter o quintal limpo, sem entulho e lixo
- Usar luvas e botas ao mexer em madeira e tijolos
- Examinar frestas antes de pôr a mão
- Guardar alimentos e lixo fechados

CONTROLE AS BARATAS

Baratas são o principal alimento do escorpião — onde há barata, há escorpião.

OFIDISMO: OS 4 GÊNEROS

As serpentes peçonhentas de importância médica no Brasil

Gênero	Nome popular	Ação do veneno	Sinais principais
Bothrops	Jararaca, jararacuçu, urutu	Local e hemorrágica	Dor imediata, inchaço, manchas roxas, sangramentos
Crotalus	Cascavel	Neurotóxica e muscular	Pouca dor; visão turva, pálpebras caídas, urina escura
Lachesis	Surucucu, pico-de-jaca	Local + vagal	Como a jararaca + diarreia, pressão baixa, choque
Micrurus	Coral-verdadeira	Neurotóxica	Pálpebras caídas, dificuldade de engolir, paralisia respiratória

≈ **85%** dos acidentes ofídicos com serpente identificada: jararacas (Bothrops).

JARARACA E SURUCUCU

Venenos de ação local intensa, com dor e inchaço

BOTHROPS

JARARACA

- Dor imediata e inchaço que avança pelo membro
- Manchas roxas, bolhas, sangramento na gengiva ou no local
- Complicações: necrose, infecção e falência dos rins

LACHESIS

SURUCUCU

- Maior serpente peçonhenta das Américas (matas úmidas)
- Quadro local semelhante ao da jararaca
- Síndrome vagal: cólicas, diarreia, pressão baixa, pulso lento, choque

EM COMUM

Veneno de ação local intensa: retire anéis e calçados cedo — o inchaço pode ser rápido.

CASCADE E CORAL-VERDADEIRA

Venenos neurotóxicos: pouca dor local, alto risco

CROTALUS

CASCADE

- Chocalho na cauda; comum em áreas abertas e secas, como o Sertão
- Pouca dor e pouco inchaço no local
- Visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dores musculares
- Urina escura: risco de falência dos rins

MICRURUS

CORAL-VERDADEIRA

- Anéis coloridos (vermelho, preto e branco ou amarelo)
- Quase nenhuma reação no local
- Pálpebras caídas, dificuldade para engolir, fraqueza
- Pode evoluir para paralisia respiratória aguda

PERIGO ESCONDIDO

Ausência de dor NÃO significa ausência de veneno — o quadro neurotóxico pode piorar em poucas horas.

IDENTIFICAÇÃO: SINAIS E ARMADILHAS

Como reconhecer — e quando não arriscar

ARMADILHAS — NÃO CONFIE

- "Cabeça triangular" não é regra segura para saber se é peçonhenta
- Falsas-coraís são quase idênticas às verdadeiras
- Serpente morta ou decapitada ainda pode picar por reflexo
- Filhotes também injetam veneno

SINAIS QUE AJUDAM

- Fosseta loreal (orifício entre olho e narina): jararaca, cascavel e surucucu
- Chocalho ou guizo na ponta da cauda: cascavel
- Escamas eriçadas na ponta da cauda: surucucu
- Anéis coloridos: trate TODA coral como verdadeira

IDENTIFICAR AJUDA, MAS NÃO É OBRIGATÓRIO

A equipe de saúde define o soro pelos sinais clínicos. Nunca atrase o transporte tentando capturar ou matar o animal.

O QUE FAZER: PICADA DE SERPENTE

Sete passos para o público geral

1

Afastar a vítima do animal e acalmá-la.

2

Lavar o local com água e sabão.

3

Repouso absoluto: deitada, sem andar, membro elevado e estendido.

4

Retirar cedo anéis, pulseiras, relógio e calçados.

5

Hidratar: oferecer água se estiver consciente, sem forçar.

6

Fotografar o animal à distância, sem tocar.

7

Ligar 193 / 192 e levar **IMEDIATAMENTE** ao hospital com soro.

TEMPO É TECIDO

Soro nas primeiras horas reduz sequelas e mortes.

O QUE NUNCA FAZER

Combate rigoroso às práticas que mutilam e matam

✗ PROIBIDO

TORNIQUETE OU GARROTE

Prende o veneno no membro: necrose, gangrena e amputação.

✗ PROIBIDO

CORTAR OU FURAR O LOCAL

Não retira veneno; provoca sangramento e infecção.

✗ PROIBIDO

CHUPAR O VENENO

Não funciona, contamina a ferida e expõe quem socorre.

✗ PROIBIDO

BORRA DE CAFÉ, QUEROSENE, FOLHAS

Causam infecção e tétano — e atrasam o socorro.
Nada de álcool.


MITOS × VERDADES

O que o povo repete — e o que a ciência mostra

MITO	VERDADE
"O garrote impede o veneno de subir."	Concentra o veneno e mata o tecido: causa gangrena e amputação.
"Cortar e chupar tira o veneno."	Não remove veneno; aumenta sangramento e infecção.
"Cachaça, querosene ou fumo curam."	Pioram o quadro e atrasam a ida ao hospital.
"Borra de café ou alho no local ajudam."	Contaminam a ferida — risco de infecção e tétano.
"Picada sem dor não é grave."	Cascavel e coral quase não doem e podem matar.
"Filhote de cobra é inofensivo."	Filhotes injetam veneno e causam acidentes graves.
"Cobra morta não pica."	O reflexo de bote persiste por um tempo após a morte.

POR QUE O TORNIQUETE É PROIBIDO

Uma sequência que termina em amputação



POR QUE PIORA

Venenos de jararaca e surucucu destroem o tecido no local. Prender a circulação multiplica o dano e não impede a ação do veneno no organismo.

CONDUTA CORRETA

Repouso, membro elevado e estendido, retirar adornos e transporte rápido ao hospital para receber o soro.

SORO ANTIVENENO

O único tratamento específico — e ele está no hospital

Acidente	Soro específico
Jararaca (botrópico)	Antibotrópico (pentavalente)
Surucucu (laquético)	Antibotrópico-laquético
Cascavel (crotálico)	Anticrotálico
Coral (elapídico)	Antielapídico
Escorpião	Antiescorpiônico ou antiaracnídico
Armadeira	Antiaracnídico
Aranha-marrom	Antiloxoscélico ou antiaracnídico

ONDE SE APLICA O SORO

HOSPITAL

Aplicado apenas por equipe de saúde, com monitoramento de reações. Nem todo caso precisa de soro: a decisão é médica.

ARANHAS: MARROM E ARMADEIRA

Reconhecimento dos sintomas e conduta inicial

LOXOSCELES

ARANHA-MARROM

- Pequena, não agressiva; esconde-se em roupas, toalhas e atrás de móveis
- Picada quase indolor; após 12–24 h: dor, bolha e mancha "marmórea"
- Pode evoluir para ferida necrótica e urina escura

PHONEUTRIA

ARMADEIRA

- Agressiva: ergue as patas dianteiras para atacar
- Vive em bananeiras, entulho, calçados
- Dor imediata e intensa; suor e coração acelerado
- Crianças: vômitos indicam gravidade

CONDUTA

Lavar com água e sabão, compressa morna (armadeira) e levar ao serviço de saúde. Aranha-marrom: procurar atendimento mesmo com pouca dor.

ABELHAS E VESPAS

Do inchaço local ao choque anafilático

NÍVEL 1

REAÇÃO LOCAL

- Dor, vermelhidão e inchaço no local
- Compressa fria e observação

NÍVEL 2

MÚLTIPLAS PICADAS

- Dezenas ou centenas de ferroadas
- Envenenamento: lesão muscular e dos rins
- Levar ao hospital sempre

NÍVEL 3

ALERGIA / ANAFILAXIA

- UMA picada pode matar um alérgico
- Evolução em minutos
- Ligar 193 / 192 imediatamente

RETIRADA DOS FERRÕES

Raspar de lado com um cartão ou lâmina sem fio, sem demora. Não pinçar com os dedos: espreme a bolsa de veneno.

ANAFILAXIA: RECONHECER E AGIR

Reação alérgica grave — minutos contam

PELE

Placas vermelhas pelo corpo, coceira, inchaço de lábios, olhos e língua

RESPIRAÇÃO

Chiado, falta de ar, rouquidão, sensação de garganta fechando

1

Ligar 193 / 192 imediatamente.

2

Adrenalina autoinjetável: se a pessoa tiver uma prescrita, ajude-a a usar na coxa.

3

Posicionar: deitada com pernas elevadas; com falta de ar, sentada.

4

Vigiar a respiração: se parar, iniciar RCP.

CIRCULAÇÃO


Tontura, desmaio, pele pálida e fria, pulso fraco

DIGESTIVO

Vômitos, cólica, diarreia

FLUXO DE DECISÃO

Da picada ao hospital, sem perder tempo



ACIONAMENTO DO SOCORRO

Números que todo cidadão deve saber

BOMBEIROS

193

Salvamento, resgate e primeiro socorro

SAMU

192

Atendimento médico de urgência

CIATOX / DISQUE-INTOXICAÇÃO

0800 722 6001

Orientação toxicológica 24 h, gratuita

AO LIGAR, INFORME

- Endereço exato e ponto de referência
- Tipo de animal (ou foto) e horário da picada
- Idade da vítima e o que ela está sentindo agora

CASO 1: CRIANÇA E ESCORPIÃO

Menor de 7 anos: prioridade máxima

CASO SIMULADO 1

Escorpião no tênis

Criança de 5 anos é picada por escorpião-amarelo no pé ao calçar o tênis no quarto. Choro desesperado e dor intensa.

Quais passos imediatos a família deve adotar?

1

Retirar o tênis e afastar a criança do local com calma.

2

Lavar com água e sabão e aplicar compressa morna.

3

Ligar 193 / 192 e levar IMEDIATAMENTE ao hospital.

4

Observar no trajeto: vômitos, suor, sonolência, falta de ar.

5

Não aplicar nada no local; foto do escorpião só se for seguro.

CASO 2: AGRICULTOR E JARARACA

Como corrigir um socorro errado no local

CASO SIMULADO 2 Agricultor é picado por jararaca na perna. Um colega quer amarrar uma corda na coxa e fazer cortes para "drenar o sangue". Como intervir?

INTERVIR: IMPEDIR COM FIRMEZA

- Nada de corda ou torniquete: risco de gangrena e amputação
- Nada de cortes: o veneno da jararaca altera a coagulação e o sangramento piora
- Nada de sugar ou aplicar substâncias no local

CONDUTA CORRETA

- Acalmar e deitar o agricultor — ele não deve caminhar
- Lavar com água e sabão; perna elevada e estendida
- Retirar bota e adornos; água se consciente
- Ligar 193 / 192 e transportar ao hospital com soro

QUIZ • QUESTÃO 1 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 1 Criança de 5 anos picada por escorpião em casa. Qual a conduta correta?

A

Espremer o local para retirar o veneno

B

Lavar com água e sabão, compressa morna e levar imediatamente ao hospital

C

Aguardar 6 horas para ver se surgem sintomas

D

Aplicar álcool e oferecer chá calmante

QUIZ • QUESTÃO 2 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 2 Por que o torniquete é proibido em picada de serpente?

A

Porque só funciona em picadas nas mãos

B

Porque atrasa a chegada do soro ao local

C

Porque concentra o veneno no membro e pode levar a necrose, gangrena e amputação

D

Porque só é permitido em picada de cascavel

QUIZ • QUESTÃO 3 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 3 Serpente com chocalho na cauda. A vítima tem pálpebras caídas, visão turva, urina escura e pouca dor local. Qual o gênero?

- | | | | |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------|
| A | Bothrops (jararaca) | B | Crotalus (cascavel) |
| C | Lachesis (surucucu) | D | Micrurus (coral-verdadeira) |

QUIZ • QUESTÃO 4 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 4 Qual serpente pode causar paralisia respiratória aguda, mesmo com pouca reação no local?

A

Coral-verdadeira (Micrurus)

B

Jararaca (Bothrops)

C

Surucucu (Lachesis)

D

Jiboia (não peçonhenta)

QUIZ • QUESTÃO 5 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 5 Após várias picadas de abelha, a vítima tem lábios inchados, chiado no peito e tontura. O que fazer?

A

Dar remédio caseiro e esperar melhorar

B

Pinçar todos os ferrões antes de qualquer outra ação

C

Ligar 193 / 192, posicionar a vítima e ajudar a usar adrenalina autoinjetável se prescrita

D

Aplicar gelo e liberar a vítima para casa

GABARITO COMENTADO (1 A 3)

Fundamentado nas diretrizes oficiais

Q1

B

Água e sabão e compressa morna são as condutas indicadas; criança menor de 7 anos tem alto risco de evolução grave e deve ir imediatamente ao hospital.

Q2

C

O garrote prende o veneno no membro e interrompe a circulação: necrose, gangrena e amputação. O Ministério da Saúde contraindica seu uso.

Q3

B

Chocalho, pouca dor local, quadro neurológico (face miastênica, visão turva) e urina escura são típicos do acidente crotálico.

GABARITO COMENTADO (4 E 5)

Fundamentado nas diretrizes oficiais

Q4

A

O veneno da coral-verdadeira é neurotóxico e pode paralisar os músculos da respiração com mínima reação local.

Q5

C

Os sinais indicam anafilaxia: emergência de minutos. Acionar o socorro, posicionar e usar adrenalina autoinjetável se prescrita.

PARA FIXAR

Em todos os casos: não aplicar nada no local, não fazer garrote e levar rapidamente ao hospital. Na dúvida, ligue 193, 192 ou 0800 722 6001.

REGRAS DE OURO

O resumo que salva vidas

1

LAVE

água e sabão

2

ACALME

repouso total

3

ELEVE

o membro, estendido

4

RETIRE

anéis e calçados

5

LEVE

ao hospital: 193 / 192

✗ NUNCA

Torniquete • cortar • chupar • borra de café, querosene, folhas ou álcool

O soro antiveneno está no hospital — cada minuto conta.

ACIDENTE COM ANIMAL PEÇONHENTO — LIGUE PRIMEIRO PARA O CIATOx 0800 722 6001 • orientação médica 24 h, ligação gratuita

ONDE BUSCAR O SORO EM PERNAMBUCO

Região Metropolitana e Zona da Mata — a rede de referência

ACIDENTE COM ANIMAL PEÇONHENTO — LIGUE PRIMEIRO PARA O CIATOx 0800 722 6001 • orientação médica 24 h, ligação gratuita



REGIÃO METROPOLITANA E ZONA DA MATA

- Hospital da Restauração (HR) — Recife
- Hospital Jaboatão/Prazeres — Jaboatão
- Hospital João Murilo — Vitória de Santo Antão
- Hospital Belarmino Correia — Goiana

Soros da rede: antiescorpiônico • antiofídico (cobras) • antiaracnídico (aranhas)

Em caso de acidente, procure atendimento médico o mais rápido possível.

AGRESTE E SERTÃO — ONDE ESTÁ O SORO

Caruaru • Arcoverde • Petrolina • Serra Talhada • Salgueiro • Ouricuri

+ RECIFE
Hospital da Restauração (HR)
Referência para acidentes por:
 Cobras
 Escorpiões
 Aranhas

+ AGRESTE E SERTÃO
 **Hospital Mestre Vitalino — Caruaru**
• Cobras e escorpiões
 **Hospital Regional Ruy de Barros Correia — Arcoverde**
• Cobras e escorpiões
 **Hospital Professor Agamenon Magalhães — Serra Talhada**
• Cobras e escorpiões
 **Hospital Regional Inácio de Sá — Salgueiro**
• Cobras e escorpiões
 **Hospital Regional Fernando Bezerra — Ouricuri**
• Cobras e escorpiões

+ REGIÃO METROPOLITANA E ZONA DA MATA
 **Hospital Jaboatão Prazeres — Jaboatão**
• Soro antiescorpiônico
 **Hospital João Murilo — Vitória de Santo Antão**
• Soro antiescorpiônico
 **Hospital Belarmino Correia — Goiana**
• Soro antiescorpiônico

+ PETROLINA
 **Hospital Universitário (HU-UNIVASF)**
• Cobras
• Escorpiões
• Aranhas
 **Hospital Dom Malan**
• Cobras
• Escorpiões
• Aranhas

 Cobras
 Escorpiões
 Aranhas

ATENÇÃO
A disponibilidade de soros e a referência para atendimento podem mudar conforme a organização da rede de saúde e o estoque disponível.
Em caso de acidente, procure atendimento médico o mais rápido possível.
 Não fazer torniquete.
 Não fazer cortes.
 Não fazer sucção.
 Não aplicar substâncias sobre o local da picada.

Medicina Extrema — Medicina de Áreas Remotas

Fontes: Ministério da Saúde / Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

AGRESTE E SERTÃO

- Hospital Mestre Vitalino — Caruaru
- Hospital Ruy de Barros Correia — Arcoverde
- HU-UNIVASF — Petrolina
- Hospital Dom Malan — Petrolina
- Hospital Prof. Agamenon Magalhães — Serra Talhada
- Hospital Regional Inácio de Sá — Salgueiro
- Hospital Regional Fernando Bezerra — Ouricuri

Soros da rede: antiescorpiônico • antiofídico (cobras) • antiaracnídico (aranhas)

A disponibilidade de soros e a referência para atendimento podem mudar conforme a organização da rede de saúde e o estoque disponível.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR!

193 (BOMBEIROS) • 192 (SAMU) • CIATOx 0800 722 6001

1º TEN QOCBM GERALDO — Instrutor • CAT SERTÃO