

増加する中咽頭がん

重症化のケース解明

世界的に患者が増えている「中咽頭がん」について、浜松医科大学医学部付属病院耳鼻咽喉科の三澤清病院准教授(左)を中心とする研究グループが、重症化しやすい遺伝子の異常を突き止めた。治療法の最適化や新たな創薬につながると期待される。研究成果は二十三日、国際学術誌「サイエンティフィック・リポート」に掲載された。

(鎌倉優太)



三澤清
病院准教授

浜医大・三澤病院准教授

重症化を判断、最適な治療法につなげる



異常な遺伝子を発見

研究のイメージ図



患者の血液からDNAを採取・解析

口や鼻、のどといった顔から首にできるがんを頭頸部がんといい、喫煙量や飲酒量の減少により患者数も減る傾向にある。一方、のど

の奥の部分にできる中咽頭がんはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によっても発症するため、頭頸部がんの中で唯一、増加傾向が続いている。

研究グループは浜医大で治療を受けた中咽頭がんの患者七十五人の症例を分析。血液から採取したDNAを調べたところ「GHSR」と「NMUR1」という

二つの遺伝子のいずれかが異常化していた場合、平均して六割ほどだった診断後五年間の生存率が17%まで落ち込むことが分かった。

HPVは子宮頸がんの原因として知られるが、中咽頭がんの原因だとはあまり知られていない。対策にはワクチン接種が有効とされる。しかし、接種後に強い痛みが続くといった副反応を訴える声が相次ぎ、国は二〇一三年六月、対象者に接種を促すことをやめた。七割だった接種率は1%未満に激減している。

三澤病院准教授によると、浜医大でも喫煙に比べてHPV感染が原因とみられる中咽頭がん患者の受診が増えているといい、「今後、さらに急増する可能性もある。早期に中咽頭がんを発見できる検査キットの開発や、臨床試験を通じた創薬につなげたい」と語った。