

# Numerical Optimization 2024 - Homework 6

Aral Cincim, k11720457

*Artificial Intelligence, JKU Linz*

May 15, 2024

## Problem 1.

SR1 algorithm:

Given starting point  $x_0$ , initial Hessian approx.  $B_0$ ,  
trust region radius  $\Delta_0$ , tolerance  $\epsilon > 0$ ,  
parameters  $\eta \in (0, 10^{-3})$  and  $r \in (0, 1)$ ;  
 $k \leftarrow 0$ ;

**while**  $\|\nabla f(x_k)\| > \epsilon$ ;

    Compute  $s_k$  by solving the subproblem

$$\min_s \nabla f_k^T s + \frac{1}{2} s^T B_k s \quad \text{s.t.} \quad \|s\| \leq \Delta_k; \quad (1)$$

    Compute

$$y_k = \nabla f(x_k + s_k) - \nabla f_k,$$

$$\text{ared} = f(x_k) - f(x_k + s_k),$$

$$\text{pred} = -\left(\nabla f_k^T s_k + \frac{1}{2} s_k^T B_k s_k\right),$$

**if**  $\text{ared}/\text{pred} > \eta$ ;

**else**  $x_{k+1} = x_k$ ;

**end (if)**

**if**  $\text{ared}/\text{pred} > 0.75$

**if**  $\|s_k\| \leq 0.8\Delta_k$

$$\Delta_{k+1} = \Delta_k;$$

**else**

$$\Delta_{k+1} = 2\Delta_k;$$

**end (if)**

**elif**  $0.1 < \text{ared}/\text{pred} \leq 0.75$

$$\Delta_{k+1} = \Delta_k;$$

**else**

$$\Delta_{k+1} = 0.5\Delta_k;$$

**end (if)**

```

if (6.26) holds
    Use (6.24) to compute  $B_{k+1}$  (even if  $x_{k+1} = x_k$ );
else
     $B_{k+1} \leftarrow B_k$ ;
end (if)
 $k \leftarrow k + 1$ ;
end (while)

```

(6.26):

$$|s_k^T(y_k - B_k s_k)| \geq r \|s_k\| \|y_k - B_k s_k\| \quad (2)$$

(6.24):

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(y_k - B_k s_k)^T}{(y_k - B_k s_k)^T s_k} \quad (3)$$

Function to minimize:

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - b^T x \quad (4)$$

$$B_0 = H_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p_0 = -H_0 \nabla f(x_0) = (1, 1)^T$$

$$x_1 = x_0 + p_0 = (1, 1)^T$$

$$\nabla f(x_1) = (0.5, -0.16)^T$$

$$y_0 = (1.5, 0.83)^T$$

$$s_0 = (1, 1)^T$$

$$B_1 = B_0 + \frac{(y_0 - B_0 s_0)(y_0 - B_0 s_0)^T}{(y_0 - B_0 s_0)^T s_0}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{\begin{bmatrix} 0.25 & -0.083 \\ -0.083 & 0.027 \end{bmatrix}}{0.334}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & 0.08 \end{bmatrix}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1.75 & -0.25 \\ -0.25 & 1.08 \end{bmatrix}$$

$$H_1 = B_1$$

$$p_1 = -H_1 \nabla f(x_1)$$

$$p_1 = \begin{bmatrix} -1.75 & 0.25 \\ 0.25 & -1.08 \end{bmatrix} (0.5, -0.16)^T$$

$$p_1 = \begin{bmatrix} -0.915 \\ 0.298 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = x_1 + p_1$$

$$x_2 = (1, 1)^T + \begin{bmatrix} -0.915 \\ 0.298 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 0.085 \\ 1.298 \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(x_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.085 \\ 1.298 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(x_2) = \begin{bmatrix} 0.085 \\ 1.298 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(x_2) = \begin{bmatrix} -0.915 \\ 0.298 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = \begin{bmatrix} -0.915 \\ 0.298 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.085 \\ 1.298 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = \begin{bmatrix} -0.83 \\ 1.596 \end{bmatrix}$$

$$s_1 = \begin{bmatrix} -0.915 \\ 0.298 \end{bmatrix}$$

$$B_2 = B_1 + \frac{(y_1 - B_1 s_1)(y_1 - B_1 s_1)^T}{(y_1 - B_1 s_1)^T s_1}$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1.75 & -0.25 \\ -0.25 & 1.08 \end{bmatrix} + \frac{\begin{bmatrix} 0.64 & 0.8 \\ 0.8 & 1 \end{bmatrix}}{-0.434}$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1.75 & -0.25 \\ -0.25 & 1.08 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1.5 & -1.8 \\ -1.8 & -2.3 \end{bmatrix}$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} 0.25 & -2.05 \\ -2.05 & -1.22 \end{bmatrix}$$