

Práctica 6

Subgrupo AA_1

- Canales Díaz-Peco, Victoria
- Aranburu López, Uxue

Ejercicio 1

1. Hipótesis:

$H_0: \mu = 1,65$; $H_1: \mu \neq 1,65$

2. Supuestos:

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Altura (metros)	,135	12	,200 [*]	,956	12	,723

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se mantiene la normalidad de la población de la variable altura.

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 1.65

	t	gl	Significación		Diferencia de medias	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
			P de un factor	P de dos factores		Inferior	Superior
Altura (metros)	,451	11	,331	,661	,01083	-,0421	,0637

3.

Estadístico de contraste

$$T = 0,451$$

4. Distribución muestral:

T se distribuye según t_{11} .

5. Nivel crítico:

$$P = 0,661$$

6. Decisión:

Como p (0,661) es mayor que α (0,05), se mantiene la hipótesis.

EJERCICIO 2

