



BRGM / Direction de l'Eau

Orléans, le 10 avril 2026

Bulletin de situation des nappes d'eau souterraine au 1^{er} avril 2026

Avec 84% des niveaux des points d'observation autour ou au-dessus de la normale, la situation des nappes phréatiques est satisfaisante. On observe cependant une amorce de vidange sur les nappes les plus réactives.

Résumé

Une amorce de vidange sur les nappes réactives avec des niveaux satisfaisants

Suite à la recharge exceptionnelle de février 2026 et un déficit pluviométrique observé en mars, plus de la moitié des niveaux des nappes phréatiques sont à la baisse. Sur l'ensemble du territoire le déficit de pluies efficaces en mars a entraîné le début d'une vidange des nappes réactives. Un tiers des nappes continue malgré tout à avoir une recharge active et bénéficie encore des impacts bénéfiques des pluies de février.

Le niveau des nappes reste satisfaisant pour la plupart d'entre elles, autour de la normale et de modérément haut à très haut. 62% des points d'observation ont un niveau au-dessus des normales mensuelles. Cette situation est meilleure que celle de mars 2025 (52% des points d'observation au-dessus des normales mensuelles).

Seules trois nappes ont encore des niveaux modérément bas, les nappes présentes dans les édifices volcaniques du Massif Central, la nappe des grès Vosgiens et calcaires triasiques et les calcaires carbonifères de l'Avesnois.


Le bilan provisoire de la recharge hivernale 2025-2026 permet d'espérer des niveaux satisfaisants sur une grande partie des nappes réactives pour le trimestre prochain. Cependant, des incertitudes existent concernant l'efficacité des pluies du mois d'avril, avec la reprise de la végétation et l'augmentation progressive des demandes en eau pour satisfaire les différents usages notamment agricoles. Les prévisions à plus long terme restent incertaines.

Tendances d'évolution

Après une recharge exceptionnelle en février, les tendances pour le mois de mars sont plus contrastées. Les pluies du mois de mars ont été déficitaires, bien en-dessous des normales pour ce mois, sur l'ensemble du territoire à l'exception du pourtour méditerranéen et d'un secteur au nord-est du Bassin parisien où les pluies ont été excédentaires par rapport à la normale.

Ainsi, une grande majorité des nappes ont commencé leur vidange.

En mars 2026, la vidange s'opère sur les 54% des points d'observation avec des niveaux en baisse. La recharge est comparable à celle de 2025 pour ce mois de mars.



Nappes inertielles

En mars 2026, les précipitations de février ont été excédentaires permettant à la recharge de se généraliser aux nappes très inertielles de Normandie, du centre du Bassin parisien, de l'Artois, le couloir Rhône Saône et les calcaires de l'Armagnac : les tendances sont encore à la hausse pour ces nappes. Seules la nappe de Beauce et la nappe de Brie ont commencé à baisser.

Nappes réactives

Après la recharge exceptionnelle du mois de février, le déficit de pluie du mois de mars a eu pour effet d'amorcer la vidange des nappes les plus réactives qui avaient des niveaux hauts à très hauts. C'est le cas des nappes du socle armoricain ou du socle limousin, des nappes des calcaires jurassiques du grand sud et sud-ouest et des nappes alluviales (y compris du littoral corse) à l'exception de la nappe alluviale de l'est Lyonnais et la nappe alluviale du Rhin sud.


Concernant les nappes du pourtour méditerranéen, à la faveur des pluies conséquentes du mois de mars, la recharge se poursuit ou se stabilise pour les nappes des Pyrénées orientales, les nappes alluviales de l'Aude, du Rhône et des fleuves côtiers de la côte d'azur, la nappe de la Vistrenque et celle des calcaires karstifiés de Provence. La nappe des alluvions de l'Hérault et la nappe des calcaires des Grands Causses entament quant à elles, leur vidange.

Situation des nappes

Grâce à des niveaux exceptionnellement hauts au 1^{er} mars, les niveaux actuels sont encore satisfaisants.

Fin mars 2026, les niveaux des nappes sont satisfaisants et souvent excédentaires : 16% des points d'observation sont sous les normales mensuelles, 22% sont comparables et 62% sont au-dessus (respectivement 18%, 15% et 67% en février).

La situation actuelle est meilleure que celle de mars 2025 avec 52% des niveaux qui étaient au-dessus des normales mensuelles. La situation est meilleure en 2026 pour toutes les nappes réactives mais est plus dégradée pour les nappes inertielles.



Nappes inertielles

Les pluies de février continuent de recharger les nappes inertielles. L'infiltration de ces eaux de pluies est lente pour ce type de nappes. Leur niveau se situe autour de la moyenne pour l'ensemble des nappes de la craie normande, de l'Artois, du Bassin parisien, du couloir Rhône Saône et du Sundgau. La nappe des calcaires de Beauce et la nappe des calcaires de l'Armagnac atteignent un niveau modérément haut.

Il est à noter que des disparités locales peuvent exister au sein de ces nappes.

Nappes réactives

La situation des nappes réactives est satisfaisante sur l'ensemble du territoire. La recharge exceptionnelle de février a permis d'atteindre des niveaux bien au-dessus des normales mensuelles. Malgré un début de vidange ces nappes restent à des niveaux autour de la moyenne ou au-dessus.

Des niveaux très hauts sont encore observés dans les nappes alluviales de la Garonne, de l'Aude, du Rhône, de l'Hérault, de la plaine du Roussillon et de la Vistrenque.

Des niveaux hauts sont observés sur les nappes des calcaires à l'ouest du Massif Central et sur la nappe des calcaires des Grands Causses.

Au nord-est, la recharge a été moins conséquente. Les nappes très réactives des calcaires situées à l'ouest de la Lorraine et dans le Jura ainsi que les nappes de la plaine d'Alsace atteignent des niveaux proches des normales à modérément hauts. La nappe des grès de l'est de la Lorraine est moins réactive aux pluies et reste à des niveaux modérément bas.

Prévisions

Les [prévisions saisonnières de Météo-France](#) sur les mois d'avril, mai et juin 2026 privilégient des températures plus élevées sur l'ensemble du territoire. Aucun scénario concernant les précipitations n'est privilégié.

Les tendances et l'évolution des situations des nappes sur les prochaines semaines dépendront exclusivement des pluies infiltrées, et donc des cumuls pluviométriques, du temps de réponse de la nappe (réactivité / inertie) et des besoins de la végétation qui se réveille de sa période de dormance hivernale.

Le réveil de la végétation, en lien avec les températures élevées, devrait limiter l'infiltration des pluies en profondeur. La période de recharge pourrait alors se terminer dès le mois d'avril et la période de vidange se généraliser à l'ensemble des nappes réactives.

Nappes inertielles

La situation des nappes inertielles (Artois, Bassin parisien, Sundgau et couloir Rhône-Saône) dépend de l'état à l'étiage précédent et des pluies efficaces cumulées sur l'ensemble de la période de recharge.

La recharge devrait se poursuivre ou se stabiliser en avril pour les nappes inertielles du Sundgau (sud Alsace) et du couloir Rhône-Saône, avec l'infiltration lente des pluies de février. Les situations pourraient alors encore s'améliorer ou rester stables, selon les volumes d'eau infiltrés.

Des incertitudes relatives à la fin de la période de recharge et à l'efficacité des pluies du printemps subsistent. Les prévisions pour l'été 2026 sont incertaines. Les niveaux seront assurément plus bas que ceux de 2025, du fait d'une recharge 2025-2026 plus modérée.

Nappes réactives

Le bilan provisoire de la recharge hivernale 2025-2026 permet d'espérer des niveaux satisfaisants sur une grande partie des nappes réactives pour le trimestre prochain. Concernant les nappes réactives affichant des niveaux très excédentaires, de hauts à très hauts, les prévisions saisonnières sont optimistes.

Fin mars, la vidange s'amorce sur les nappes réactives mais de nombreux niveaux demeurent modérément haut à très hauts notamment dans le sud, sud-ouest et ouest du territoire.

Cependant, des incertitudes existent concernant l'efficacité des pluies du printemps, avec la reprise de la végétation, et concernant les besoins en eau. Les pluies du printemps seront essentielles pour conserver des niveaux au-dessus des normales le plus tardivement possible. Les nappes réactives peuvent se vidanger en quelques semaines, en cas de sécheresse prolongée et intense. Ainsi, les prévisions à plus long terme, notamment pour la fin de l'été 2026 et la période d'étiage, restent incertaines.

Ce bulletin de situation des nappes a été réalisé avec la contribution de : APRONA, BRGM, Conseil Départemental de la Vendée, Conseil Départemental des Landes, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DREAL Grand Est, EPTB Vistre Vistrenque, Parc Naturel Régional des Grandes Causses, Syndicat Mixte d'Etudes et de Travaux de l'Astien (SMETA), Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon (SMNPR).



À propos du BRGM

En tant que Service géologique national, le **BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)** est l'établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Il est placé sous la tutelle des ministères en charge de la Recherche, de l'Écologie et de l'Économie. Partenaire de nombreux acteurs publics et privés, le BRGM conjugue recherche scientifique, appui aux politiques publiques et coopération internationale.


Plus d'informations sur www.brgm.fr

Contact Presse


Tél : 02 38 64 46 65 - presse@brgm.fr

Annexe

Situation des nappes au 1er avril 2026



Niveau des nappes



Évolution des niveaux



© BRGM / www.brgm.fr

Cette carte présente les indicateurs globaux traduisant les fluctuations moyennes des nappes. Ils sont établis à partir des indicateurs ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur « Niveau des nappes » compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données, et jusqu'à plus de 100 ans. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur « Évolution des niveaux » traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie le 08 avril 2026 par le BRGM, à partir de données acquises jusqu'au 31 mars 2026. Source des données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte © IGN. Producteurs de données et contribution : APRONA, BRGM, Conseil Départemental de la Vendée, Conseil Départemental des Landes, Conseil Départemental du Lot, EPITB Vistrenque, Parc Naturel Régional des Grandes Causses, Syndicat Mixte d'Etudes et de Travaux de l'Asien (SMETA), Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon (SMNPR).