

Diagnóstico visual - Cacao

Guía rápida de deficiencias nutricionales y errores de interpretación.

Cacao

Lectura rápida en campo

- Síntomas en hojas viejas orientan primero hacia nutrientes móviles; síntomas en hojas nuevas orientan primero hacia nutrientes poco móviles o inmóviles.
- Observe patrón, edad del tejido y distribución espacial antes de corregir.
- Cruce la lectura con pH, humedad, drenaje, historial y presión sanitaria.

Deficiencias - Cacao

Nutriente	Dónde inicia	Síntoma guía	Claves
N	Hojas viejas / planta	Follaje verde pálido a amarillento, crecimiento lento y menor vigor.	Puede confundirse con baja MO o lavado por lluvias.
P	Hojas viejas / planta	Crecimiento restringido; follaje opaco/verde oscuro, a veces rojizo o bronceado.	Puede parecer restricción radicular o compactación.
K	Hojas viejas	Amarillamiento marginal que progresa a necrosis; menor tamaño y llenado de fruto.	Puede confundirse con estrés hídrico o salinidad.
Ca	Hojas nuevas / ápices	Deformación del crecimiento nuevo, necrosis apical y pobre desarrollo de brotes.	Diferenciar de B.
Mg	Hojas viejas	Clorosis intervenal con nervaduras más verdes.	Puede agravarse con exceso relativo de K.
S	Hojas nuevas	Amarillamiento uniforme del tejido joven; plantas delgadas.	Se parece a N, pero inicia en tejido nuevo.
Fe / Zn	Hojas nuevas	Clorosis intervenal; con Zn, hojas pequeñas y entrenudos cortos.	Confirmar por análisis.
B	Brotes / hojas jóvenes	Deformación, mala expansión foliar y problemas de cuajado/malformación.	Revisar junto con Ca y estrés hídrico.

Alcance

Esta pieza es un filtro de diagnóstico visual inicial. Un mismo síntoma puede confundirse con sequía, anegamiento, salinidad, acidez, fitotoxicidad, plagas, enfermedades o daño radicular/mecánico. Confirmar con análisis cuando sea posible.

Proveniencia y alcance

Base: Guía práctica para identificar deficiencias nutricionales - cinco cultivos. Se conserva su función diagnóstica y sus cautelas; no se convierte el síntoma visual en una prescripción cerrada.