

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIAS - GRANADILLA

Guía de lectura de síntomas para orientar la visita de campo. No reemplaza análisis de suelo, foliar ni diagnóstico fitosanitario.

V1 · Agosto 2026

Síntoma · tejido · patrón · causa probable · verificación

Protocolo de lectura

No empezar por “qué producto le falta”, sino por dónde aparece el síntoma y qué otras causas pueden explicarlo.

Etapa	Necesidad dominante	Línea Wondergreen
1	Identificar hoja/órgano afectado	Viejo / intermedio / joven / brote / flor / fruto
2	Describir patrón	Uniforme, intervenal, marginal, necrosis, deformación, marchitez
3	Mirar distribución	Planta aislada, foco, línea de riego, zona baja, lote completo
4	Revisar raíz/cuello y agua	Secadera, anegamiento, daño mecánico, compactación
5	Confirmar con análisis	Suelo/foliar y contexto antes de ajustar dosis
6	Registrar respuesta	Fecha, producto, vía, unidad y medición posterior

Síntomas que suelen iniciar en hojas más viejas

Patrones orientativos de nutrición vegetal. En granadilla deben verificarse frente a raíz, agua y sanidad.

Nitrógeno (orientativo)

Pérdida general de verdor y menor vigor, usualmente más evidente primero en tejido más viejo por movilidad del nutriente. Confirmar historial, materia orgánica, raíz y análisis.

Potasio (orientativo)

Clorosis o necrosis marginal en hojas más viejas puede ser compatible con baja disponibilidad de K, pero estrés hídrico/salino y raíz limitada pueden producir patrones parecidos.

Magnesio (orientativo)

Clorosis intervenal en hojas maduras puede sugerir Mg; revisar antagonismos, pH y balance con K/Ca antes de corregir.

Síntomas en tejido joven y brotes

Cuando el problema aparece primero en tejido nuevo, el diagnóstico debe mirar disponibilidad, pH, raíces y crecimiento de meristemas.

Hierro (orientativo)

Clorosis intervenal en hojas jóvenes puede ser compatible con Fe poco disponible, especialmente con pH alto o raíz afectada. No asumir falta total de hierro sin verificar.

Calcio / boro (orientativo)

Deformación o daño en tejido nuevo puede relacionarse con Ca/B, pero también con estrés hídrico, fitotoxicidad o daño de plagas. El margen entre deficiencia y exceso de B exige prudencia.

Fósforo

Los síntomas visuales pueden ser poco específicos. En vez de diagnosticar solo por color, priorizar análisis de suelo/foliar, desarrollo radicular, pH y etapa.

Lo que puede parecer nutrición y no serlo

Secadera / cuello

Marchitez, clorosis progresiva, defoliación y lesiones/pudrición en cuello o raíz requieren diagnóstico sanitario. ICA regula medidas específicas para esta enfermedad.

Drenaje / hipoxia

Encharcamiento y mala aireación limitan absorción y pueden producir clorosis, pérdida de vigor y raíces oscuras. Corregir agua antes de “subir fertilización”.

Dasiops y daño reproductivo

Caída o daño de botones/frutos puede deberse a moscas del género Dasiops y no a un déficit de 2BLOOM/2FRUIT.

Polinización / clima

Cuajado irregular también depende de polinización, agua y ambiente. Una respuesta reproductiva no se atribuye automáticamente al fertilizante.

Salida recomendada: síntoma → tejido → patrón → distribución → raíz/cuello/agua → sanidad → análisis → necesidad dominante → producto exacto.

Fuentes: ICA secadera de granadilla; AGROSAVIA nutrición y sanidad de granadilla/pasifloras; literatura fisiológica general usada solo como orientación de síntomas.