

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

DIAGNÓSTICO Y DEFICIENCIAS

Guía de lectura de síntomas con filtros de raíz, agua y sanidad.

Recurso técnico V1 · Agosto 2026

Nutrición por etapas · diagnóstico · aplicación · fitosanidad · seguimiento

Primero ubique el patrón

La edad del tejido y la distribución del problema orientan la hipótesis.

- ¿El síntoma inicia en hojas viejas o nuevas?
- ¿Es uniforme, intervenal, marginal, deformante o localizado?
- ¿Coincide con floración, carga de fruto, poda o estrés hídrico?
- ¿El lote tiene mal drenaje, compactación o problemas de cuello/raíz?
- ¿Existen marchitez, lesiones, caída de botones o daño de insectos?

Regla

La observación visual es una alerta, no una dosis. Antes de corregir nutrientes, descarte secadera/Fusarium, daño radicular, plagas y estrés hídrico.

Patrones nutricionales orientativos

Usarlos para formular hipótesis y decidir qué verificar.

N

Clorosis general que suele expresarse primero en tejido maduro y menor vigor.

K

Síntomas marginales en hojas maduras pueden aparecer con alta demanda productiva; revisar agua y carga.

Mg

Clorosis intervenal en hojas maduras puede orientar a Mg.

Ca / B

Deformaciones de tejido nuevo, brotes o estructuras reproductivas requieren revisar estos elementos y la salud de raíz.

Fe / Zn

Clorosis en tejido joven puede relacionarse con micronutrientes, pH o condición de raíz.

Confusiones frecuentes

Un síntoma foliar puede ser la consecuencia de un problema radicular o fitosanitario.

- Secadera / Fusarium spp. y marchitez vascular.
- Problemas de cuello o Phytophthora.
- Daño por trips, ácaros o insectos asociados a flor/fruto.
- Anegamiento, suelo compacto o sistema radicular debilitado.
- Fitotoxicidad o mezclas incompatibles.
- Estrés por poda, carga o desequilibrio agua-demanda.

Ficha de seguimiento

Registrar evita repetir a ciegas.

Fecha / lote

Etapas

Tejido afectado

Distribución

Humedad / drenaje

Raíz / cuello

Plagas / enfermedades

Aplicación reciente

Evolución 7-14 días
