

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIAS - LULO

Lectura prudente de síntomas para separar nutrición de raíz, ambiente, plagas y enfermedades.

V1 · Agosto 2026

Tejido · patrón · distribución · raíz · humedad · sanidad

Primero: describa el síntoma

Patrón	Qué observar	Lectura
Hojas viejas	Clorosis o senescencia prematura	Puede orientar a nutrientes móviles; validar raíz/carga
Hojas jóvenes	Clorosis/deformación en tejido nuevo	Revisar pH, disponibilidad y raíz
Intervenal	Nervaduras relativamente verdes	Hipótesis, no diagnóstico definitivo
Bordes/necrosis	Quemado o necrosis marginal	Revisar sales, agua, raíces, ambiente
Generalizado	Lote o sectores amplios	Revisar manejo, suelo, agua, clima
Focos	Plantas agrupadas o aisladas	Sube sospecha sanitaria/suelo

Regla

En Lulo, tizón, daño vascular, nematodos o asfixia radicular pueden imitar deficiencias. Confirmar antes de corregir con fertilizante.

Nitrógeno, fósforo y potasio

Nitrógeno - hipótesis

Clorosis de tejido más viejo y bajo vigor pueden ser compatibles con baja disponibilidad de N, pero también con raíz limitada o alta presión sanitaria.

Fósforo - hipótesis

Establecimiento lento no prueba deficiencia de P.
Revisar pH, temperatura, suelo y raíz.

Potasio - hipótesis

En producción la demanda cambia con carga y desarrollo del fruto. Síntomas marginales deben cruzarse con agua, análisis, raíz y sanidad.

Calcio, magnesio y micronutrientes

Calcio

Problemas en tejido nuevo o fruto pueden relacionarse con Ca, pero dependen también de transporte de agua y raíz.

Magnesio

Clorosis intervenal en hojas maduras puede ser compatible con Mg; validar pH y balance nutricional.

Hierro / manganeso

Clorosis en hojas jóvenes puede relacionarse con disponibilidad de micronutrientes y pH; no diagnosticar visualmente como certeza.

Boro y otros

Síntomas reproductivos son multicausales. No formular micronutrientes sin soporte y dosis segura.

Confusiones frecuentes

Phytophthora infestans

Tizón/gota puede causar lesiones y pérdida de tejido funcional. No corregir como “falta de nutrientes”.

Meloidogyne spp.

Nudos/daño radicular reducen absorción y vigor; inspección de raíces puede ser decisiva.

Neoleucinodes elegantalis

Daño y caída de fruto corresponden a manejo fitosanitario, no a una falla de 2FRUIT.

Agua y exposición

Exceso o déficit de humedad, radiación y microclima alteran vigor y síntomas.

Ruta de confirmación

Paso	Acción	Control
1	Describir	Tejido + patrón + distribución
2	Revisar ambiente	Agua, drenaje, exposición/sombrío
3	Revisar raíz	Cuello, raíces, nematodos
4	Revisar sanidad	Tizón, plagas, enfermedades
5	Cruzar análisis	Suelo / foliar si existe
6	Corregir y medir	Producto exacto + dosis soportada

Fuentes de referencia: AGROSAVIA, Demanda ambiental del cultivo de lulo; revisión productiva de Solanum quitoense; guía de enfermedades y publicaciones sobre Meloidogyne.