

Diagnóstico visual - Pastos y Praderas

Guía rápida de deficiencias nutricionales y errores de interpretación.

Pastos y Praderas

Lectura rápida en campo

- Síntomas en hojas viejas orientan primero hacia nutrientes móviles; síntomas en hojas nuevas orientan primero hacia nutrientes poco móviles o inmóviles.
- Observe patrón, edad del tejido y distribución espacial antes de corregir.
- Cruce la lectura con pH, humedad, drenaje, historial y presión sanitaria.

Deficiencias - Pastos y Praderas

Nutriente	Dónde inicia	Síntoma guía	Claves
N	Hojas viejas	Clorosis general; luego amarillamiento de hojas jóvenes.	Deficiencia frecuente; revisar también manejo y humedad.
P	Plantas jóvenes / hojas bajas	Rebrote lento, enanismo, verde oscuro; tonos rojos/púrpuras, hojas enrolladas.	Puede confundirse con frío, compactación o encharcamiento.
K	Hojas viejas	Estrías amarillentas y luego quemado de puntas; hojas cortas/angostas.	Puede aumentar susceptibilidad a enfermedades.
Mg	Hojas viejas	Clorosis intervenal; bordes café rojizo.	Frecuente en suelos ácidos/arenosos o con K alto.
S	Hojas nuevas	Verde pálido a amarillo en tejido joven; plantas delgadas.	Se parece a N, pero inicia en hojas nuevas.
Ca	Más por suelo/raíz	No suele mostrar una deficiencia foliar clara en gramíneas.	En praderas ácidas se revisa más por pH y encalado.

Alcance

Esta pieza es un filtro de diagnóstico visual inicial. Un mismo síntoma puede confundirse con sequía, anegamiento, salinidad, acidez, fitotoxicidad, plagas, enfermedades o daño radicular/mecánico. Confirmar con análisis cuando sea posible.

Proveniencia y alcance

Base: Guía práctica para identificar deficiencias nutricionales - cinco cultivos. Se conserva su función diagnóstica y sus cautelas; no se convierte el síntoma visual en una prescripción cerrada.