

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

DIAGNÓSTICO Y DEFICIENCIAS

Guía de lectura de síntomas y causas que pueden confundirse con nutrición.



Recurso técnico V1 · Agosto 2026

Nutrición por etapas · diagnóstico · aplicación · fitosanidad · seguimiento

Primero ubique el patrón

La misma clorosis puede significar cosas distintas según edad de hoja, distribución y estado de raíz.

- ¿Aparece en hojas viejas, nuevas o en toda la planta?
- ¿Es uniforme, intervenal, marginal, asimétrica o localizada?
- ¿El problema está en todo el lote o en zonas?
- ¿Coincide con anegamiento, sequía, compactación o cambio de manejo?
- ¿Existen síntomas vasculares, marchitez, lesión de raíz/cormo o presión sanitaria?

Regla

La lectura visual orienta hipótesis. No sustituye análisis de suelo/foliar ni diagnóstico fitosanitario. Si hay marchitez severa o síntomas vasculares, separar nutrición de posibles enfermedades antes de recomendar.

Patrones nutricionales frecuentes

Usarlos como orientación, no como diagnóstico único.

N

Amarillamiento más general que suele iniciar en hojas más viejas; revisar también vigor y extracción.

K

Clorosis/necrosis marginal en hojas maduras puede sugerir limitación; contrastar con carga, humedad y salinidad.

Mg

Clorosis intervenal en hojas maduras, con nervaduras relativamente más verdes.

S

Amarillamiento más uniforme en tejido joven; diferenciar por edad del tejido afectado.

Ca / B

Alteraciones de tejido nuevo o crecimiento pueden sugerirlos, pero raíz y humedad son filtros críticos.

Lo que puede parecer deficiencia y no serlo

Antes de corregir nutrientes, descarte limitantes de agua, raíz y sanidad.

- Asfixia radicular por anegamiento o nivel freático.
- Daño por nematodos o deterioro del cormo/raíces.
- Sigatoka y pérdida de área foliar funcional.
- Moko o Fusarium R4T cuando existe marchitez y síntomas sistémicos.
- Salinidad, fitotoxicidad o concentración excesiva de fertilizantes.
- Compactación y pobre aireación del suelo.

No haga

No recomendar “más N” o “más K” solo porque la planta está amarilla. La causa puede ser incapacidad de absorber, no falta de oferta.

Qué registrar para confirmar

La trazabilidad mejora la siguiente recomendación.

Fecha / lote / variedad

Etapas y edad

Hoja donde inicia el síntoma

Distribución en el lote

Humedad y drenaje

Estado de raíz/cormo

Fertilización reciente

Foto y evolución 7-14 días

Del síntoma a la decisión

La secuencia importa.

1

Ubicar patrón

Edad de hoja + tipo de síntoma + distribución.

2

Revisar entorno

Humedad, drenaje, raíz, compactación y sanidad.

3

Cruzar historial

Producto, dosis, fecha y respuesta previa.

4

Validar

Análisis o criterio agronómico cuando la decisión lo amerite.

5

Corregir y medir

Aplicar la línea adecuada y reevaluar; no repetir por rutina.