

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIAS - UCHUVA

Guía de lectura de síntomas para evitar convertir cualquier amarillamiento, caída o bajo vigor en una recomendación automática de fertilización.

V1 · Agosto 2026

Tejido · patrón · distribución · raíz · agua · sanidad

Primero: ¿qué hoja y qué patrón?

Patrón	Qué observar	Lectura prudente
Hojas viejas	Amarillamiento progresivo, pérdida de vigor	Puede orientar a nutrientes móviles, pero validar raíz y carga
Hojas jóvenes	Clorosis o deformación en tejido nuevo	Puede orientar a baja movilidad, pH o raíz
Intervenal	Nervaduras relativamente más verdes	No diagnosticar sin contexto
Bordes / necrosis	Quemado o necrosis marginal	Revisar sales, agua, raíces y carga
Generalizado	Todo el lote o sectores amplios	Revisar ambiente, riego y manejo
Por focos	Manchas o plantas aisladas	Eleva sospecha sanitaria/raíz/suelo

Regla

Una deficiencia visual es una hipótesis de trabajo. Confirmar con historial, suelo/foliar cuando exista y condición radicular.

Nitrógeno, fósforo y potasio

Nitrógeno - hipótesis

Bajo vigor y clorosis que inicia en tejido más viejo pueden ser compatibles con baja disponibilidad de N, pero también con raíz limitada, frío, exceso de agua o carga alta.

Fósforo - hipótesis

Crecimiento lento y problemas de establecimiento no justifican por sí solos P. Revisar pH, temperatura, suelo y raíz.

Potasio - hipótesis

En producción, la demanda de K aumenta; síntomas marginales o baja calidad pueden tener múltiples causas. Relacionar con carga, agua, análisis y estado radicular antes de mover a 2FRUIT.

Calcio, magnesio y micronutrientes

Calcio

Problemas en tejido joven o fruto pueden relacionarse con Ca, pero la movilidad depende de agua/transpiración. No asumir que “más calcio” resuelve un problema de riego o raíz.

Magnesio

Clorosis intervenal en hojas más maduras puede ser compatible con Mg; validar balance catiónico, pH y fertilización previa.

Hierro / manganeso

Clorosis en tejido joven puede relacionarse con disponibilidad de micronutrientes y pH; revisar condiciones del suelo.

Boro y otros

Defectos reproductivos o deformaciones son multicausales. No recomendar micronutrientes sin diagnóstico y dosis segura.

Confusiones frecuentes

Fusarium / marchitez

Marchitez, amarillamiento y deterioro vascular pueden parecer nutricionales. Revisar cuello, raíz y distribución por focos.

Exceso de agua / mal drenaje

Asfixia radicular reduce absorción y genera síntomas secundarios. Primero corregir la limitación física.

Moscas de la fruta

Pérdida o daño de fruto no se corrige cambiando NPK. Confirmar presencia y activar manejo fitosanitario.

Carga / poda / clima

Alta carga, poda severa, frío o cambios de humedad alteran vigor y demanda. Interpretar siempre junto con etapa.

Ruta de confirmación

Paso	Acción	Registro
1	Describir síntoma	Tejido + patrón + distribución
2	Revisar raíces y agua	Drenaje, humedad, cuello, raíces
3	Revisar sanidad	Marchitez, plagas, enfermedades
4	Cruzar historial	Fertilización, poda, carga, clima
5	Analizar si existe	Suelo / foliar / agua
6	Corregir y medir	Producto exacto + dosis soportada + seguimiento

Referencia técnica principal: AGROSAVIA, Avances de investigación en nutrición, manejo y control de enfermedades en el cultivo de uchuva (2023).