

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

FITOSANIDAD INTEGRADA

Qué debe acompañar cualquier recomendación nutricional en musáceas.



Recurso técnico V1 · Agosto 2026

Nutrición por etapas · diagnóstico · aplicación · fitosanidad · seguimiento

Fusarium R4T: primero bioseguridad

Es una enfermedad de suelo capaz de persistir por décadas; mover suelo o material puede dispersarla.

- Sospecha: amarillamiento/marchitez de hojas adultas, enruanamiento y decoloración vascular interna, entre otros signos descritos por el ICA.
- Dispersión: material de siembra, suelo adherido a calzado/herramientas/vehículos y agua de escorrentía o riego.
- Acción: no manipular ni mover material sospechoso; aplicar protocolos de bioseguridad y reporte/diagnóstico oficial.
- Wondergreen: no comunicar fertilizantes ni bioinsumos como control de Fusarium R4T.

Fuente

Instituto Colombiano Agropecuario - micrositio Fusarium R4T y comunicaciones de vigilancia/contención consultadas en agosto de 2026.

Moko: diagnóstico y contención

Ante una sospecha seria, la decisión deja de ser nutricional y pasa a ser fitosanitaria.

- Mantener vigilancia y bioseguridad de herramientas, personal y material vegetal.
- No trasladar material sospechoso entre lotes.
- Buscar diagnóstico y protocolo de manejo/erradicación con autoridad y asistencia técnica.
- La nutrición puede acompañar plantas sanas dentro de un programa integral, pero no reemplaza control.

Fuente

ICA y FAO han reforzado prevención, control y erradicación de Moko en sistemas de plátano y banano.

Sigatoka + área foliar funcional

La capacidad fotosintética condiciona la respuesta productiva.

- Monitorear severidad y número de hojas funcionales.
- Integrar manejo de hojas, densidad, ventilación, nutrición, drenaje y programa fitosanitario autorizado.
- No intentar compensar pérdida severa de área foliar únicamente con fertilización.
- Registrar sanidad junto con racimo y etapa para interpretar la respuesta nutricional.

Picudos y nematodos

La raíz/cormo dañados pueden hacer que un buen programa nutricional responda mal.

- Picudos: monitoreo y trampas forman parte del manejo integrado; la intensidad depende del nivel de daño.
- Nematodos: revisar raíces y síntomas de deterioro antes de intensificar fertilización.
- Cuando el daño radicular es importante, priorizar diagnóstico y recuperación del sistema antes de subir concentración.
- Bioinsumos: usar solo con blanco, ficha, compatibilidad y registro vigentes.

Semáforo fitosanitario para la recomendación

La misma visita técnica debe integrar nutrición y sanidad.

VERDE

Sin síntomas severos; raíz funcional; presión sanitaria bajo manejo. Puede avanzar el programa nutricional ajustado.

AMARILLO

Síntomas no concluyentes o presión moderada. Recomendación conservadora + diagnóstico + seguimiento.

ROJO

Marchitez severa, síntomas vasculares, sospecha Moko/Fusarium o daño radicular crítico. Priorizar protocolo sanitario; no intensificar nutrición.