

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

FITOSANIDAD - GRANADILLA

Filtros sanitarios que deben revisarse antes de atribuir un síntoma o una pérdida de producción a la nutrición.

V1 · Agosto 2026

Secadera · Dasiops · antracnosis · bioseguridad · diagnóstico

Secadera / pudrición del cuello

Es el riesgo sanitario central de la biblioteca.

Qué reportan ICA y literatura

La secadera causa marchitez y muerte. Estudios la relacionan con *Fusarium solani* f. sp. *passiflorae* y lesiones/pudrición de cuello y raíces.

Prevención oficial

Material propagativo sano/registrado, desinfección y bioseguridad, evitar encharcamientos, manejo de suelo, malezas y residuos, vigilancia de focos.

Si aparece un foco

No aumentar fertilización esperando “recuperación”. Restringir movimiento en el área, disponer adecuadamente material afectado e informar/coordinar diagnóstico conforme a las medidas ICA aplicables.

Moscas Dasiops spp.

Daño reproductivo

En granadilla se han documentado Dasiops en botones florales y frutos. Puede haber arrugamiento, amarillamiento, daño interno y caída; algunas estructuras infestadas pueden ser poco evidentes.

Manejo integrado

Monitoreo, reconocimiento de síntomas, manejo cultural y decisiones basadas en presencia/daño. No trasladar automáticamente umbrales o plaguicidas de otra pasiflora sin soporte para granadilla.

Implicación Wondergreen

Una caída de botones o bajo cuajado con Dasiops activo no debe interpretarse como “falta de 2BLOOM”. Primero separar la presión de plaga del componente nutricional.

Otros problemas que cambian la lectura

Antracnosis

Reportada entre problemas fitosanitarios relevantes de granadilla. Confirmar síntomas, órgano afectado y diagnóstico antes de decidir manejo.

Nematodos / raíz

Existen reportes de nematodos fitoparásitos en granadilla/pasifloras. Raíz dañada puede generar deficiencias secundarias y menor respuesta a fertilización.

Poda y heridas

Herramientas, residuos y heridas pueden modificar el riesgo sanitario. Integrar higiene y manejo de residuos al programa.

Agua y drenaje

Exceso de humedad favorece problemas de raíz/cuello y reduce oxigenación. La nutrición debe ajustarse después de resolver la limitación física.

Bioinsumos Wondergreen: criterio de USO

Los bioinsumos no se asignan por nombre de cultivo, sino por blanco, ficha y programa de manejo integrado.

Etapa	Necesidad dominante	Línea Wondergreen
Trichoderma	Soporte radicular / manejo biológico según ficha	No prometer control de secadera
Bacillus subtilis	Complemento biológico según ficha y objetivo	Validar compatibilidad y registro aplicable
Beauveria	Manejo integrado de insectos cuando el blanco esté soportado	No asumir eficacia contra Dasiops
Metarhizium	Manejo integrado cuando el blanco esté soportado	No asumir blanco sin ficha
Extracto Ajo Ají	Complemento botánico preventivo según ficha	No presentarlo como control total

Regla de seguridad

Ante secadera o plaga relevante, el programa fitosanitario debe seguir diagnóstico, registro/etiqueta del insumo y normativa aplicable. La biblioteca no reemplaza la asistencia agronómica ni las medidas ICA.

Fuentes técnicas

ICA. Protección fitosanitaria en frutales: Granadilla y Resolución 2405 de 2009 para prevención y control de secadera. Consultado agosto 2026.

ICA. "ICA dicta medidas fitosanitarias para contrarrestar plaga que ataca a la granadilla" (2009).

AGROSAVIA. Caracterización sanitaria de los cultivos de granadilla, gulupa y maracuyá en Colombia, con especial referencia a la secadera causada por *Fusarium solani* f. sp. *passiflorae* (2020).

Amaya, Varón & Salamanca. Prueba de extractos vegetales para el control de *Dasiops* spp. en granadilla, Ciencia y Tecnología Agropecuaria 10(2), 2009.

Patiño-Pacheco & Pérez-Cardona. Evaluación de resistencia de genotipos de *Passifloras* a *Fusarium solani* f. sp. *passiflorae* en granadilla (2021).