

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

FITOSANIDAD - LULO

Filtros sanitarios que deben revisarse antes de atribuir pérdida de vigor, hoja o fruto a la nutrición.

V1 · Agosto 2026

Phytophthora · Neoleucinodes · Meloidogyne · solanáceas · MIP

Tizón / gota - *Phytophthora infestans*

AGROSAVIA documenta el tizón del Lulo como uno de los problemas fitosanitarios más importantes del cultivo en Colombia. Su manejo exige diagnóstico y estrategia sanitaria; no se resuelve con una corrección nutricional.

Qué observar

Lesiones y deterioro rápido de tejido; relación con humedad/microclima; patrón de avance en el lote.

Implicación nutricional

La pérdida de tejido funcional cambia la demanda y puede detener una aplicación nutricional hasta estabilizar la sanidad.

Perforador del fruto - Neoleucinodes elegantalis

AGROSAVIA dispone de un manual específico de manejo integrado del gusano perforador del fruto de Lulo y tomate de árbol.

Qué observar

Frutos con daño compatible, caída o presencia de perforación/larva; registrar incidencia y distribución.

Manejo

Monitoreo y MIP con medidas acordes al blanco y al sistema productivo. No improvisar productos por similitud con otras plagas.

Bioinsumos

Beauveria o Metarhizium solo se recomiendan cuando el blanco, ficha, registro/uso y condiciones de aplicación lo soportan. No se asume control de Neoleucinodes por defecto.

Nematodos - Meloidogyne spp.

Riesgo

Meloidogyne spp. se reconoce como limitante importante de producción de Lulo por el daño radicular.

Diagnóstico

Revisar raíces, nudos, focos de bajo vigor e historia del lote. Si es necesario, confirmar mediante análisis.

Implicación Wondergreen

Una raíz dañada limita absorción. Antes de aumentar fertilización, corregir la causa y definir si un bioinsumo radicular tiene soporte específico.

Vigilancia fitosanitaria en solanáceas

ICA

ICA gestiona el riesgo fitosanitario en solanáceas mediante prevención, vigilancia, diagnóstico, intervención y comunicación del riesgo.

Antioquia 2023

ICA realizó vigilancia de *Bactericera cockerelli* y *Protoplasma longifila* en Lulo, Uchuva, tomatillo y tomate de árbol con destino de exportación.

MIP

El programa debe integrar monitoreo, diagnóstico, manejo cultural/biológico/químico cuando corresponda y registros. Nutrición y fitosanidad son decisiones relacionadas, pero distintas.

Otros problemas documentados

Enfermedades

AGROSAVIA documenta, entre otras, antracnosis, fusariosis, Verticillium, Sclerotinia, enfermedades bacterianas y pudriciones.

Plagas

Además del perforador, se han documentado ácaros y otros insectos asociados al cultivo. La presión local debe diagnosticarse.

Regla sanitaria

No asignar un bioinsumo solo porque exista una plaga o enfermedad en la especie. Primero: blanco confirmado, ficha/registro, compatibilidad, equipo, momento y condiciones.

Fuentes técnicas

AGROSAVIA. Enfermedades del cultivo del lulo en Colombia: guía de diagnóstico y control.

AGROSAVIA. Caracterización de razas fisiológicas de *Phytophthora infestans* en lulo. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 2012.

AGROSAVIA. Manejo integrado del gusano perforador del fruto de lulo y tomate de árbol. 2014.

AGROSAVIA. Reacción de genotipos de lulo a *Meloidogyne* spp. en condiciones de campo. 2017.

ICA. Protección fitosanitaria en solanáceas; brigada fitosanitaria en Antioquia para *Bactericera cockerelli* y *Prodidiplosis longifila*, 2023.