

GUIA TECNICA WONDERGREEN

FITOSANIDAD - TOMATE CHONTO

Filtros sanitarios para tomate bajo invernadero que deben revisarse antes de atribuir perdida de vigor, flor, cuajado o fruto a la nutricion.

V1 - Agosto 2026

Tuta - mosca blanca - gota - Fusarium - Ralstonia - MIP

Tuta absoluta

AGROSAVIA ha desarrollado sistemas de muestreo y toma de decisiones para Tuta absoluta en tomate de invernadero. El principio es decidir con monitoreo y umbrales, no con aplicaciones calendarizadas.

Que observar

Minas en hojas, daño de cogollos y frutos, presencia de larvas/adultos y distribucion dentro del invernadero.

Manejo integrado

Monitoreo, exclusion y medidas biologicas/quimicas compatibles segun el programa y los productos autorizados. Registrar antes y despues de intervenir.

Implicacion Wondergreen

Beauveria o Metarhizium solo se incorporan cuando el blanco, ficha, registro/uso y condiciones de aplicacion lo soportan. No se asume control de Tuta por defecto.

Mosca blanca de invernadero

AGROSAVIA ha trabajado estrategias de detección, seguimiento y manejo integrado de *Trialeurodes vaporariorum* en tomate protegido.

Monitoreo

Revisar focos, envés de hojas, adultos/ninfas, trampas amarillas si hacen parte del programa y presencia de fumagina.

Decision

Evitar aplicaciones sin evidencia de presión. El MIP puede incorporar control biológico cuando corresponda al sistema.

Nutrición no es control

Una planta con alta presión de mosca blanca puede perder vigor y área funcional. Corregir la causa sanitaria antes de interpretar la respuesta nutricional.

Gota y marchitez por Fusarium

Phytophthora infestans

Gota/tizon puede destruir tejido rapidamente bajo condiciones favorables. Humedad, ventilacion y manejo del cultivo son parte del riesgo.

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

La marchitez vascular requiere diagnostico y manejo integrado; puede confundirse con estres hidrico o nutricional.

Bioinsumos y suelo

AGROSAVIA investiga alternativas biologicas y mejora de condiciones biofisicas/nutricionales del suelo. Trichoderma o Bacillus de Wondergreen se recomiendan solo con funcion concreta y soporte de ficha, no como garantia de control.

Ralstonia y vigilancia oficial de solanaceas

Ralstonia solanacearum

ICA la incluye entre los problemas fitosanitarios relevantes de solanaceas. Marchitez bacteriana no debe confundirse con Fusarium ni con falta de agua/nutrientes.

Vigilancia ICA

El programa oficial de solanaceas integra prevencion, vigilancia, diagnostico, intervencion y comunicacion del riesgo.

Bactericera y otros riesgos

La situacion oficial de plagas de solanaceas puede cambiar por region. Revisar alertas y diagnostico ICA cuando aparezcan sintomas atipicos o exista vigilancia oficial activa.

Bioinsumos Wondergreen: criterio de uso

Bioinsumo	Uso prudente	Limite
Trichoderma	Soporte radicular / manejo biologico segun ficha	No prometer control de Fusarium/Ralstonia
Bacillus subtilis	Complemento biologico segun objetivo y ficha	Validar compatibilidad y blanco
Beauveria	MIP de insectos con blanco soportado	No asumir Tuta/mosca blanca sin etiqueta
Metarhizium	MIP con blanco soportado	No inventar blanco
Extracto Ajo Aji	Complemento botanico segun ficha	No presentarlo como control total

Regla sanitaria

El blanco, registro/etiqueta, compatibilidad, momento, equipo y condiciones de aplicacion mandan sobre la recomendacion. Nutricion y fitosanidad se coordinan, pero no se confunden.

Buenas Practicas Agricolas

- Trazabilidad de aplicaciones, insumos, lotes y cosecha.
- Calidad de agua y manejo seguro de mezclas e insumos.
- Equipos calibrados y proteccion del trabajador.
- Uso responsable de plaguicidas y bioinsumos conforme etiqueta/registro.
- Monitoreo fitosanitario y registros para decidir.

Fuentes: AGROSAVIA, Modelo Productivo de Tomate protegido para Antioquia; proyectos de Tuta absoluta, mosca blanca, gota/Fusarium y fertilizacion integrada; ICA, Proteccion Fitosanitaria en Solanaceas y Buenas Practicas Agricolas.