

Guía por cultivo - Aguacate

Objetivo. Traducir el portafolio Greenatics a una guía práctica para árboles jóvenes, árboles en desarrollo y lotes en producción.

Cómo debe leerse esta guía en campo

- En aguacate joven las aplicaciones deben ser más pequeñas y más frecuentes.
- En árboles en producción, el programa debe ajustarse al momento del árbol: formación, prefloración, cuajado, llenado o recuperación.
- Varios síntomas se parecen a pH alto, salinidad o asfixia radicular; no se debe cerrar una recomendación solo por lectura visual.

Checklist de evaluación antes de recomendar

- Confirmar etapa real del cultivo en el lote visitado.
- Confirmar qué quiere resolver el productor en este momento.
- Mirar humedad del suelo antes de definir si la aplicación puede ser al suelo o si debe esperar.
- Definir qué equipo sí tiene disponible la finca para aplicar.
- Verificar si el lote permite trabajar con una sola línea o si necesita base + complemento.

Además, siempre se deben revisar los puntos generales de evaluación indicados al inicio del documento.

Programa sugerido por etapa y línea Greenatics

Momento del cultivo	Línea principal	Productos visibles	Cómo explicarlo al cliente	Modo simple de aplicación	Observación técnica
Levante y formación	Compost + 2Grow	Compost / 2Grow 15-3-3 / 2Grow 100-20-20	Construir base, ayudar raíz y mover crecimiento.	Compost y sólido al suelo en anillo; líquido por drench o fertirriego.	Nunca pegar el fertilizante al cuello del árbol.
Sostenimiento del árbol	2Balance	2Balance 7-7-7 / 2Balance 70-70-70	Mantener el árbol estable entre una fase y otra.	Sólido al suelo; líquido si el sistema facilita aplicaciones más repartidas.	Útil cuando el árbol no está aún en un pico fuerte de flor o fruto.
Prefloración	2Bloom	2Bloom 3-8-3 / 2Bloom 30-80-30	Acompañar la transición reproductiva.	Base al suelo y apoyo líquido si hay riego localizado.	No sobrecargar esta fase si el árbol viene muy vegetativo o muy estresado.
Cuajado, llenado y desarrollo del fruto	2Fruit	2Fruit 3-3-8 / 2Fruit 30-30-80	Sostener la fase productiva.	Sólido al suelo o líquido por fertirriego / drench.	Si hay problemas de calibre o llenado, revisar primero agua y potasio antes de subir N.
Poscosecha o recuperación	2Grow	2Grow 15-3-3 / 2Grow 100-20-20	Ayudar recuperación del árbol y nueva brotación.	Aplicar con suelo húmedo y sin exceso de concentración.	Si el árbol sigue muy cargado, no sobredosificar.

Modo de aplicación en lenguaje sencillo

- Si el producto es sólido, piense en saco o bulto y llévelo al suelo. En árboles, distribúyalo en el plato o anillo; en pastos, al voleo con humedad.
- Si el producto es líquido y la finca trabaja con bomba de espalda de 20 litros, primero cargue agua limpia, agregue el producto, termine de llenar y agite bien.

- Si la finca usa caneca de 200 litros o tanque estacionario, haga premezcla, homogenice y aplique el mismo día.
- Si hay fertirriego, use el líquido para repartir mejor la nutrición en varios eventos pequeños.
- Si no hay riego, el líquido puede ir en drench al pie de la planta o como apoyo localizado, según el cultivo y el tamaño del lote.
- Evite aplicar con sol fuerte, planta marchita, suelo totalmente seco o lluvia inminente.

Señales de alerta antes de aplicar

- En sectores calcáreos o con pH alto revisar primero Fe y Zn.
- Si además de clorosis hay deformación fuerte de brotes y fruto, revisar B.
- No aplicar fuerte sobre raíces asfixiadas o lotes encharcados.
- Si el problema está solo en ciertos sectores, revisar riego, drenaje o suelo antes de generalizar.

Qué evaluar después de la aplicación

- Evaluar brotación, color, uniformidad y respuesta del árbol.
- Comparar respuesta entre árboles bien hidratados y árboles más limitados.
- Registrar el momento fenológico exacto para la siguiente recomendación.

Cierre técnico-comercial

La recomendación final debe quedar simple, operativa y fácil de repetir. Greenatics debe dejar claro qué línea se recomendó, para qué etapa, cómo se aplica, qué complemento se sugirió y en cuánto tiempo se hará seguimiento.