

Guía por cultivo - Limón Tahití

Objetivo. Organizar la recomendación Greenatics para Tahití bajo una lógica dinámica, ya que el cultivo puede moverse varias veces en brotación, floración y cosecha durante el año.

Cómo debe leerse esta guía en campo

- En Tahití el programa no debe ser rígido por edad solamente; debe seguir el flujo del árbol.
- N y K suelen parcelarse más que P.
- El estado del fruto ayuda mucho a leer la necesidad, pero no reemplaza análisis.

Checklist de evaluación antes de recomendar

- Confirmar etapa real del cultivo en el lote visitado.
- Confirmar qué quiere resolver el productor en este momento.
- Mirar humedad del suelo antes de definir si la aplicación puede ser al suelo o si debe esperar.
- Definir qué equipo sí tiene disponible la finca para aplicar.
- Verificar si el lote permite trabajar con una sola línea o si necesita base + complemento.

Además, siempre se deben revisar los puntos generales de evaluación indicados al inicio del documento.

Programa sugerido por etapa y línea Greenatics

Momento del cultivo	Línea principal	Productos visibles	Cómo explicarlo al cliente	Modo simple de aplicación	Observación técnica
Formación y crecimiento	Compost + 2Grow	Compost / 2Grow 15-3-3 / 2Grow 100-20-20	Acondicionar el sistema y mover desarrollo vegetativo.	Compost y sólido al suelo; líquido por drench o fertirriego.	Útil en árboles jóvenes o en recuperación de vigor.
Mantenimiento	2Balance	2Balance 7-7-7 / 2Balance 70-70-70	Dar continuidad sin mover demasiado el árbol hacia un extremo.	Sólido al suelo y líquido como refuerzo.	Es la línea de equilibrio entre crecimiento y producción.
Prefloración y floración	2Bloom	2Bloom 3-8-3 / 2Bloom 30-80-30	Acompañar el momento reproductivo.	Aplicar de forma bien sincronizada con el flujo del cultivo.	No repetir a ciegas si el lote no está realmente entrando en esa fase.
Cuajado, llenado y engrose	2Fruit	2Fruit 3-3-8 / 2Fruit 30-30-80	Sostener fase productiva, llenado y engrose.	Sólido al suelo o líquido por fertirriego / drench.	Muy útil cuando el cliente pide ayuda para fase productiva y rendimiento.
Recuperación	2Grow	2Grow 15-3-3 / 2Grow 100-20-20	Recuperar vigor después de un pico de producción o un estrés.	Aplicar con criterio de humedad y salud del sistema radicular.	No confundir cansancio del árbol con una sola falta de N.

Modo de aplicación en lenguaje sencillo

- Si el producto es sólido, piense en saco o bulto y llévelo al suelo. En árboles, distribúyalo en el plato o anillo; en pastos, al voleo con humedad.
- Si el producto es líquido y la finca trabaja con bomba de espalda de 20 litros, primero cargue agua limpia, agregue el producto, termine de llenar y agite bien.
- Si la finca usa caneca de 200 litros o tanque estacionario, haga premezcla, homogenice y aplique el mismo día.

- Si hay fertirriego, use el líquido para repartir mejor la nutrición en varios eventos pequeños.
- Si no hay riego, el líquido puede ir en drench al pie de la planta o como apoyo localizado, según el cultivo y el tamaño del lote.
- Evite aplicar con sol fuerte, planta marchita, suelo totalmente seco o lluvia inminente.

Señales de alerta antes de aplicar

- Si el amarillamiento es asimétrico entre mitades de la hoja, descartar HLB antes de asumir deficiencia nutricional.
- En suelos calizos o con agua dura, revisar primero Fe, Zn y Mn.
- Si hay daño radicular o anegamiento, la respuesta al fertilizante baja mucho.
- No cerrar una recomendación productiva sin mirar carga, agua y uniformidad del lote.

Qué evaluar después de la aplicación

- Evaluar color de brotes, floración, cuajado y uniformidad del árbol.
- Comparar respuesta del árbol según el flujo en que estaba al momento de aplicar.
- Registrar si la aplicación fue fácil para poder repetirla correctamente.

Cierre técnico-comercial

La recomendación final debe quedar simple, operativa y fácil de repetir. Greenatics debe dejar claro qué línea se recomendó, para qué etapa, cómo se aplica, qué complemento se sugirió y en cuánto tiempo se hará seguimiento.