



GUÍA WONDERGREEN PARA CÍTRICOS

Nutrición por etapas y
aplicación en campo



Del suelo al fruto: acompaña cada etapa del limón, la naranja y la mandarina con nutrición organomineral, compost y bioinsumos.



HECHO EN

Antioquia



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2BLOOM



2FRUIT



BIOINSUMOS

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?

Una herramienta práctica para decidir qué aplicar, cuándo aplicarlo y cómo manejar mejor el cultivo.

Esta guía ayuda al productor a identificar la etapa del árbol, leer el estado del lote y aplicar el sistema Wondergreen con mayor criterio técnico.

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?



Etapas del cítrico



Nutrición por planta



Aplicación en zona de gotera



Manejo de floración y cuajado



Rescates nutricionales



Sanidad y monitoreo



Bioinsumos y compatibilidad



Registro de aplicaciones



IDENTIFICAR



APLICAR



CUBRIR



MONITOREAR



REGISTRAR



DIAGNOSTICA TU LOTE CITRÍCOLA ANTES DE APLICAR

Antes de elegir producto, revisa edad, etapa, vigor, humedad, carga y sanidad.



CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO

- Especie: limón, naranja o mandarina ☐
- Edad del árbol ☐
- Patrón / portainjerto ☐
- Etapa: levante, producción o recuperación ☐
- Vigor y color de hojas ☐
- Humedad y drenaje ☐
- Carga de fruta ☐
- Floración o brotación activa ☐
- Historial de fertilización ☐
- Síntomas visibles o plagas ☐

OBSERVA Y ANOTA



Registra fecha, condiciones y observaciones.



Observa planta, hojas, flores, frutos y suelo.



Documenta con fotos para tomar mejores decisiones.

SISTEMA DE DECISIÓN

Suelo pobre	>	COMPOST
Brotación / levante	>	2GROW
Mantenimiento	>	2BALANCE
Prefloración	>	2BLOOM
Llenado de fruto	>	2FRUIT
Raíz / entorno biológico	>	BIOINSUMOS
Ca / B / Zn / Mg u otros nutrientes	>	FORMULACIÓN A MEDIDA

LEE TU PLANTA

HOJA SALUDABLE

Verde intensa
Brillante
Textura firme

HOJA CON SÍNTOMAS

Clorosis
Manchas
Necrosis
Defoliación

CONOCE LA ETAPA DEL CULTIVO



BROTACIÓN
(LEVANTE)



FLORACIÓN



CUAJADO



LLENADO
DE FRUTO



MADURACIÓN

“ Diagnóstico primero, producto después.

La guía orienta; el lote confirma.



DECISIONES
MÁS PRECISAS



MEJOR USO
DE RECURSOS



MAYOR EFICIENCIA
NUTRICIONAL



PLANTAS SANAS,
FRUTOS DE CALIDAD



RENTABILIDAD
SOSTENIBLE

¿QUÉ SON LOS PELLETS ORGANOMINERALES OCLUIDOS?

Una forma práctica de llevar nutrición gradual al suelo del cítrico.

Son pellets que integran materia orgánica y nutrientes minerales en una matriz física estable. Su valor no está solo en el NPK visible, sino en cómo acompañan la permanencia del nutriente en la zona suelo-raíz.



MATRIZ ORGÁNICA

Aporta estructura, retiene humedad y favorece la actividad biológica.



NUTRIENTES MINERALES

Elementos esenciales formulados para el desarrollo del cítrico.



LIBERACIÓN MÁS GRADUAL

La matriz controla la velocidad de salida del nutriente al suelo.



PERMANENCIA EN SUELO-RAÍZ

Acompaña la disponibilidad del nutriente en la zona de mayor absorción.



NUTRIENTES OCLUIDOS

Encerrados en la matriz, protegidos de pérdidas por lavado o volatilización.



NO ES SOLO NPK.

También importa cómo se comporta el nutriente en el suelo.



Menor pérdida por lavado



Disponibilidad prolongada



Mejor aprovechamiento por la planta



Nutrición eficiente y sostenible

DE LA APLICACIÓN AL APROVECHAMIENTO



1. APLICACIÓN

El pellet se deposita en el suelo.



2. HIDRATACIÓN

La matriz orgánica se humecta.



3. LIBERACIÓN GRADUAL

Los nutrientes ocultos se liberan de forma controlada.



4. DISPONIBILIDAD

El nutriente permanece en la zona suelo-raíz por más tiempo.



5. ABSORCIÓN EFICIENTE

La planta aprovecha mejor los nutrientes disponibles.

¿CÓMO APLICAR EN CÍTRICOS?

Zona de gotera, cobertura y humedad.



BUENAS PRÁCTICAS



No aplicar pegado al tronco
Riesgo de daño y baja efectividad.



Evitar escorrentía
Aplicar en terreno estable y nivelado.



No aplicar antes de lluvia fuerte
Esperar al menos 24-48 horas después.



No dejar pellets expuestos
Siempre cubrir para evitar pérdida y aves.



Mantener cobertura vegetal manejada
Favorece humedad, vida del suelo y raíces.

REGLAS ANTES DE APLICAR

Aplicar bien es tan importante
como elegir el producto.



1. SUELO HÚMEDO

La humedad permite
mejor activación.



2. NO ENCHARCAR

El cítrico necesita
buena aireación radicular.



3. ZONA DE GOTERA

Aplicar donde hay
raíces activas.



4. NO PEGAR AL TRONCO

Evitar contacto con
cuello y corteza.



5. CUBRIR DESPUÉS

Usar suelo, compost,
hojarasca o mulch.



6. REVISAR CLIMA

Evitar lluvia
fuerte inmediata.

COMPLEMENTOS CLAVE



Poda sanitaria
si aplica



Retiro de
ramas secas



Manejo de
arvenses



Revisión
de brotes



Monitoreo
de plagas

NUTRICIÓN POR ETAPAS DEL CÍTRICO

Cada momento del árbol tiene una demanda dominante.

No se aplica por costumbre.
Se aplica según etapa.



NUTRICIÓN INTELIGENTE
En la etapa correcta, en la dosis correcta.



RAÍCES FORTES.
ÁRBOLES SANOS.
FRUTOS DE CALIDAD.



MÁS EFICIENCIA.
MAYOR CALIDAD.
MEJOR FUTURO.



SUELO VIVO.
PLANTAS VIGOROSAS.
SISTEMAS SOSTENIBLES.

ETAPA 1: SIEMBRA / ESTABLECIMIENTO

Raíz, adaptación y arranque del cítrico.



OBJETIVO

Ayudar al árbol a adaptarse, formar raíces y arrancar con buen entorno de suelo.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



COMPOST



2GROW



TRICHODERMA /
BACILLUS si aplica



DOSIS PRELIMINARES



COMPOST:
2-5 kg/planta



2GROW sólido:
50-150 g/planta



Bioinsumos:
según ficha



CÓMO APLICAR



Compost mezclado
con suelo o alrededor
del plato.



2GROW en corona
externa, sin contacto
directo con raíz tierna.



Bioinsumos al hoyo
o al sustrato, según
recomendación técnica.



PRECAUCIONES



No usar compost
fresco.



No poner fertilizante
concentrado sobre
raíz tierna.



Evitar encharcamiento.



Usar material vegetal
sano y de origen
confiable.



RAÍCES FUERTES



ADAPTACIÓN
EFECTIVA



SUELO
SALUDABLE



ARRANQUE
VIGOROSO



ETAPA 2: LEVANTE VEGETATIVO



Brotos, hojas, raíces y estructura inicial.



OBJETIVO

Impulsar crecimiento vegetativo, brotación y formación del árbol joven.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



2GROW

sólido 15-3-3



COMPOST

como soporte de suelo



2GROW

líquido si la logística aplica



DOSIS PRELIMINARES



0-12 meses:

100-250 g/planta



1-3 años:

250-700 g/planta



ANTES DE APLICAR



1
Limpiar plato



2
Controlar arvenses



3
Revisar humedad



4
Cubrir fertilizante



5
Hacer poda formativa suave si aplica



6
No aplicar con suelo seco

¿POR QUÉ ES CLAVE ESTA ETAPA?



Fortalece el sistema radicular desde el inicio.



Estimula brotes nuevos y hojas más sanas.



Mejora la estructura y vigor del árbol joven.



Prepara el árbol para las siguientes etapas productivas.

ETAPA 3: FORMACIÓN DE COPA

Arquitectura productiva y equilibrio del árbol.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2GROW

Nutrición para estructurar y fortalecer la formación.



2BALANCE

Equilibrio nutricional para ramas fuertes y copa estable.



COMPOST

si el suelo necesita soporte orgánico.

DOSIS PRELIMINAR



2GROW + 2BALANCE:

400 g – 1 kg / planta, ajustado por vigor, edad, patrón y manejo.

MANEJO CLAVE



Poda formativa



Retiro de ramas cruzadas



Evitar exceso vegetativo



Mantener cobertura



Registrar respuesta



DE CRECIMIENTO A EQUILIBRIO



Crecimiento dirigido



Equilibrio productivo

EVOLUCIÓN DEL ÁRBOL



ESTABLECIMIENTO
Raíces activas



CRECIMIENTO
Estructura inicial



FORMACIÓN DE COPA
Arquitectura y equilibrio



FLORACIÓN
Preparación productiva



PRODUCCIÓN
Sostenible y balanceada

BUENAS PRÁCTICAS



Observar y actuar a tiempo



Adaptar al ambiente



Nutrir con propósito



Construir productividad desde la base



ETAPA 4:

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO

Equilibrio nutricional para sostener el cítrico.



OBJETIVO

Sostener el árbol, mantener la producción sin inducir excesivo crecimiento vegetativo, asegurando fruta de calidad.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2BALANCE

sólido 7-7-7

Nutrición balanceada para sostener la producción.



COMPOST

si falta materia orgánica

Mejora la estructura del suelo y la disponibilidad de nutrientes.



2BALANCE

líquido 70-70-70

Si aplica, para refuerzo en momentos clave.



DOSIS PRELIMINAR



2BALANCE

700 g – 1.5 kg
por planta



CÓMO APLICAR



En la zona de gotera



Con el suelo húmedo



Distribuir uniformemente



Cubrir ligeramente



PRECAUCIÓN

Si hay brotación floral o floración activa, planear transición hacia **2BLOOM**.



MANEJO CLAVE



Mantener cobertura



Evitar exceso vegetativo



Revisar humedad



Ajustar según carga de fruto



Registrar respuesta

HECHO EN

Antioquia

Sostener hoy, producir mejor mañana.

ETAPA 5: PREFLORACIÓN



Preparar brotación floral
y flor de azahar.



OBJETIVO

Acompañar la transición reproductiva
y preparar la floración.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2BLOOM

sólido 3-8-3

Nutrición equilibrada para
estimular la floración y
fortalecer la planta.



2BLOOM

líquido 30-80-30
si aplica

Aporta fósforo y potasio
de rápida disponibilidad
cuando se requiere.



COMPOST

si el suelo está bajo
en materia orgánica.



DOSIS PRELIMINAR

2BLOOM
500 g - 1.2 kg / planta



MOMENTO

Antes de floración
esperada, con humedad
disponible y lectura
del lote.



PRECAUCIÓN

Evitar exceso de
nitrógeno en esta etapa.

¿EN QUÉ MOMENTO ESTAMOS?



BROTE VEGETATIVO



BOTÓN FLORAL



PREFLORACIÓN

CLAVES PARA ESTA ETAPA



Revisar humedad
del suelo y cobertura
vegetal.



Cubrir el fertilizante
con suelo para mejor
aprovechamiento.



Monitorear brotes
y avance de la yema
floral.



Registrar lote, fecha
y condiciones del
manejo.

HECHO EN *Antioquia*



Una flor bien preparada hoy,
es una cosecha abundante mañana.

ETAPA 6: FLORACIÓN Y CUAJADO

Flor, polinización y primeros frutos.



OBJETIVO

Acompañar la floración y el cuajado sin generar estrés.



FLOR



CUAJADO



FRUTO PEQUEÑO

PRODUCTOS / SOPORTES



2BLOOM LÍQUIDO

Aporta nutrición balanceada para favorecer floración y cuajado.



2BLOOM SÓLIDO

Si no se aplicó antes, apoya de forma prolongada y equilibrada.



BORO / ZINC / CALCIO FORMULACIÓN A LA MEDIDA

Solo si el análisis, la etapa y el criterio técnico lo justifican.



PRECAUCIÓN

El boro puede ser importante, pero no debe aplicarse por rutina.



MANEJO CLAVE



Mantener humedad estable
La disponibilidad de agua es clave para el cuajado.



Evitar estrés hídrico
El déficit o exceso de agua puede causar caída de flor y fruto pequeño.



No aplicar mezclas agresivas
Evitar productos incompatibles o de alta carga salina.



Monitorear caída de flor y fruto pequeño
Evaluar causas y ajustar manejo a tiempo.



Evitar podas fuertes en plena floración
Puede inducir estrés y pérdida de flores.



NUTRICIÓN INTELIGENTE EN CADA ETAPA. FRUTOS QUE HABLAN DE CUIDADO.



MEJOR FLORACIÓN
Y CUAJADO



MAYOR RETENCIÓN
DE FRUTOS



FRUTOS MÁS
UNIFORMES



POTENCIAL DE
RENDIMIENTO



CALIDAD DESDE
EL INICIO



ETAPA 7: LLENADO DE FRUTO

Fruto, jugo, calibre y
demanda de potasio.



OBJETIVO

Sostener el llenado de fruto,
el crecimiento, la calidad del jugo
y la carga productiva.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2FRUIT

sólido 3-3-8

Nutrición rica en potasio
para mejor llenado,
color y calidad.



2FRUIT

líquido 30-30-80
si aplica

Refuerzo de potasio
para alta demanda.



COMPOST

como soporte
de suelo

Mejora la retención
de humedad y la
actividad biológica.

DOSIS PRELIMINAR



0-12 meses:

800 g - 2 kg/planta

Ajustar según edad del árbol,
variedad, carga y análisis de suelo.



LIMÓN

NARANJA

MANDARINA



CRECIMIENTO Y LLENADO DEL FRUTO



Mayor tamaño, más jugo, mejor calidad.



APLICACIÓN EN ZONA DE GOTERA

Distribuir el fertilizante en el perímetro
de la copa, nunca junto al tronco.



MANEJO CLAVE



Mantener humedad estable



Evitar competencia de arvenses



Cubrir fertilizante



Registrar carga y
desarrollo de fruto



Monitorear sanidad



PRECAUCIÓN

Sin humedad
estable, baja la
eficiencia del
programa.



¿POR QUÉ ES CLAVE ESTA ETAPA?



Mejora el llenado
y el calibre del fruto.



Aumenta el jugo,
color y °Brix.



Satisface la alta demanda
de potasio en esta fase.



Eleva la productividad
y la calidad comercial.



Fortalece la resistencia
natural del árbol.

COSECHA Y CALIDAD



Observar, registrar y preparar recuperación.



OBJETIVO

Usar la cosecha como una lectura del programa nutricional y sanitario para tomar mejores decisiones y preparar el siguiente ciclo.



PRÁCTICAS CLAVE EN COSECHA



REGISTRAR CARGA

Anotar cantidad estimada por árbol y por lote.



OBSERVAR TAMAÑO Y UNIFORMIDAD

Medir calibre y verificar uniformidad por muestra.



EVALUAR COLOR, CÁSCARA, JUGO Y SANIDAD

Revisar color externo e interno, cáscara, % jugo y presencia de defectos.



IDENTIFICAR CAÍDA PREMATURA

Evaluar causas: nutrición, riego, plagas o estrés.



COMPARAR LOTES

Contrastar resultados entre lotes y tendencias del ciclo.



PLANEAR POSCOSECHA

Definir lavado, selección, almacenamiento y transporte.

COMPARACIÓN RÁPIDA DE LOTE (EJEMPLO)

LOTE	CARGA aprox. (kg/árbol)	CALIBRE promedio (mm)	% JUGO	COLOR (1-5)	SANIDAD (1-5)	UNIFORMIDAD (1-5)
Lote A	38	62,5	48%	4	4	4
Lote B	32	58,0	45%	3	3	3
Lote C	41	63,0	50%	5	5	5

Escala 1 (bajo) - 5 (excelente). Registrar fecha y responsable.

INDICADORES DE CALIDAD

	COLOR	Uniforme y característico de la variedad	
	CÁSCARA	Firme, lisa, sin daños ni manchas	
	% JUGO	Mayor rendimiento, mejor calidad comercial	
	SANIDAD	Libre de plagas, gripes y podredumbres	

CHECKLIST DE COSECHA

- ☐ Registrar carga por árbol y por lote
- ☐ Medir tamaño y uniformidad de fruta
- ☐ Evaluar color externo e interno
- ☐ Verificar cáscara y % de jugo
- ☐ Revisar sanidad y presencia de defectos
- ☐ Identificar caída prematura y causas
- ☐ Comparar con ciclos y lotes anteriores
- ☐ Planear manejo poscosecha y recuperación



ASESORÍA

No hacer aplicaciones fuertes cerca de cosecha sin criterio técnico.

Priorizar observación, registro y planificación del siguiente ciclo.

TARJETA DE COSECHA RÁPIDA

Fecha	Lote				
Variedad	Responsable				
Calidad general de fruta (1-5):	1	2	3	4	5
Rendimiento (% jugo) (1-5):	1	2	3	4	5
Sanidad general (1-5):	1	2	3	4	5
Observaciones clave:					

POSCOSECHA / RECUPERACIÓN

Rebrote, reservas y preparación del siguiente ciclo.



Objetivo: acompañar la recuperación del árbol después de la cosecha, situaciones de estrés, poda o cargas altas, fortaleciendo raíces, reservas y brotes nuevos.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



COMPOST

Nutrición orgánica y mejora de la estructura del suelo.



2GROW

Nutrición para reactivar brotes y raíces.



2BALANCE

Si el árbol necesita equilibrio nutricional y desarrollo estable.



TRICHODERMA / BACILLUS

Útiles biológicos que apoyan la salud radicular en situaciones de estrés.

DOSIS PRELIMINARES



COMPOST

3-8 kg/planta



2GROW / 2BALANCE

500g-1.5 kg/planta



Ajustar dosis según edad del árbol, análisis de suelo, condición del cultivo y objetivos de producción.

ACTIVIDADES CLAVE



1

Poda sanitaria



2

Retiro de ramas secas



3

Mahejo de arvenses



4

Cobertura del suelo



5

Revisión de humedad



6

Registro de respuesta

SECUENCIA DE RECUPERACIÓN



Después de la cosecha o poda



Broto inicial



Desarrollo de brotes y raíces



Recuperación de reservas y vigor



Preparación para el siguiente ciclo



PRECAUCIÓN

No fertilizar fuerte inmediatamente después de una poda severa o estrés hídrico.



COMPOST



2GROW



2BALANCE



TRICHODERMA
BACILLUS



SOLUCIONES
QUE NUTREN

MANEJO FITOSANITARIO INTEGRADO



Nutrir bien ayuda, pero la sanidad se maneja con monitoreo, poda, material sano y registro.

1 HLB / DIAPHORINA CITRI



QUÉ OBSERVAR

- Moteado irregular.
- Amarillamiento asimétrico.
- Brotes afectados.
- Caída de frutos.
- Presencia del psílido.



QUÉ HACER

- Monitorear brotes y presencia del psílido.
- Usar material vegetal certificado.
- Registrar focos.
- Consultar soporte técnico.

2 GOMOSIS / PHYTOPHTHORA



QUÉ OBSERVAR

- Exudados en tronco.
- Pudrición de cuello.
- Decaimiento del árbol.



QUÉ HACER

- Mejorar drenaje.
- Evitar encharcamiento.
- Proteger el cuello del árbol.
- Consultar manejo técnico.

3 MINADOR / ÁCAROS / COCHINILLAS

QUÉ OBSERVAR

- Daño en brotes tiernos.
- Hojas enrolladas o deformadas.
- Manchas, melaza o debilitamiento.



QUÉ HACER

- Monitoreo temprano y frecuente.
- Identificar el problema y actuar a tiempo.
- Aplicar manejo integrado cultural, biológico y químico responsable.

4 FUMAGINA

QUÉ OBSERVAR

- Capa negra (hollo) sobre hojas o frutos.
- Asociada a presencia de melaza.



QUÉ HACER

- Revisar y controlar insectos asociados (productores de melaza).
- Mejorar ventilación y manejo del árbol.
- Limpieza de ramas y hojas afectadas.

MONITOREO CONSTANTE



Revisar brotes nuevos cada 7-10 días.



Inspeccionar el envés de las hojas.



Usar trampas amarillas para psílidos.



Registrar hallazgos, fechas y acciones tomadas.



Consultar a tiempo a su asistente técnico.



Actualizar de forma preventiva y responsable.



Los bioinsumos pueden apoyar el manejo integrado, pero no reemplazan monitoreo, poda, material vegetal sano ni criterio técnico.



PRÁCTICAS QUE FORTALECEN LA SANIDAD



Material vegetal sano y certificado.



Poda oportuna y desinfección de herramientas.



Nutrición balanceada y suelos sanos.



Manejo de coberturas y drenajes.



Higiene del lote y control de malezas.



Registro y evaluación continua.

RESCATES NUTRICIONALES Y DEFICIENCIAS

Cuando el cítrico muestra señales,
identifica primero la causa dominante.



SEÑAL DEL CULTIVO	POSIBLE NECESIDAD	ACCIÓN BASE RECOMENDADA
BAJO VIGOR	energía vegetativa o suelo débil	2GROW + COMPOST
HOJAS PÁLIDAS	N, Mg, Fe o estrés radicular	revisar diagnóstico + 2GROW / formulación a medida
FLORACIÓN DÉBIL	baja energía reproductiva	2BLOOM
BAJO CUAJADO	estrés hídrico, B/Zn/Ca o sanidad	revisar agua + 2BLOOM + formulación a medida
FRUTO PEQUEÑO	soporte de llenado y K	2FRUIT
SUELO DURO O POBRE	baja materia orgánica o compactación	COMPOST
RAÍZ DÉBIL	entorno biológico afectado	COMPOST + BIOINSUMOS




DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS

N	2GROW
P	2BLOOM
K	2FRUIT
Mg / Ca / B / Zn / Fe / Mn	formulación a medida según análisis

Nota: Los menores y secundarios no se aplican por costumbre.

FORMULACIÓN a la medida

- Basado en análisis de suelo, tejido y agua.
- Enfocada en la causa dominante y el equilibrio del sistema.
- Resultados visibles, sostenibles y rentables.



BIOINSUMOS Y VIDA DEL SUELO

Complementos biológicos para raíz, entorno y manejo integrado.



TRICHODERMA

raíz y recuperación.

Hongo beneficioso que coloniza la raíz, mejora la estructura del suelo y ayuda a su recuperación.



BACILLUS SUBTILIS

entorno biológico.

Bacteria beneficiosa que compite con patógenos y favorece un entorno radicular saludable.



BEAUVERIA

manejo integrado.

Hongo entomopatógeno que actúa sobre insectos plaga en distintas etapas.



METARHIZIUM

manejo integrado.

Hongo entomopatógeno complementario, eficaz contra insectos del suelo y follaje.



EXTRACTO AJO AJÍ

apoyo botánico preventivo.

Extracto vegetal que ayuda a repeler y desestimular plagas de forma preventiva.



Los bioinsumos no reemplazan el programa nutricional. Lo complementan cuando existe una función concreta.

CUIDADO EN LA APLICACIÓN



Aplicar con humedad.



Usar agua limpia.



Evitar sol fuerte.



Separar de fungicidas fuertes, cobre, bactericidas y productos alcalinos.



Hacer prueba de compatibilidad.



Registrar aplicación.

COMPATIBILIDAD GENERAL



Compatible con biofertilizantes, aminoácidos y extractos vegetales.



Compatible con la mayoría de nutrientes foliares y sistémicos.



Compatibilidad variable con aceites minerales. Realizar prueba.



No mezclar con cobre, azufre, bactericidas y alcalinos fuertes.



Consultar siempre la ficha técnica del producto.

REGISTRA PARA MEJORAR

Lo que no se mide, no se puede ajustar.

[illegible]

ERRORES COMUNES

1. Aplicar con suelo seco.
2. Aplicar pegado al tronco.
3. No cubrir fertilizante.
4. Aplicar antes de lluvia fuerte.
5. Fertilizar sin identificar etapa.
6. Usar la misma dosis para todos los lotes.
7. Exceso de nitrógeno en floración.
8. Ignorar síntomas sanitarios.
9. Mezclar bioinsumos con incompatibles.
10. Aplicar Ca, B, Zn, Mg, Fe o Mn sin análisis.



**Nutrición por etapas
para un lote citrícola más ordenado.**



Wondergreen acompaña los cítricos desde el establecimiento hasta la cosecha, integrando compost, organominerales, líquidos de apoyo, bioinsumos y formulaciones a la medida cuando el cultivo lo requiere.



HECHO EN
Antioquia

CON CIENCIA,
EXPERIENCIA
Y NATURALEZA



COMPOST



26ROW



2BALANCE



29. DOM



2FRONT



BIDINSUMOS