

GUÍA WONDERGREEN PARA PASTOS Y PRADERAS

Nutrición, rebrote y
manejo del potrero.

Del suelo al forraje: acompaña
cada ciclo de pastoreo con nutrición
organomineral, compost y bioinsumos.

HECHO EN
Antioquia



SUELO



RAÍZ



POTRERO



REBROTE



GANADO



CICLO



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2FRUIT



BIOINSUMOS

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?

Una herramienta práctica para decidir qué aplicar, cuándo aplicarlo y cómo mejorar el rebrote del potrero.

Esta guía ayuda al productor a leer el estado de la pradera, ajustar la nutrición por ciclo y aplicar Wondergreen con mayor criterio técnico.

wondergreen
NUTRIENTS

GREENATICS
— SOLUCIONES QUE NUTREN —

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?



Diagnóstico del potrero



Nutrición por área



Aplicación al voleo



Manejo de rotación



Recuperación de potreros



Bioinsumos y raíz



Registro de carga y rebrote



RUTA SIMPLE, RESULTADOS REALES



OBSERVAR



APLICAR



DESCANSAR



REGISTRAR

DIAGNOSTICA TU POTRERO ANTES DE APLICAR

Antes de elegir producto, revisa vigor, suelo, humedad, carga animal y descanso.

CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO



1. ESPECIE FORRAJERA



☐ Identifica la especie predominante.



2. ALTURA DEL PASTO



☐ Mide en cm el promedio del potrero.



3. COLOR Y VIGOR



☐ Verifica color, densidad y crecimiento.



4. COBERTURA DEL SUELO



☐ Estima el % de suelo cubierto por pasto.



5. HUMEDAD



☐ Evalúa humedad profunda del suelo.



6. COMPACTACIÓN



☐ Presiona el suelo, observa resistencia e infiltración.



7. PRESENCIA DE MALEZAS



☐ Identifica malezas presentes y su nivel.



8. DAÑO POR PLAGAS



☐ Revisa daños en hojas o tallos.



9. CARGA ANIMAL



☐ Estima la carga animal actual (UGC/ha).



10. DÍAS DE DESCANSO



☐ Registra los días desde el último pastoreo o corte.

Diagnóstico primero, aplicación después.

SISTEMA DE DECISIÓN

Suelo pobre



COMPOST

Rebrote débil



2GROW

Mantenimiento



2BALANCE

Alta extracción por corte



2FRUIT

Raíz / suelo biológico



BIOINSUMOS

Necesidad específica de P



2BLOOM solo si aplica

Observaciones

- ✓ Color
- ✓ Densidad
- ✓ Humedad
- ✓ Compactación
- ✓ Malezas
- ✓ Plagas
- ✓ Altura

Croquis del potrero



El potrero responde mejor cuando descansa.

¿QUÉ SON LOS PELLETS ORGANOMINERALES OCLUIDOS?

Una forma práctica de llevar nutrición gradual al suelo del potrero.

Son pellets que integran materia orgánica y nutrientes minerales en una matriz física estable. Su valor no está solo en el NPK, sino en cómo acompañan la permanencia del nutriente en la zona suelo-raíz.

NO ES SOLO NPK

También importa cómo se comporta el nutriente en el suelo.



MATRIZ ORGÁNICA

Materia orgánica estabilizada que da estructura, protege y alimenta la vida del suelo.

NUTRIENTES MINERALES

Fuentes minerales esenciales integradas en la matriz para una nutrición balanceada.

NUTRIENTES OCLUIDOS

Los nutrientes quedan físicamente atrapados dentro de la matriz, reduciendo pérdidas y volatilización.

LIBERACIÓN MÁS GRADUAL

La matriz se degrada lentamente, liberando los nutrientes poco a poco, según la actividad biológica y la humedad del suelo.

PERMANENCIA EN SUELO-RAÍZ

El nutriente permanece por más tiempo en la zona donde las raíces lo absorben, mejorando la eficiencia y el aprovechamiento por la pradera.

Menos pérdidas por lavado, volatilización y fijación.

Más disponibilidad para la planta por más tiempo.

Mejora la vida del suelo y su capacidad productiva.

Pasturas más vigorosas, persistentes y productivas.

¿CÓMO APLICAR EN PASTOS?

Aplicación al voleo, humedad y descanso del potrero.

1 APLICAR AL VOLEO



Distribuir uniforme sobre el potrero.

2 ACTIVAR CON HUMEDAD



Aplicar con humedad disponible.

3 DEJAR DESCANSAR



Evitar entrada inmediata del ganado.

4 REGISTRAR



Anotar fecha, producto, dosis, potrero y respuesta.



Distribución uniforme al voleo

APLICACIÓN



DESCANSO



Permitir que el suelo y el pasto respondan.

REINGRESO



Ingresar el ganado cuando el potrero esté listo.



BUENAS PRÁCTICAS



No aplicar con suelo seco.



No aplicar antes de lluvia fuerte.



Evitar zonas encharcadas.



Distribuir de forma uniforme.



Respetar descanso del potrero.

REGLAS ANTES DE APLICAR

Una buena aplicación empieza con un buen potrero preparado.

1 SUELO HÚMEDO



La humedad permite mejor activación.

2 PASTO NO ENCHARCADO



Evitar aplicaciones sobre saturación.

3 DESPUÉS DEL PASTOREO



Aplicar cuando el ganado salga del potrero.

4 DISTRIBUCIÓN UNIFORME



Evitar montones o franjas concentradas.

5 CONTROL DE MALEZAS



Reducir competencia por luz y nutrientes.

6 DESCANSO



Permitir rebrote antes de nueva entrada.



KIKUYO
(Pennisetum clandestinum)



PASTO ELEFANTE
(Pennisetum purpureum)



ABROJO
(Xanthium spinosum)



BROMO
(Bromus catharticus)

HECHO EN
Antioquia
PARA NUESTROS POTREROS

GREENATICS
SOLUCIONES SUBSTRATO



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2FRUIT



BIOINSUMOS

wondergreen
NUTRIENTS



GREENATICS
— SOLUCIONES QUE NUTREN —



ETAPA 1: ESTABLECIMIENTO / RENOVACIÓN

Suelo, raíz y arranque de la pradera.



OBJETIVO

Ayudar al pasto a establecer raíces, cubrir suelo y arrancar con buen vigor.



PRODUCTOS CLAVE



COMPOST



2GROW



TRICHODERMA / BACILLUS
si aplica

PRODUCTO	DOSIS PRELIMINAR (POR HECTÁREA)	EQUIVALENTE (POR 100 m ²)	FUNCIÓN PRINCIPAL
 COMPOST	 1–3 t/ha	 10–30 kg/100 m ²	Mejora la estructura del suelo, aporta materia orgánica y activa la vida del suelo.
 2GROW	 100–250 kg/ha	 1–2,5 kg/100 m ²	Estimula el desarrollo radicular y el establecimiento uniforme de la pradera.
 TRICHODERMA / BACILLUS (si aplica)	 Según ficha técnica	 Según ficha técnica	Promueve un ambiente radicular saludable y competencia biológica en el suelo.

CÓMO APLICAR



Incorporar compost antes o durante la renovación.



Aplicar 2GROW al voleo sobre el suelo con humedad.



Evitar pastoreo temprano para permitir el enraizamiento.

BENEFICIOS EN ESTA ETAPA



Raíces más profundas y extensas



Cobertura rápida del suelo



Mayor tolerancia al estrés y al pastoreo



Suelo más fértil, poroso y con vida



Establecimiento uniforme y productivo

ETAPA 2: REBROTE VEGETATIVO

Hojas nuevas, cobertura y recuperación pospastoreo.



OBJETIVO

Acompañar el rebrote después del pastoreo o corte.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



2GROW
SÓLIDO 15-3-3



COMPOST
como soporte
de suelo



2GROW
LÍQUIDO
(si la logística aplica)

DOSIS PRELIMINARES

2GROW:

80-180 kg/ha

Equivalente:

0,8-1,8 kg/100 m²



MOMENTO IDEAL



Después de salida del ganado o corte, con humedad y antes del rebrote fuerte.



ANTES DE APLICAR



Revisar
altura
residual



Controlar
malezas



Evitar
suelo seco



Respetar
descanso

*Cada rebrote
es una nueva
oportunidad
para producir
con vida.*



SUELO VIVO



NUTRICIÓN GRADUAL



REGENERACIÓN



PASTOREO INTELIGENTE



RESULTADOS VISIBLES

ETAPA 3: MANTENIMIENTO DE PRADERA

Persistencia, equilibrio
y cobertura del suelo.



OBJETIVO

Sostener vigor del potrero
sin depender solo de impulsos
nitrogenados.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



ZBALANCE
SÓLIDO
7-7-7



COMPOST
si falta materia
orgánica



COMPOST
LÍQUIDO
si aplica

DOSIS PRELIMINAR

ZBALANCE:
80–200 kg/ha

Equivalente:
0,8–2 kg/100 m²

MANEJO CLAVE



Mantener
cobertura



Evitar
sobrepastoreo



Corregir
compactación



Registrar
días de descanso



Ajustar carga
animal

¿POR QUÉ IMPORTA ESTA ETAPA?

Una pradera bien mantenida conserva su productividad, mejora la calidad del forraje, protege el suelo y asegura resistencia a sequías y lluvias.



RAÍCES ACTIVAS
Más absorción,
más estabilidad



COBERTURA
CONTINUA
Menos erosión,
más vida



PRODUCCIÓN
SOSTENIDA
Más leche, más
peso, más futuro

HECHO EN

Antioquia



NUTRICIÓN INTEGRAL



SALUD DEL SUELO



REGENERACIÓN



BIENESTAR ANIMAL

ETAPA 4: PASTO DE CORTE / ENSILAJE

Alta extracción, rebrote rápido y soporte nutricional.

Los sistemas de corte y acarreo o ensilaje extraen mayores volúmenes de biomasa y nutrientes del suelo. Por eso, necesitan reposición más estructurada y oportuna para sostener la productividad y la calidad del forraje.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2FRUIT SÓLIDO 3-3-8 (NPK)

Reposición de K, soporte a la producción y calidad del forraje.



COMPOST como soporte de suelo

Aporta materia orgánica, mejora estructura, retención de humedad y actividad biológica.



2FRUIT LIQUIDO 30-30-30

Para aplicaciones líquidas cuando la logística lo permite.

DOSIS PRELIMINAR

2FRUIT:
80–180 kg/ha

Equivalente:
0,8–1,8 kg/100 m²



Aplicar después del corte con humedad en el suelo para mejor aprovechamiento.

CLAVES DE MANEJO



Los cortes frecuentes extraen más K.



Aplicar después del corte con humedad en el suelo.



Mantener periodo de descanso adecuado para una recuperación eficiente.



Monitorear altura de rebrote para definir el próximo corte.



Registrar rendimiento de forraje y ajustar el plan nutricional.

PASTOREO ROTACIONAL

VS

PASTO DE CORTE



- ✓ Extracción moderada de biomasa.
- ✓ Menor demanda de nutrientes.
- ✓ Enfoque en mantenimiento del pasto y cobertura.



- ✓ Alta extracción de biomasa.
- ✓ Mayor demanda de nutrientes (especialmente K).
- ✓ Enfoque en productividad y calidad del forraje.

CORTE, ENSILAJE Y CALIDAD



Corte en el momento óptimo



Picado y compactación adecuada



Ensilar y sellar correctamente



Conservación y aprovechamiento eficiente

Una buena nutrición hoy, se convierte en más kilos de forraje mañana.

Nutrimos el suelo para alimentar la vida.

NOTA TÉCNICA

La extracción de 10 toneladas de materia seca puede retirar del suelo aproximadamente:

25–35 kg de N | 5–8 kg de P₂O₅ | 40–60 kg de K₂O

POTREROS DEGRADADOS

Cómo iniciar la recuperación de suelos cansados, compactados o con baja cobertura.

Los potreros degradados suelen presentar baja cobertura vegetal, suelo expuesto, rebrote lento, compactación, escorrentía y raíces débiles. Con manejo y nutrición orgánica adecuada, el suelo vuelve a producir.

¿CÓMO RECONOCERLO?

-  Cobertura vegetal menor al 50%
-  Suelo compacto, duro o encharcado
-  Parches desnudos y erosión
-  Rebrote lento o irregular
-  Raíces cortas y poco profundas

EL SUELO SANO ES PRODUCTIVO

-  Mayor cobertura y protección
-  Mejor infiltración y retención de agua
-  Rebrote vigoroso y continuo
-  Raíces profundas, suelos vivos
-  Más forraje, más animal, más vida

NUTRICIÓN ORGÁNICA PARA RECUPERAR

COMPOST

Base para recuperar estructura, fertilidad y vida del suelo.

 RANGO SUGERIDO
2-5 t/ha

2GROW

Activa el rebrote y la producción de forraje desde la raíz.

 RANGO SUGERIDO
80-180 kg/ha

BIOINSUMOS

Apoyan la biología del suelo y el desarrollo radicular.

 RANGO SUGERIDO
Según ficha técnica

 Aplique sobre suelo húmedo o antes de lluvias.

Notas de campo

Fecha: _____
Potrero: _____
Área: _____
Observaciones iniciales:

Próxima revisión:

RUTA DE ACCIÓN: PASO A PASO

- 1**  **DIAGNOSTICAR**
Evalúe cobertura, suelo y rebrote.
- 2**  **REDUCIR PRESIÓN ANIMAL**
Ajuste carga y tiempo de pastoreo.
- 3**  **CORREGIR PARCHES DESNUDOS**
Resiembrar o trasplantar en zonas críticas.
- 4**  **APLICAR SOPORTE ORGÁNICO**
Compost, 2Grow y bioinsumos.
- 5**  **DAR DESCANSO AL POTRERO**
Permita que el pasto se recupere.
- 6**  **MONITOREAR LA RECUPERACIÓN**
Revise cobertura, rebrote y suelo.

COMPACTACIÓN Y SALUD DEL SUELO

Cuando el suelo se endurece, el potrero deja de responder.

El pisoteo repetido y el mal manejo comprimen las partículas del suelo, reduciendo los poros y bloqueando el flujo de agua, aire y raíces.



MENOR INFILTRACIÓN

El agua escurre en lugar de penetrar.



MENOR EXPLORACIÓN DE RAÍCES

Las raíces no encuentran espacio ni nutrientes.



MENOR AIREACIÓN

Falta de oxígeno, vida microbiana limitada.



MENOR REBROTE Y PRODUCCIÓN

El pasto se debilita y el potrero rinde menos.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN CAMPO

1. HUELLAS PROFUNDAS



☐ La marca del casco permanece y se llena de agua.

2. SUPERFICIE DURA



☐ El suelo se siente duro y resaca al caminar.

3. INFILTRACIÓN POBRE



☐ El agua tarda en entrar o se queda en charcos.

4. RAÍCES SUPERFICIALES



☐ Las raíces se ven cortas y horizontales, no profundizan.

5. ZONAS DESNUDAS



☐ Aparecen parches sin cobertura vegetal o muy raída.

3 CLAVES PARA RECUPERAR LA SALUD DEL SUELO



COMPOST

Mejora la estructura, aumenta la materia orgánica y la retención de humedad.



BIOINSUMOS

Activan la vida del suelo, mejoran la descomposición y la disponibilidad de nutrientes.



MEJOR MANEJO DEL PASTOREO

Reduce el pisoteo repetido y permite la recuperación del pasto y del suelo.

SUELO COMPACTADO

SUELO SALUDABLE



RECOMENDACIONES PRÁCTICAS



ROTAR MEJOR

Aumenta los días de descanso y planifica tus potreros.



EVITAR SOBREPASTOREO EN SUELOS SATURADOS

No entres con el ganado cuando el suelo esté muy húmedo.



APORTAR MATERIA ORGÁNICA

Incorpora compost o abonos orgánicos de forma regular.



PROTEGER LA COBERTURA

Mantén el suelo cubierto para reducir impacto de gotas y pisoteo.



MONITOREAR INFILTRACIÓN

Haz la prueba del frasco o del hoyo para evaluar mejoras.



BIOINSUMOS Y RAÍZ

Vida del suelo para apoyar rebrote, entorno radicular y recuperación.



HIFAS BENEFICIAS



BACTERIAS BENEFICIAS



HONGOS BENEFICIOSOS



RAÍCES ACTIVAS



Los bioinsumos de Wondergreen complementan tu plan nutricional. No reemplazan un manejo técnico.

TRICHODERMA



Hongo beneficioso que favorece un entorno radicular saludable.

- Competencia natural con patógenos
- Mejora del entorno microbiano
- Apoyo a la exploración radicular

BACILLUS SUBTILIS



Bacteria beneficiosa que promueve equilibrio biológico en el suelo.

- Combate con patógenos
- Favorece la actividad microbiana
- Apoya disponibilidad de nutrientes

BEAUVERIA



Hongo entomopatógeno que apoya el manejo integrado.

- Actúa sobre insectos del suelo
- Herramienta para manejo integrado
- Aporta a la sanidad del sistema

METARHIZIUM



Hongo entomopatógeno que complementa el manejo integrado.

- Actúa sobre insectos objetivo
- Apoya el equilibrio biológico
- Utl en estrategias preventivas

EXTRACTO AJO AJÍ



Extracto botánico que apoya el equilibrio biológico.

- Aporte de compuestos naturales
- Apoya defensas naturales
- Herramienta en manejo integrado

COMPATIBILIDAD Y CUIDADOS



Aplicar con humedad en el suelo o después de lluvias.



Usar agua limpia y de buena calidad.



Evitar aplicación con sol intenso.



Separar de fungicidas fuertes, cobres y productos alcalinos.



Realizar prueba de compatibilidad previa.



Registrar fecha, producto, dosis y condiciones.

Notas de aplicación

Patrimo ?
Fecha: 18/05/20
• Humedad adecuada
• Suelo con buen rebrote
• Aplicar al atardecer

Plan bioinsumos

Trichoderma 1 kg/ha
Bacillus subtilis 1 kg/ha
Beauveria 0.5 kg/ha
Metarhizium 0.5 kg/ha
Extracto Ajo Ají 1 L/ha



VIDA DEL SUELO,
SOSTENIBILIDAD
Y PRODUCTIVIDAD



Más raíces,
mejor rebrote.



Equilibrio
microbiano.



Procesos
naturales activos.



Suelos sanos,
praderas productivas.

PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS

Nutrir mejor ayuda, pero el manejo del potrero también exige observación y control integrado.

1 MALEZAS: COMPETENCIA QUE QUITA PRODUCCIÓN



- Competen por luz, agua y nutrientes.
- Reducen el rendimiento y la calidad.
- Disminuyen la persistencia de las especies deseadas.
- Su control es más fácil cuando se detectan a tiempo.

2 INSECTOS Y DAÑOS FOLIARES EN EL PASTO



- El daño foliar reduce el área fotosintética y el rebrote.
- Los ataques severos bajan la carga animal y la calidad del forraje.
- Identificar temprano el insecto y el nivel de daño es clave.
- El monitoreo constante evita pérdidas mayores.

3 CONDICIONES QUE FAVORECEN ENFERMEDADES Y BAJO DESEMPEÑO SANITARIO



- Exceso de humedad, mal drenaje y sombra aumentan la presión de enfermedades.
- Suelos compactados y sobrepastoreo debilitan el pasto.
- La falta de cobertura y materia orgánica eleva el estrés de la pradera.
- El manejo del descanso y la humedad es clave para prevenir.

	👁️ ¿QUÉ OBSERVAR?	✅ ¿QUÉ HACER?
	Manchas de malezas o avance de invasoras.	Identificar la especie y su origen. Controlar antes de que se multipliquen. Mejorar cobertura y fertilidad para reducir la competencia.
	Defoliación o daño en las hojas.	Revisar el tipo de daño e insecto presente. Evaluar el porcentaje de área afectada. Tomar decisiones oportunas y selectivas.
	Manchas amarillas o pérdida de vigor.	Verificar drenajes, humedad y compactación. Ajustar nutrición y descanso. Evitar sobrepastoreos.
	Zonas húmedas con problemas recurrentes.	Mejorar drenaje y circulación de agua. No concentrar animales en esas áreas. Incluir especies más tolerantes o resistentes.
	Rebrote lento después de un ataque o pastoreo.	Verificar fertilidad, pH y materia orgánica. Ajustar nutrición y tiempos de descanso. Integrar nutrición con manejo del pastoreo.



 PASTOREO INTELIGENTE + NUTRICIÓN INTEGRAL = PASTURAS PRODUCTIVAS Y RESILIENTES 



OBSERVA
TU POTRERO



IDENTIFICA
A TIEMPO



TOMA ACCIONES
OPORTUNAS



EQUILIBRA
Y PRODUCTIVIDAD




INTEGRA NUTRICIÓN
Y MANEJO

RESCATES DEL POTRERO

Qué hacer cuando el rebrote no responde como esperas.

Cada potrero tiene su historia. Esta matriz te ayuda a identificar señales y aplicar la acción base más efectiva para recuperar el rebrote y mantener pastos productivos y resilientes.



*Aplicar con criterio técnico según análisis del potrero y objetivos productivos.



NOTA IMPORTANTE

Estas recomendaciones son preliminares y dependen del diagnóstico, la especie forrajera, la humedad, la carga animal y el manejo.



OBSERVA

el estado del potrero



DIAGNOSTICA

la causa raíz



ELIGE

la acción base



APLICA

con precisión



EVALÚA

los resultados



AJUSTA

el manejo



DEFICIENCIAS NUTRICIONALES EN PASTOS

🌿 Señales del potrero, interpretación prudente 🌿
y apoyo Wondergreen.

NUTRIENTE / FACTOR	SEÑALES EN EL PASTO	QUÉ OBSERVAR	APOYO WONDERGREEN
NITRÓGENO (N) Motor del crecimiento vegetativo.	 Vigor débil / color verde pálido	Crecimiento lento Hojas angostas y pálidas Menor producción de forraje	2GROW Formulaciones con N para potenciar crecimiento y vigor.
FÓSFORO (P) Esencial para raíces y establecimiento.	 Raíces débiles / mal establecimiento	Raíces cortas y poco ramificadas Color verde oscuro o violáceo en hojas Lento macollamiento y cobertura	2BLOOM Usar SOLO cuando el diagnóstico técnico lo confirma.
POTASIO (K) Regula uso de agua, turgencia y persistencia.	 Respuesta débil bajo alta extracción / baja persistencia	Bordes o puntas de hojas secas o quemadas Menor tolerancia a sequía y pisoteo Rebrote lento tras el pastoreo	2FRUIT Formulaciones con K para mejorar tolerancia, calidad y persistencia.
MATERIA ORGÁNICA BAJA Base de la fertilidad del potrero.	 Estructura pobre, baja retención de humedad	Suelo compacto o con costra Baja infiltración y retención de agua Menor actividad biológica	COMPOST Aporta materia orgánica, mejora estructura, vida del suelo y retención de humedad.
Mg, Ca, Zn o B (SECUNDARIOS Y MICRONUTRIENTES) Claves en funciones específicas del pasto.	 Síntomas variables según el elemento	Clorosis intervenal (Mg) Estrias, deformaciones (B, Zn) Puntas quemadas (Ca) Consultar análisis para confirmar	FORMULACIÓN A LA MEDIDA O SOPORTE TÉCNICO No aplicar de rutina. Confirmar con análisis y criterio técnico.



LOS NUTRIENTES SECUNDARIOS Y MICRONUTRIENTES NO SE APLICAN POR RUTINA.

Su uso debe basarse en análisis de suelo o tejido foliar, observación técnica y objetivos del potrero. Evita gastos innecesarios y riesgos de desequilibrio.



1. ANALIZAR
Suelo o tejido



2. INTERPRETAR
Con criterio técnico



3. ACTUAR
Solo lo que el potrero realmente necesita

🌿 BUENAS PRÁCTICAS PARA UN POTRERO EQUILIBRADO 🌿



Mantén cobertura permanente del suelo.



Ajusta la carga animal a la oferta.



Monitorea y registra: suelo, forraje y producción.



Devuelve materia orgánica al suelo.



Cuida el agua: infiltra, almacena y no contamina.



La nutrición es un sistema, no un solo nutriente.

wondergreen
NUTRIENTS



GREENATICS
— HOLDS HANDS WITH NATURE —

Lo que no se registra, no se puede ajustar.

[illegible]

Mejora la toma
de decisiones.



Permite comparar
potros.



Ayuda a identificar respuestas.



Corrige errores y
ajusta a tiempo.

- ✓ Registra cada entrada, salida y aplicación.
- ✓ Mide la altura en varios puntos del potrero.
- ✓ Anota la humedad del suelo (seca, media, húmeda).
- ✓ Sé constante y claro en las observaciones.

An aerial photograph of a farm with several fields. The fields are numbered 1 through 8 in green circles. White arrows indicate a sequence of visits starting from field 1, going to 2, then 5, then 5, then 4, then 8, and finally back to 1. A red barn is visible in field 1.

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1$$

DÍAS DE DESCANSO RECOMENDADOS: 30-35 DÍAS

[illegible]

🌱 El potrero que se mide, se entiende. El que se entiende, se mejora. 🌱



NUTRICIÓN GRADUAL:
liberación controlada
para reducir más rápido



USO AGRÍCOLA
Formulado para máxima
eficiencia en campo.



LÍNEA SÓLIDA Y LÍQUIDA
Soluciones verticales para cada necesidad del cultivo.



HECHO EN ANTIOQUIA
 Cielano lido para nuestros
 Señores y señoras de la

ERRORES COMUNES

Lo que más frena la respuesta del potrero.

1 APLICAR CON SUELO SECO

La falta de humedad limita la disolución y absorción de nutrientes.



CORRECCIÓN:

Aplique con humedad adecuada en el suelo.

2 APLICAR ANTES DE LLUVIAS FUERTES

El lavado superficial reduce la eficacia y genera pérdidas de producto.



CORRECCIÓN:

Revise el pronóstico y evite aplicar si se esperan lluvias fuertes.

3 NO RESPETAR EL PERIODO DE DESCANSO

Entrar los animales antes de tiempo limita la recuperación de la pradera.



CORRECCIÓN:

Respete los días de descanso para permitir la respuesta del pasto.

4 SOBREPASTOREO

Un pastoreo excesivo debilita la planta y reduce la capacidad de rebrote.



CORRECCIÓN:

Maneje la carga animal y mantenga altura adecuada del pasto.

5 DISTRIBUCIÓN DESUNIFORME

Una aplicación desigual genera áreas con exceso y otras con déficit de nutrientes.



CORRECCIÓN:

Asegure una distribución uniforme de los nutrientes.

6 IGNORAR LA COMPACTACIÓN

Un suelo compacto limita raíces, aireación e infiltración de agua y nutrientes.



CORRECCIÓN:

Implemente prácticas de aireación y manejo del suelo.

7 ALTA PRESIÓN DE MALEZAS

La competencia por luz, agua y nutrientes reduce la producción del pasto.



CORRECCIÓN:

Integre control oportuno de malezas y buenas prácticas de manejo.

8 MISMA DOSIS PARA TODOS LOS POTREROS

Cada potrero tiene necesidades distintas según suelo, pasto y objetivo.



CORRECCIÓN:

Ajuste la dosis según análisis de suelo y meta productiva.

9 NO LLEVAR REGISTROS

Sin datos no es posible evaluar ni mejorar el manejo del potrero.



CORRECCIÓN:

Registre fechas, aplicaciones, clima, pastoreo y resultados.

10 ENTRAR ANIMALES DEMASIADO PRONTO

El pasto aún no tiene reservas suficientes y la recuperación se retrasa.



CORRECCIÓN:

Esperar el tiempo recomendado antes de reingresar los animales.

RECUERDE

Un buen producto + una buena aplicación + buen manejo = resultados sostenibles.



Observe su potrero y actúe a tiempo.



Planifique, ejecute y haga seguimiento.



Suelo sano, pasto fuerte, ganado productivo.



Manejo responsable, resultados que perduran.



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2FRUIT



BIOINSUMOS

CIERRE TÉCNICO

Nutrición por ciclo para potreros más ordenados y productivos.



DIAGNOSTICA PRIMERO

Conoce el estado del potrero: suelo, forraje y manejo.



APLICA SEGÚN CONDICIÓN Y CICLO

Usa la nutrición adecuada en el momento correcto.



COMBINA BIEN

Integra compost, pellets organominerales, bioinsumos y buen manejo rotacional.



DALE DESCANSO

El descanso permite recuperación de raíz, cobertura y vida del suelo.



REGISTRA Y AJUSTA

Observa la respuesta del potrero y mejora cada ciclo.

NOTAS DEL POTRERO

- ✓ Diagnóstico
- ✓ Plan nutricional por ciclo
- ✓ Aplicación
- ✓ Descanso y rotación
- ✓ Observación y registro

RESUMEN DE LÍNEAS WONDERGREEN PARA PASTOS



COMPOST

Mejora la estructura del suelo y activa la vida microbiana.



2GROW

Impulsa el crecimiento vegetativo y la producción de forraje.



2BALANCE

Equilibra la nutrición y sostiene el pasto de forma estable.



2FRUIT

Favorece la calidad del forraje y la eficiencia productiva.



BIOINSUMOS

Revitalizan el suelo, fortalecen raíces y mejoran la resiliencia.



Si tienes dudas sobre especie, dosis, rotación o recuperación del potrero, **consulta al equipo Wondergreen.**