

Ecuaciones de congruencia

Taller de Álgebra I

November 9, 2022

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Dados números $a, b \in \mathbb{Z}$, existen enteros s, t tales que

$$sa + tb = (a : b).$$

Los valores de s, t se pueden obtener con la versión extendida del algoritmo de Euclides.

Ejemplos

- ▶ $(8 : 5) = 1$ y $2 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 1$
- ▶ $(9 : 15) = 3$ y $2 \cdot 9 - 1 \cdot 15 = 3$

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Dados números $a, b \in \mathbb{Z}$, existen enteros s, t tales que

$$sa + tb = (a : b).$$

Los valores de s, t se pueden obtener con la versión extendida del algoritmo de Euclides.

Ejemplos

- ▶ $(8 : 5) = 1$ y $2 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 1$
- ▶ $(9 : 15) = 3$ y $2 \cdot 9 - 1 \cdot 15 = 3$

Un ejemplo fácil

Para el caso de $(n : 0)$ es trivial.

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Dados números $a, b \in \mathbb{Z}$, existen enteros s, t tales que

$$sa + tb = (a : b).$$

Los valores de s, t se pueden obtener con la versión extendida del algoritmo de Euclides.

Ejemplos

- ▶ $(8 : 5) = 1$ y $2 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 1$
- ▶ $(9 : 15) = 3$ y $2 \cdot 9 - 1 \cdot 15 = 3$

Un ejemplo fácil

Para el caso de $(n : 0)$ es trivial.

$$(n : 0) = n = n * 1 + 0 * 0.$$

Es decir, $s = 1$ y $t = 0$

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Por algoritmo de división:

$$a = bq + r \quad (1)$$

Y por el algoritmo de Euclides clásico, sabemos que:

$$(a : b) = (b : r) = g \quad (2)$$

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Por algoritmo de división:

$$a = bq + r \quad (1)$$

Y por el algoritmo de Euclides clásico, sabemos que:

$$(a : b) = (b : r) = g \quad (2)$$

Si asumimos que tenemos s', t' tales que:

$$s'b + t'r = g \quad (3)$$

¿Cómo obtenemos $sa + tb = g$?

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Por algoritmo de división:

$$a = bq + r \quad (1)$$

Y por el algoritmo de Euclides clásico, sabemos que:

$$(a : b) = (b : r) = g \quad (2)$$

Si asumimos que tenemos s', t' tales que:

$$s'b + t'r = g \quad (3)$$

¿Cómo obtenemos $sa + tb = g$?

Multiplicamos (1) por t' :

$$t'a = t'bq + t'r$$

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Por algoritmo de división:

$$a = bq + r \quad (1)$$

Y por el algoritmo de Euclides clásico, sabemos que:

$$(a : b) = (b : r) = g \quad (2)$$

Si asumimos que tenemos s', t' tales que:

$$s'b + t'r = g \quad (3)$$

¿Cómo obtenemos $sa + tb = g$?

Multiplicamos (1) por t' :

$$t'a = t'bq + t'r$$

Reemplazamos la expresión de $t'r$ según (3):

$$t'a = t'bq + (g - s'b)$$

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Por algoritmo de división:

$$a = bq + r \quad (1)$$

Y por el algoritmo de Euclides clásico, sabemos que:

$$(a : b) = (b : r) = g \quad (2)$$

Si asumimos que tenemos s', t' tales que:

$$s'b + t'r = g \quad (3)$$

¿Cómo obtenemos $sa + tb = g$?

Multiplicamos (1) por t' :

$$t'a = t'bq + t'r$$

Reemplazamos la expresión de $t'r$ según (3):

$$t'a = t'bq + (g - s'b)$$

Despejamos g

$$t'a - t'bq + s'b = g$$

Repaso: Algoritmo de Euclides extendido

Por algoritmo de división:

$$a = bq + r \quad (1)$$

Y por el algoritmo de Euclides clásico, sabemos que:

$$(a : b) = (b : r) = g \quad (2)$$

Si asumimos que tenemos s', t' tales que:

$$s'b + t'r = g \quad (3)$$

¿Cómo obtenemos $sa + tb = g$?

Multiplicamos (1) por t' :

$$t'a = t'bq + t'r$$

Reemplazamos la expresión de $t'r$ según (3):

$$t'a = t'bq + (g - s'b)$$

Despejamos g

$$t'a - t'bq + s'b = g$$

Sacamos factor común

$$t'a + (s' - t'q)b = g$$

Es decir, $s = t'$ y $t = (s' - t'q)$.

Código: Algoritmo de Euclides extendido

```
emcd :: Integer -> Integer -> (Integer, Integer, Integer)
emcd a 0 = (a, 1, 0)
emcd a b = (g, s, t)
    where (g, s', t') = emcd b (mod a b)
          s = t'
          t = s' - t' * q
          q = div a b
```

Ecuaciones de congruencia

Usando el algoritmo extendido de Euclides podemos resolver ecuaciones de congruencia

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Ecuaciones de congruencia

Usando el algoritmo extendido de Euclides podemos resolver ecuaciones de congruencia

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Recordar que esa ecuación es equivalente a la ecuación *diofántica*

$$ax + mk = b$$

Ecuaciones de congruencia

Usando el algoritmo extendido de Euclides podemos resolver ecuaciones de congruencia

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Recordar que esa ecuación es equivalente a la ecuación *diofántica*

$$ax + mk = b$$

Ecuaciones diofánticas

Utilizando la función `emcd` encontrar alguna solución de las siguientes ecuaciones:

1 $29x + 17y = 1$

2 $93x + 27y = 3$

3 $89x + 23y = 3$

4 $93x + 27 = 9$

Ecuaciones de congruencia

Usando el algoritmo extendido de Euclides podemos resolver ecuaciones de congruencia

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Recordar que esa ecuación es equivalente a la ecuación *diofántica*

$$ax + mk = b$$

¿Cuándo tiene solución la ecuación?

Ecuaciones de congruencia

Usando el algoritmo extendido de Euclides podemos resolver ecuaciones de congruencia

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Recordar que esa ecuación es equivalente a la ecuación *diofántica*

$$ax + mk = b$$

¿Cuándo tiene solución la ecuación?

Tiene solución si y solo si $(a : m)$ divide a b .

Ecuaciones de congruencia

Usando el algoritmo extendido de Euclides podemos resolver ecuaciones de congruencia

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Recordar que esa ecuación es equivalente a la ecuación *diofántica*

$$ax + mk = b$$

¿Cuándo tiene solución la ecuación?

Tiene solución si y solo si $(a : m)$ divide a b .

Ejercicios

- 1 Programar la función
`tieneSolucion :: Integer -> Integer -> Integer -> Bool`
que dados a , b y m determine si la ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene solución.
- 2 Programar la función
`solucionParticular :: Integer -> Integer -> Integer -> Integer`
que dados a , b y m determine, si existe, un entero x tal que $ax \equiv b \pmod{m}$. (La función puede quedar indefinida si la ecuación no tiene solución.)
Sugerencia: encontrar primero una solución de $ax \equiv (a : m) \pmod{m}$

Solución general de una ecuación de congruencia

La solución de la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

es una clase de congruencia.

Por ejemplo, la solución de $3x \equiv 2 \pmod{5}$ es $x \equiv 4 \pmod{5}$.

Recordamos cómo resolver una ecuación de congruencia.

Ejemplo: $35x \equiv 15 \pmod{20}$

Solución general de una ecuación de congruencia

La solución de la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

es una clase de congruencia.

Por ejemplo, la solución de $3x \equiv 2 \pmod{5}$ es $x \equiv 4 \pmod{5}$.

Recordamos cómo resolver una ecuación de congruencia.

Ejemplo: $35x \equiv 15 \pmod{20}$

1 Calculamos $(35 : 20) = 5$ y dividimos la ecuación por 5:

$$7x \equiv 3 \pmod{4}$$

(si el mcd no divide a b , la ecuación no tiene solución)

Solución general de una ecuación de congruencia

La solución de la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

es una clase de congruencia.

Por ejemplo, la solución de $3x \equiv 2 \pmod{5}$ es $x \equiv 4 \pmod{5}$.

Recordamos cómo resolver una ecuación de congruencia.

Ejemplo: $35x \equiv 15 \pmod{20}$

- 1 Calculamos $(35 : 20) = 5$ y dividimos la ecuación por 5:

$$7x \equiv 3 \pmod{4}$$

(si el mcd no divide a b , la ecuación no tiene solución)

- 2 Pasamos a ecuación diofántica $7x + 4y = 3$.

Solución general de una ecuación de congruencia

La solución de la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

es una clase de congruencia.

Por ejemplo, la solución de $3x \equiv 2 \pmod{5}$ es $x \equiv 4 \pmod{5}$.

Recordamos cómo resolver una ecuación de congruencia.

Ejemplo: $35x \equiv 15 \pmod{20}$

- 1 Calculamos $(35 : 20) = 5$ y dividimos la ecuación por 5:

$$7x \equiv 3 \pmod{4}$$

(si el mcd no divide a b , la ecuación no tiene solución)

- 2 Pasamos a ecuación diofántica $7x + 4y = 3$.
- 3 Buscamos una solución particular de $7x + 4y = 1$, por ejemplo $7 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = 1$.

Solución general de una ecuación de congruencia

La solución de la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

es una clase de congruencia.

Por ejemplo, la solución de $3x \equiv 2 \pmod{5}$ es $x \equiv 4 \pmod{5}$.

Recordamos cómo resolver una ecuación de congruencia.

Ejemplo: $35x \equiv 15 \pmod{20}$

- 1 Calculamos $(35 : 20) = 5$ y dividimos la ecuación por 5:

$$7x \equiv 3 \pmod{4}$$

(si el mcd no divide a b , la ecuación no tiene solución)

- 2 Pasamos a ecuación diofántica $7x + 4y = 3$.
- 3 Buscamos una solución particular de $7x + 4y = 1$, por ejemplo $7 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = 1$.
- 4 Multiplicamos por 3: $7 \cdot (-3) + 4 \cdot 6 = 3$

Solución general de una ecuación de congruencia

La solución de la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

es una clase de congruencia.

Por ejemplo, la solución de $3x \equiv 2 \pmod{5}$ es $x \equiv 4 \pmod{5}$.

Recordamos cómo resolver una ecuación de congruencia.

Ejemplo: $35x \equiv 15 \pmod{20}$

- 1 Calculamos $(35 : 20) = 5$ y dividimos la ecuación por 5:

$$7x \equiv 3 \pmod{4}$$

(si el mcd no divide a b , la ecuación no tiene solución)

- 2 Pasamos a ecuación diofántica $7x + 4y = 3$.
- 3 Buscamos una solución particular de $7x + 4y = 1$, por ejemplo $7 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = 1$.
- 4 Multiplicamos por 3: $7 \cdot (-3) + 4 \cdot 6 = 3$
- 5 La solución general es $x \equiv (-3) \pmod{4}$.

Solución general de una ecuación de congruencia

Vamos a representar las clases de congruencia por pares ordenados de enteros. El par (b, m) (con $m > 0$) representa todos los $x \in \mathbb{Z}$ con $x \equiv b \pmod{m}$.

Ejercicios

- 1 Programar la función
`solucionGeneral :: Integer -> Integer -> Integer -> (Integer, Integer)`
que dados a , b y m determine la clase de congruencia solución de la ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$.

Ejemplos

- ▶ `solucionGeneral 3 2 5` \rightsquigarrow $(4, 5)$
 - ▶ `solucionGeneral 35 15 20` \rightsquigarrow $(-3, 4)$
- Observación: $(-3, 4) = (1, 4)$