



Matemáticas para las Ciencias II

Semestre 2020-2

Prof. Pedro Porras Flores
Ayud. Irving Hernández Rosas
Proyecto III

Kevin Ariel Merino Peña¹



Realice los siguientes ejercicios, escribiendo el procedimiento claramente. Y recuerden que estos proyectos se entregan de manera individual en la plataforma de google classroom.

1. Muestre que los siguientes conjuntos del plano son abiertos:

Definición 1. Sea $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y sea $r \in \mathbb{R}^+$, la **bola** de radio r y centro en \vec{x}_0 es definida por el conjunto de todos los puntos \vec{x} tal que $\|\vec{x} - \vec{x}_0\| < r$.

Este conjunto es denotado como $Br(\vec{x}_0)$ es el conjunto de los puntos $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ cuya distancia de \vec{x}_0 es menor que r

Definición 2. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$. Decimos que U es **conjunto abierto** si para cada \vec{x}_0 , existe algún $r > 0$ tal que $Br(\vec{x}_0)$ está totalmente contenida en U , $Br(\vec{x}_0) \subset U$

a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$

b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y\}$

c) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 < x^2 + y^2 < 4\}$

2. Calcule los siguientes. límites si existen:

Definición 3. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{x}_0 \in A$, un punto de acumulación de A . Entonces se dice que el límite de $f(\vec{x})$, cuando \vec{x} tiende a \vec{x}_0 , es $\vec{l} \in \mathbb{R}^m$ y se denota

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = \vec{l} \quad \text{o} \quad f(\vec{x}) \rightarrow \vec{l}$$

Si $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que $\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0$

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(xy) - 1}{x^2 y^2}$

Resultará conveniente recordar de nuestro curso de Matemáticas para las ciencias aplicadas I que

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\cos(\alpha) - 1}{\alpha^2} = -\frac{1}{2}$$

. Entonces tomemos el siguiente cambio de variable $\alpha = xy$ y por el recordatorio anterior, tenemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(xy) - 1}{x^2 y^2} = -\frac{1}{2}$$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy}$

Para este segundo ejercicio, tomemos un cambio de variable $y = \sqrt{r}$ y $x = \sqrt{r}$ entonces $xy = r$ por lo que

b) $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sin(r)}{r}$

Y de nuestro curso de Matemáticas para las ciencias aplicadas I tenemos que $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} = 1$, por lo tanto

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy} = 1$$

¹317031326

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} (x^2, e^x)$$

Tenemos un teorema enunciado en clase sobre las propiedades de los límites, una de ellas dice:

Definición 4. Si $f(\vec{x}) = (f_1(\vec{x}), \dots, f_m(\vec{x}))$ donde $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$, $i \in \{1, \dots, m\}$ son las componentes de la función de f , entonces

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = (l_1, l_2, \dots, l_m)$$

si y sólo si

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f_i(\vec{x}) = l_i$$

para cada $i \in \{1, 2, \dots, m\}$

entonces si

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2, e^x) &= \left(\lim_{x \rightarrow 1} x^2, \lim_{x \rightarrow 1} e^x \right) \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2, e^x) &= ((1)^2, e^1) \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2, e^x) &= (1, e) \end{aligned}$$

3. Usando la formulación ϵ - δ muestre:

$$a) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 2} (3x, x^2) = (6, 4)$$

$$4. \text{ Sea } f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{|x|^3 + y^2} & : \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & : \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Muestre que f es continua en $(0, 0)$ Para averiguar quién es el límite, tomémonos traectorias distintas. Deifinimos $y = g(x) = 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, g(x))$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, 0)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{|x|^3 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(0)}{|x|^3 + (0)^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

Por otra parte, definamos $y = g(x) = x$ por lo que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, g(x))$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, x)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{|x|^3 + x^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 \left(\frac{|x|^3}{x^2} + 1 \right)}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{|x|^3}{x^2} + 1}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x}{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{|x|^3}{x^2} + 1 \right)}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3|x|^2|x'|}{2x} + 1}$$

Aplicando ley de L'Hôpital

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x}{\frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^2}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} |x'| + 1}$$

Por la regla del producto

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x}{\frac{3}{2} \cdot 0\{-1, 1\} + 1}$$

Por definición de la derivada del valor absoluto

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x}{1}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

Sea $\epsilon > 0$, consideremos $\|f(x, y) - l\|$, donde $f(x, y) = \frac{x^2 y}{|x|^3 + y^2}$ y $l = 0$, entonces

$$\left\| \frac{x^2 y}{|x|^3 + y^2} - 0 \right\| = \left| \frac{x^2 y}{|x|^3 + y^2} \right| \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2} \right|$$

luego, veamos que $\left| \frac{x^2 y}{x^3 + y^2} \right| = |y| = \sqrt{y^2}$ y como $0 \leq y^2 \leq y^2 + x^2$ tenemos que

$$\left| \frac{x^2 y}{x^3 + y^2} \right| \leq |y| = \sqrt{y^2}$$

$$\left| \frac{x^2 y}{x^3 + y^2} \right| \leq \sqrt{y^2}$$

$$\left| \frac{x^2 y}{x^3 + y^2} \right| \leq \sqrt{y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\left| \frac{x^2 y}{x^3 + y^2} \right| \leq \sqrt{y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

Puesto que $\sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\|$

$$\left| \frac{x^2 y}{x^3 + y^2} \right| \leq \sqrt{y^2} \leq \|(x, y)\| < \epsilon$$

Por hipótesis

$$\left| \frac{x^2 y}{x^3 + y^2} \right| \leq \|(x, y)\| < \epsilon$$

Por lo tanto, basta tomar $\delta = \epsilon$