

วัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์ (ภาษาอังกฤษ: “yeast metabolic cycle” หรือด้วย YMC) เป็นวัฏจักรทางชีวภาพในยีสต์ที่ขามปัง (*Saccharomyces cerevisiae*) ในวัฏจักรนี้ ความเข้มข้นกับสถานะรีดอกซ์ของเมตาบอลิต์และระดับกรดไขมันนิวคลีอิกภายในเซลล์มีจังหวะขึ้นลง มีการแบ่งช่วงเวลาในการสังเคราะห์สารในเซลล์ และการใช้ออกซิเจนมีจังหวะขึ้นลงที่สังเกตได้จากอุปกรณ์เคมีสมรรถ (chemostat)

โดยส่วนมาก การศึกษาวัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์ใช้เครื่องมือเป็นเครื่องมือ จึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่าวัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์หรือถูกสร้างอย่างเป็นอิสระในแต่ละเซลล์ วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งแสดงคุณลักษณะของวัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์ในเซลล์เดี่ยวและมุ่งศึกษาผลตอบแทนของวัฏจักรนี้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารและสารพันธุกรรม โดยจำเพาะ ข้าพเจ้าใช้เครื่องมือไมโครฟลูอิดิกส์ (microfluidics) เพื่อดักและแยกเซลล์ยีสต์ และวัดความเรืองแสงของฟลาวิน (flavin) ตามกาลเวลา เป็นการเฝ้าสังเกตวัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์

ไมโครฟลูอิดิกส์เซลล์เดี่ยวสร้างข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอนุกรมเวลาที่สร้างโดยการทดลองเชิงชีววิทยามีลักษณะสั้นและมีสัญญาณรบกวน เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์จึงถูกจำกัด ดังนั้นข้าพเจ้าพัฒนาวิธีการของอนุกรมเวลา พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อแยกแยะอนุกรมเวลาที่มีจังหวะซ้ำ และพัฒนาวิธีสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมเพื่อประมาณความถี่ของจังหวะในข้อมูลอนุกรมเวลา

ผลการทดลองของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นว่าเซลล์ยีสต์แสดงความเรืองแสงของฟลาวินเป็นจังหวะ คู่ขนานกับวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ โดยในสภาพกลูโคสสูงประชากรเซลล์สร้างจังหวะนี้อย่างไม่พร้อมกัน ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นว่าเซลล์สามารถตั้งเฟสของวัฏจักรเมตาบอลิซึมใหม่เมื่อสารอาหารเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน และอย่างเป็นอิสระจากวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ นอกจากนี้ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นว่าพันธุ์เซลล์ที่เกิดจากการดัดยีนมีจังหวะการเรืองแสงของฟลาวินที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากจังหวะของความเข้มข้นของออกซิเจนในเคมีสมรรถ ข้าพเจ้าใช้ flux balance analysis เพื่อตอบคำถามว่าข้อจำกัดในโปรตีโอมนำไปสู่ความได้เปรียบของการแยกเวลาการสังเคราะห์สารในเซลล์หรือไม่ และตอบคำถามว่าการแยกเวลาการสังเคราะห์สารนี้สามารถอธิบายระยะเวลาของวัฏจักรเมตาบอลิซึมได้หรือไม่ ผลการศึกษาของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดในโปรตีโอมนำไปสู่การแยกเวลาการสังเคราะห์สารในเซลล์เนื่องจากการแยกเวลานี้นั้นระยะเวลาการสังเคราะห์สารในเซลล์โดยรวม แต่ทว่าความได้เปรียบนี้ลดต่ำลงหากแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนมีปริมาณต่ำ

กล่าวโดยสรุป วิทยานิพนธ์นี้ยืนยันว่าจังหวะการเรืองแสงของฟลาวินถูกสร้างโดยอิสระในเซลล์ และเสนอว่าวัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์ตอบสนองต่อสภาพสารอาหารแล้วกำหนดเวลาการแบ่งตัวของเซลล์ วิทยานิพนธ์นี้เน้นว่ากลุ่มเซลล์ย่อยในการเพาะเลี้ยงเซลล์อาจอธิบายผลการสังเกตวัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์ในเคมีสมรรถ นอกจากนี้วิทยานิพนธ์นี้ปูทางสำหรับการใช้วิธีทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลอนุกรมเวลาขนาดใหญ่ ซึ่งมีประโยชน์กับสาขาวิชาอื่นนอกจากวัฏจักรเมตาบอลิซึมในยีสต์