



LA VENTANA DE TOLERANCIA

Para entender qué nos pasa
cuando nos desbordamos o apagamos.

Una guía para entenderte, no para corregirte.

@silozpsicologia
silozpsicologia.com

Para entender la ventana de tolerancia,
a veces ayuda imaginar un ascensor.
Ese ascensor representa cómo de activado o desactivado
está tu sistema nervioso.




@silozpsicologia
silozpsicologia.com

PISO I

HIPERACTIVACIÓN.

Aquí el cuerpo interpreta que **hay un peligro o una urgencia.**

Puede aparecer: ansiedad, rabia, tensión, pensamiento.



Aquí, el sistema nervioso puede:

- sentir emociones
- pensar con cierta claridad
- estar en contacto contigo
- relacionarte con otros


Dentro de la ventana puede haber malestar, pero es soportable.

Noto que: puedo sentir, puedo parar un momento, puedo pedir ayuda si la necesito y puedo decidir sin urgencia.

No es una calma total.

Es suficiente seguridad interna.

PISO 0




PISO -I

HIPOACTIVACIÓN.

Aquí el cuerpo interpreta que **no puede más.**

Puede aparecer: gran cansancio, bloqueo, apatía, desconexión, sensación de vacío...

No es pasividad, no es pereza, es **protección.**



@silozpsicologia
silozpsicologia.com

Este ascensor no tiene solo tres pisos.

Tiene muchos más.

Puedes estar en el 1,
pero también en el 2, 3, 4, 5...

Y lo mismo hacia abajo:
en el -2, -3, -4, -5....

Esto explica po qué no todo malestar es igual,
aunque se llame igual.

No se tarda lo mismo en bajar:
del piso 1 al 0, que del piso 8 al 0.


Y eso no es resistencia,
no es falta de voluntad,
ni es hacerlo mal.

Es simplemente que el cuerpo está mucho más lejos del
equilibrio.

Lo mismo ocurre en hipoactivación: no es lo mismo volver al 0
desde el -1, que desde el piso -8.

Cuando estás en pisos altos o bajos, el cuerpo necesita más
repetición, más tiempo, más seguridad y menos exigencia.

Pretender volver rápido al piso 0 solo añade más presión a un
sistema nervioso que ya está sobrepasado.



Salir de la ventana **no es un fallo.**

La hiperactivación,
la hipoactivación,
son respuestas automáticas del sistema nervioso.

No se eligen, no se controlan, se **activan.**



A veces entiendes:

- Qué te pasa
- De dónde viene
- Por qué reaccionas así

Y aun así, el cuerpo no se calma.

Porque el cuerpo, no siempre se regula con explicaciones, sino con **sensación de seguridad.**

La ventana no es fija.

Puede estrecharse o ampliarse
según: el cansancio, el estrés, los
vínculos, el contexto, cómo te
sientes acompañado...

Que un día puedas
y otro no,
no dice nada malo de ti.



No siempre necesitas
cambiar lo que sientes.


A veces, lo que necesitas
es **no quedarte solo**
con eso que sientes.

Entender la ventana
no te arregla.
Pero **puede ayudarte a tratarte**
con menos dureza.

No todas las zonas de la ventana necesitan lo mismo.

Lo que ayuda cuando estás dentro del piso 0, puede no ayudar cuando estás muy activado o muy apagado.

Y CUIDARTE, NO ES FORZARTE A VOLVER AL PISO 0. ES RESPONDER DISTINTO SEGÚN DONDE ESTÉS.



CUANDO ESTÁS DENTRO DE LA VENTANA (PISO 0).

Aquí, el cuerpo tiene cierta capacidad de sostén.

En este estado suele ayudar:

- Pensar con calma.
- Reflexionar sobre lo que te pasa.
- Hablar de ello.
- Tomar decisiones.
- Probar cambios pequeños.
- Agradecer 3 cosas, apuntar cosas que te gusten de ti.
- Llevar un diario.
- Ordenar el espacio / casa / habitación.
- Leer, hacer un puzzle... - actividades agradables.

No porque “debas hacerlo”.

Sino porque el cuerpo lo permite.

CUANDO ESTÁS EN HIPERACTIVACIÓN

(Pisos hacia arriba del ascensor)

Aquí el cuerpo está en **alerta**.

No busques entender, busca **seguridad**.

En este estado, cuidarte puede ser:

- Bajar los estímulos de la sala (volumen, luz tenue...)
- No exigirte claridad, no forzar a calmarte, no discutir contigo.
- No tomar decisiones importantes.
- Utilizar una manta pesada, o un edredón para cubrirte.
- Abrazo de mariposa (apretar los hombros y sostenernos).
- Beber lentamente con pajita,
- Sacudir el exceso de energía con movimientos, apretando un cojín por ejemplo, o caminando ligero.
- Garabatear en papel.
- Tensar y relajar la musculatura del cuerpo.
- Describir un objeto intentando utilizar todos los sentidos.
- Escuchar música.
- Utilizar agua tibia en la piel.

Cuidarte es no añadir más presión y tensión, a un sistema que ya va demasiado rápido.

CUANDO ESTÁS EN HIPOACTIVACIÓN.

(Pisos hacia abajo en el ascensor).

Aquí el **cuerpo está en retirada.**

No puede empujar.

En este estado, cuidarte puede ser:

- Reducir demandas.
- Permitir el descanso.
- No exigirte motivación.
- No forzarte a sentir.
- No interpretarlo como un fallo.

A veces **cuidarte es no empujarte cuando no hay energía.**

Y como actividades concretas que llevar a cabo...

- Estimular los sentidos (olor de una vela, aceites esenciales...)
- Rodar un objeto entre las manos.
- Sentir la planta de los pies en el suelo.
- Usar agua fría en la piel.