3. a) N = 26

Himpunan A = {26, 28, 30, 33, 36, 39, 41}

B = {29, 31, 33, 36, 38, 44}

C = {27, 33, 36, 37, 43, 46}

U = {26, 27, ..., 46}

1. $A \cup B \cup C$

= {26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46}

$|A \cup B \cup C| = 15$

2. $A \cap B \cap C$

= {33, 36}

= 2

3. $(A \cup B) \cap C'$ = $C' = U - C$

= {26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45}

$(A \cup B)$ = {26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 44}

$|\text{Iris}|$ = {26, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 44} = 9

deli得力

Dipindai dengan CamScanner

Date. /

4. $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

$A \cap B = \{33, 36\}$

$= \{26, 26, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 44\}$

$= 9$

3c. komposisi fungsi

$f(x) = 9x + 6$

$g(x) = \frac{x^2}{7} + 2$

$(f \cdot g)(x) = 9\left(\frac{x^2}{7} + 2\right) + 6 = \frac{9x^2}{7} + 26$

$(g \cdot f)(x) = \frac{(9x+6)^2}{7} + 2 = \frac{81x^2 + 144x + 64}{7} + 2$

tdk komutatif

Ambil : $x = 6 + 2 = 8$

$f(g(x)) \neq g(f(6))$

3d. Invers f

$y = 9x + 6$

$x = \frac{y-6}{9}$

f^{-1}

Dipindai dengan CamScanner

Date. /

3d. invers f

$y = 9x + 8$ $\quad f^{-1}(x) = \frac{x-8}{9}$

$x = \frac{y-8}{9}$

kasus $y = 9 \cdot 100 + 8 = 908$

$x = 100$

3e klasifikasi fungsi

$f(x) = 9x + 8$

$g(x) = x^2 / 7 + 2$

Dipindai dengan CamScanner