

บบเบน

ตัวอย่าง:กรณีพบคู่ยา DI ที่มีการใช้ร่วมกันวันเดียวกัน

● ตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction)



HN: 79652

Copy

ชื่อ-สกุล: นาง อุไรวรรณ ตัวอย่าง

จุดบริการ: ห้องยาชั้น 2

พบปัญหา: 1 คู่ (ใบสั่งปัจจุบัน)

#1 คู่ยาที่พบปัญหา

SEVERITY: MAJOR (เพิ่มฤทธิ์)

บันทึก PE

ยาตัวที่ 1 (ใบสั่งปัจจุบัน)

Req #6908212590

APIXABAN 5 MG

แพทย์ผู้สั่ง: นพ.สมชาย ใจดี
แผนก/ห้องตรวจ: อายุรกรรมโรคหัวใจ (W8)

วิธีใช้: รับประทานครั้งละ 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น
จำนวนสั่งวันนี้: 125 TAB

ยาตัวที่ 2 (ใบสั่งปัจจุบัน)

Req #6908212590

ASPENT-M 81 MG [ร]*G*]

แพทย์ผู้สั่ง: นพ.สมชาย ใจดี
แผนก/ห้องตรวจ: อายุรกรรมโรคหัวใจ (W8)

วิธีใช้: รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า
จำนวนสั่งวันนี้: 60 TAB



รายละเอียดผลกระทบทางคลินิก (Note):

ควรระวังการใช้ร่วมกันเนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ (Increased risk of bleeding)

● ตรวจพบอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction)



HN: 79652

Copy

ชื่อ-สกุล: นาง อุไรวรรณ ตัวอย่าง

จุดบริการ: ห้องยาชั้น 2

พบปัญหา: 1 คู่ (ตรวจพบจากประวัติย้อนหลัง)

#1 คู่ยาที่พบปัญหา

SEVERITY: MAJOR (เพิ่มฤทธิ์)

บันทึก PE

ยาตัวที่ 1 (ใบสั่งปัจจุบัน)

Req #6908212590

APIXABAN 5 MG

แพทย์ผู้สั่ง: นพ.สมชาย ใจดี

แผนก/ห้องตรวจ: อายุรกรรมโรคหัวใจ (W8)

วิธีใช้: รับประทานครั้งละ 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น
จำนวนสั่งวันนี้: 125 TAB

ยาตัวที่ 2 (ประวัติยาเดิม ย้อนหลัง 3 เดือน)

ยายังเหลืออีก 21 วัน

ASPENT-M 81 MG [ร]*[G]*

แพทย์ผู้สั่งเดิม: นพ.วิชัย เชี่ยวชาญ

แผนกเดิม: ระบบประสาทและสมอง (OPD)

วิธีใช้เดิม: รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า
จำนวนเดิมที่รับไป: 70 TAB (จ่ายเมื่อ: 12/06/2026)

รายละเอียดผลกระทบทางคลินิก (Note):
ควรระวังการใช้ร่วมกันเนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ (Increased risk of bleeding)

ปิด (Close)

Confirm (แพทย์ยืนยัน)