

GEOMETRIA 1

Alessandro Piazza *

23 febbraio 2018

Sommario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Indice

1	Spazi Vettoriali	2
2	Matrici	4
3	Applicazioni lineari	5
4	Applicazioni lineari e matrici	6
5	Formula di Grassmann e somma diretta	8
6	Sistemi lineari	9
7	Prodotti scalari	10
8	Determinante	14
9	Diagonalizzazione, autovettori e autovalori	16

*alessandro.piazza@sns.it

1 Spazi Vettoriali

Definizione 1.1 (campo) Un campo \mathbb{K} è un insieme su cui sono definite due operazioni di *somma* e $+$ e *prodotto* \cdot che associano a due elementi dell'insieme un altro elemento dell'insieme

1. $\forall x, y \in \mathbb{K} \Rightarrow x + y \in \mathbb{K}$
2. $\forall x, y \in \mathbb{K} \Rightarrow x \cdot y \in \mathbb{K}$

e che rispettano le seguenti proprietà

- (i) *associativa*
- (ii) *commutativa*
- (iii) *esistenza degli elementi neutri*
- (iv) *opposto*
- (v) *inverso*
- (vi) *distributiva del prodotto rispetto alla somma*

Definizione 1.2 (spazio vettoriale) Uno spazio vettoriale su un campo \mathbb{K} è un insieme V su cui sono definite due operazioni di

1. *somma* tra elementi di V : $\forall v, w \in V \Rightarrow v + w \in V$
2. *prodotto per scalare*: $\forall v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda v \in V$

che devono rispettare le seguenti proprietà:

- (i) *associativa della somma*
- (ii) *commutativa della somma*
- (iii) *esistenza dell'elemento neutro della somma*
- (iv) *opposto della somma*
- (v) *distributiva del prodotto rispetto alla somma*
- (vi) *associativa del prodotto*
- (vii) *elemento neutro del prodotto*

Chiameremo *vettori* gli elementi di V .

Proprietà 1.1 Uno spazio vettoriale gode delle seguenti proprietà:

1. Unicità dell'elemento neutro
2. Unicità dell'opposto
3. $0 \cdot v = O_V$
4. $(-1) \cdot v = -v$

Definizione 1.3 (sottospazio vettoriale) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} . Diciamo che $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale di V se valgono le seguenti proprietà

- (i) $\forall v, w \in W \Rightarrow v + w \in W$
- (ii) $\forall v \in W, \forall \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda v \in W$
- (iii) $O_V \in W$

Teorema 1.1 (intersezione di sottospazi) Intersezione di sottospazi è un sottospazio vettoriale

Teorema 1.2 (somma di sottospazi) Somma di sottospazi è un sottospazio vettoriale

Definizione 1.4 (combinazione lineare) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} , siano $v_1, \dots, v_n \in V$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Si dice combinazione lineare dei v_i un vettore $v \in V$ tale che

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

Definizione 1.5 (span)

$$\text{Span}\{v_1, \dots, v_n\} = \left\{ v \in V : \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \right\}$$

Teorema 1.3 (proprietà dello span) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} e siano $v_1, \dots, v_n \in V$. Allora $\text{Span}\{v_1, \dots, v_n\}$ è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene tutti i v_i .

Definizione 1.6 (dipendenza e indipendenza lineare) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} e siano $v_1, \dots, v_n \in V$. Si dice che v_1, \dots, v_n sono linearmente dipendenti se $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ non tutti nulli tali che

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = O_V.$$

Analogamente si dice che v_1, \dots, v_n sono linearmente indipendenti se

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = O_V \Leftrightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Definizione 1.7 (base) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} . Un insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$ si dice base di V se

- (i) v_1, \dots, v_n sono linearmente indipendenti
- (ii) $\text{Span}\{v_1, \dots, v_n\} = V$

Teorema 1.4 (unicità della combinazione lineare) contenuto...

Definizione 1.8 (sottoinsieme massimale) se aggiungo un vettore l'insieme non è più linearmente indipendente

Teorema 1.5 linearmente indipendente + massimale = base

Teorema 1.6 Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} e sia $\{v_1, \dots, v_m\}$ una base di V . Se w_1, \dots, w_n , con $n > m$, sono vettori di V , allora w_1, \dots, w_n sono linearmente dipendenti.

Corollario 1.7 Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} . Supponiamo di avere due basi di V , una con n elementi e una con m elementi. Allora $n = m$.

Definizione 1.9 (dimensione) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} avente una base costituita da n vettori. Allora diremo che V ha dimensione n e scriveremo $\dim V = n$.

Teorema 1.8 sono n + generano = base

Teorema 1.9 sono n + set massimale = base

Teorema 1.10 sono n + linearmente indipendenti = base

Teorema 1.11 (completamento ad una base) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} di dimensione $n \geq 2$. Sia r un intero positivo con $0 < r < n$. Dati r vettori $v_1, \dots, v_r \in V$ linearmente indipendenti è possibile completarli ad una base di V , ossia trovare vettori v_{r+1}, \dots, v_n tali che $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ è base di V .

2 Matrici

Definizione 2.1 (matrice) Una matrice $m \times n$ a coefficienti in \mathbb{K} è una tabella ordinata di m righe e n colonne i cui elementi appartengono ad un campo \mathbb{K} . Dati $a_{ij} \in \mathbb{K}$ con $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$ diremo che $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K})$ e scriveremo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Definizione 2.2 (matrice diagonale e identità) contenuto...

Definizione 2.3 (prodotto tra matrici) contenuto...

Proprietà 2.1 proprietà del prodotto ($n \times n$ stabile rispetto al prodotto)

Definizione 2.4 (matrice trasposta) contenuto...

Proprietà 2.2 (della trasposta) contenuto...

Definizione 2.5 (matrici coniugate) Due matrici A e B si dicono coniugate se esiste una matrice P invertibile tale che

$$B = P^{-1}AP.$$

Matrici coniugate rappresentano la stessa applicazioni lineari viste in due basi diverse.

Definizione 2.6 (traccia) Sia M una matrice quadrata $n \times n$. La traccia di M è la somma degli elementi sulla diagonale

$$\text{tr}(M) = \text{tr} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} + \cdots + a_{nn}$$

Proprietà 2.3 (della traccia) La traccia gode delle seguenti proprietà

(i) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$ e $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$

(ii) $\text{tr}({}^t A) = \text{tr}(A)$

(iii) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

Teorema 2.1 (invarianza della traccia per coniugio) Se A e B sono matrici coniugate, allora $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$

Roba su riduzione a scalini...

3 Applicazioni lineari

Definizione 3.1 (applicazione lineare) Siano V e W due spazi vettoriali su un campo \mathbb{K} . Diremo che una funzione $L: V \rightarrow W$ è un'applicazione lineare (o mappa lineare) se L soddisfa le seguenti proprietà

- (i) $\forall v_1, v_2 \in V$ vale $L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2)$
- (ii) $\forall v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ vale $L(\lambda v) = \lambda L(v)$

Diretta conseguenza è la seguente proprietà chiave delle applicazioni lineari

- (iii) $L(O_V) = O_W$

Definizione 3.2 (nucleo) Siano V e W due spazi vettoriali su un campo \mathbb{K} e sia $L: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Definiamo nucleo o kernel di L , e scriveremo $\text{Ker } L$, l'insieme degli elementi di V la cui immagine attraverso L è lo zero di W . Formalmente

$$\text{Ker } L = \{v \in V : L(v) = O_W\}$$

Teorema 3.1 Sia $L: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Allora $\text{Ker } L$ è un sottospazio vettoriale di V .

Teorema 3.2 Sia $L: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Allora $\text{Im } L$ è un sottospazio vettoriale di W .

Teorema 3.3 Un'applicazione lineare $L: V \rightarrow W$ è iniettiva se e solo se $\text{Ker } L = \{O_V\}$.

Teorema 3.4 (composizione di applicazioni lineari) la composizione di due applicazioni lineari è ancora un'applicazione lineare

Teorema 3.5 (inversa di un'applicazione lineare) l'inversa di una applicazioni lineare (se esiste) è ancora un'applicazione lineare

Teorema 3.6 Sia $L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ un'applicazione lineare tale che $\text{Ker } L = \{O_V\}$. Se $v_1, \dots, v_n \in V$ sono vettori linearmente indipendenti, anche $L(v_1), \dots, L(v_n)$ sono vettori linearmente indipendenti di W .

Teorema 3.7 (delle dimensioni) Siano V e W spazi vettoriali su un campo \mathbb{K} e sia $L: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Allora vale

$$\dim V = \dim \text{Im } L + \dim \text{Ker } L$$

Teorema 3.8 Sia $L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ un'applicazione lineare. Se $\text{Ker } L = \{O_V\}$ e $\text{Im } L = W$, allora L è biettiva e dunque invertibile

Definizione 3.3 (isomorfismo) Un'applicazione lineare $L: V \rightarrow W$ biettiva si dice isomorfismo. Se tale applicazioni esiste si dice che V e W sono isomorfi.

Definizione 3.4 (endomorfismo) Un'applicazione lineare $L: V \rightarrow V$ dallo spazio in sé si dice endomorfismo.

4 Applicazioni lineari e matrici

Teorema 4.1 Sia $L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ un'applicazione lineare. Allora esiste un unico vettore $A \in \mathbb{K}^m$ tale che $\forall X \in \mathbb{K}^n$

$$L(X) = A \cdot X$$

Teorema 4.2 Esiste una corrispondenza biunivoca tra

$$\{L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m \text{ lineare}\} \leftrightarrow \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K})$$

1. Data una matrice $M \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K})$ è possibile associare ad essa un'applicazione lineare

$$\begin{aligned} L: \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^m \\ X &\mapsto MX \end{aligned}$$

2. Sia $L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ un'applicazione lineare. Allora esiste una matrice $M \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K})$ tale che $\forall X \in \mathbb{K}^n$, $L(X) = MX$. Se $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$ la è base canonica di \mathbb{K}^n , le colonne di M sono $L(e_1), \dots, L(e_n)$.

Teorema 4.3 Siano V e W spazi vettoriali su un campo \mathbb{K} e sia $L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ un'applicazione lineare. Siano inoltre $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$ basi rispettivamente di V e di W . Preso $v \in V$ esiste una matrice $M \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K})$ tale che

$$X_{\mathcal{B}'}(L(v)) = MX_{\mathcal{B}}(v)$$

dove $X(w)$ è il vettore colonna di w scritto nella rispettiva base.

Teorema 4.4 Siano V e W due spazi vettoriali su \mathbb{K} di dimensione n e m . Siano $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$ basi rispettivamente di V e di W .

Indicando con $\mathcal{L}(V, W) = \{L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m \text{ lineare}\}$ e con $[L]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ la matrice associata a L rispetto alle basi \mathcal{B} e \mathcal{B}' , si ha che

$$\begin{aligned} M: \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K}) \\ L &\mapsto [L]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

è un'applicazione lineare ed è un isomorfismo tra lo spazio delle applicazioni lineari e lo spazio delle matrici.

Teorema 4.5 (matrice di funzione composta) Siano V , W e U spazi vettoriali e siano $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$ e $\mathcal{B}'' = \{u_1, \dots, u_s\}$ basi di V , W e U rispettivamente. Siano inoltre $F: V \rightarrow W$ e $G: W \rightarrow U$ lineari. Allora

$$[G \circ F]_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}} = [G]_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'} [F]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

Teorema 4.6 Sia $L: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e $B: V \rightarrow V$ lineare e invertibile. Allora vale che

$$\text{Im } L \circ B = \text{Im } L \quad \text{e} \quad \dim \text{Ker } L \circ B = \dim \text{Ker } L$$

In altre parole se $[L]$ è la matrice associata a L e $[B]$ è la matrice invertibile delle mosse di colonna associata a B , la matrice $[B][L]$ è una matrice ridotta a scalini per colonna in cui lo *Span* delle colonne è lo stesso dello span delle colonne di $[L]$. Più brevemente la riduzione di Gauss per colonne lascia invariato lo *Span* delle colonne.

Teorema 4.7 Sia $L: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e $U: W \rightarrow W$ lineare e invertibile. Allora vale che

$$\text{Ker } U \circ L = \text{Ker } L \quad \text{e} \quad \dim \text{Im } U \circ L = \dim \text{Im } L$$

In altre parole se $[L]$ è la matrice associata a L e $[U]$ è la matrice invertibile delle mosse di riga associata a U , la matrice $[L][U]$ è una matrice ridotta a scalini per riga che ha lo stesso *Ker* di $[L]$. Più brevemente la riduzione di Gauss per righe lascia invariato lo spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Definizione 4.1 (rango) Sia $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K})$ definiamo rango di A , $\text{rg}A$, in modo equivalente come

1. il numero massimo di colonne linearmente indipendenti (numero di *pivot* colonna di A ridotta a scalini per colonna)
2. il numero massimo di righe linearmente indipendenti (numero di *pivot* riga di A ridotta a scalini per righe)
3. la $\dim \text{Im } L$, dove $L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ è l'applicazione lineare associata $[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = A$

5 Formula di Grassmann e somma diretta

Teorema 5.1 (formula di Grassmann) Siano A e B sottospazi vettoriali di V su un campo \mathbb{K} . Vale

$$\dim A + \dim B = \dim(A + B) + \dim(A \cap B)$$

Definizione 5.1 (somma diretta) Dati A e B sottospazi di V su un campo \mathbb{K} , si dice che A e B sono in somma diretta se $A \cap B = \{O_V\}$.

In modo del tutto equivalente A e B sono in somma diretta se e solo se $\dim A + \dim B = \dim(A+B)$.

Definizione 5.2 (somma diretta di k sottospazi) U_1, \dots, U_k sottospazi di V su un campo \mathbb{K} si dicono essere insomma diretta se $\forall i \in \{1, \dots, k\}$ vale

$$U_i \cap (U_1 + \dots + \hat{U}_i + \dots + U_k) = \{O_V\}$$

In modo equivalente U_1, \dots, U_k sono insomma diretta se e solo se

$$\dim U_1 + \dots + \dim U_k = \dim(U_1 + \dots + U_k)$$

Definizione 5.3 (complementare di un sottospazio) Sia A un sottospazio di V su un campo \mathbb{K} . Un complementare di A è un sottospazio B di V tale che

(i) $A \cap B = \{O_V\}$ (A e B sono in somma diretta)

(ii) $A + B = V$

In tal caso scriveremo che $A \oplus B = V$.

6 Sistemi lineari

Definizione 6.1 (sistema lineare omogeneo) contenuto...

Definizione 6.2 (matrice associata al sistema lineare omogeneo) contenuto...

Teorema 6.1 (dimensione delle soluzioni) Sia M la matrice associata ad un sistema lineare omogeneo con n incognite. Indicando con S lo spazio delle soluzioni del sistema lineare vale

$$\dim S = n - \operatorname{rg} M$$

Definizione 6.3 (sottospazio ortogonale) contenuto... + il sottospazio ortogonale è l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo

Definizione 6.4 (sistema lineare non omogeneo) contenuto...

Definizione 6.5 (matrice completa e incompleta associata) contenuto...

Teorema 6.2 (insieme soluzioni del sistema non omogeneo) Sia S l'insieme delle soluzioni del sistema non omogeneo e S_0 l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo associato. Supposto $S \neq \emptyset$, preso un qualunque $v \in S$ vale

$$S = v + S_0$$

Definizione 6.6 (sottospazio affine) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} , U un suo sottospazio e $v \in V - U$ ($v \neq 0$) si dice che l'insieme $v + U$ è un sottospazio affine di V . Per convenzione si pone $\dim(v + U) = \dim U$.

7 Prodotti scalari

Definizione 7.1 (prodotto scalare) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} . Un prodotto scalare su V è una funzione

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

che soddisfa le seguenti proprietà

- (i) $\forall v, w \in V$ vale $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$
- (ii) $\forall v, w, u \in V$ vale $\langle v, w + u \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v, u \rangle$
- (iii) $\forall v, w \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ vale $\langle \lambda v, w \rangle = \langle v, \lambda w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$

Proprietà 7.1 Alcuni prodotti scalari godono delle seguenti proprietà

- 1. Un vettore $v \in V$ tale che $\langle v, v \rangle = 0$ si dice *isotropo*.
- 2. Un prodotto scalare tale che preso un $v \in V$

$$\forall w \in V \quad \langle v, w \rangle = 0 \Rightarrow v = 0_V$$

si dice *non degenerare*.

- 3. Un prodotto scalare su V spazio vettoriale sul campo \mathbb{R} tale che

$$\forall v \in V \quad \langle v, v \rangle \geq 0 \quad \text{e} \quad \langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0_V$$

si dice *definito positivo*.

Teorema 7.1 Un prodotto scalare è non degenerare se e solo se la matrice E che lo rappresenta ha rango massimo. Ovvero, se $\{e_1, \dots, e_n\}$ è base di V

$$\text{rg} E = \text{rg} \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix} = n$$

Definizione 7.2 (norma, distanza, ortogonalità) Sia $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un prodotto scalare su V spazio vettoriale su \mathbb{R} . Allora

- 1. la norma di $v \in V$ è $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$
- 2. la distanza tra $v, w \in V$ è data da $\|v - w\|$
- 3. due vettori $v, w \in V$ si dicono ortogonali se $\langle v, w \rangle = 0$

Teorema 7.2 (di Pitagora) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{R} con prodotto scalare definito positivo. Dati $v, w \in V$: $\langle v, w \rangle = 0$ allora

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$$

Teorema 7.3 (del parallelogramma) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{R} con prodotto scalare definito positivo. Allora $\forall v, w \in V$ vale

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2$$

Definizione 7.3 (componente) Dati $v, w \in V$ chiamiamo coefficiente di Fourier o componente di v lungo w lo scalare

$$c = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$

In particolare vale $\langle v - cw, w \rangle = 0$

Teorema 7.4 (disuguaglianza di Schwarz) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{R} con prodotto scalare definito positivo. Allora $\forall v, w \in V$ vale

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

Teorema 7.5 (disuguaglianza triangolare) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{R} con prodotto scalare definito positivo. Allora $\forall v, w \in V$ vale

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

Teorema 7.6 Siano $v_1, \dots, v_n \in V$ a due a due perpendicolari ($\forall i \neq j \langle v_i, v_j \rangle = 0$). Allora $\forall v \in V$ il vettore

$$v - \frac{\langle v, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \dots - \frac{\langle v, v_n \rangle}{\langle v_n, v_n \rangle} v_n$$

è ortogonale a ciascuno dei v_i . Risulta inoltre che il vettore $c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$ (dove $c_i = \frac{\langle v, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle}$) è la migliore approssimazione di v come combinazione lineare dei v_i .

Teorema 7.7 (disuguaglianza di Bessel) Siano $e_1, \dots, e_n \in V$ a due a due perpendicolari e unitari. Dato un $v \in V$, sia $c_i = \frac{\langle v, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle}$. Allora vale

$$\sum_{i=1}^n c_i^2 \leq \|v\|^2$$

Teorema 7.8 (ortogonalizzazione di Gram-Schmidt) Sia V uno spazio vettoriale con prodotto scalare definito positivo. Siano $v_1, \dots, v_n \in V$ vettori linearmente indipendenti. Possiamo allora trovare dei vettori u_1, \dots, u_r , con $r \leq n$ ortogonali tra loro e tali che $\forall i \leq r$, $\text{Span}\{v_1, \dots, v_i\} = \text{Span}\{u_1, \dots, u_i\}$. In particolare basterà procedere in modo induttivo e prendere

$$\begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_i = v_i - \frac{\langle v_i, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \dots - \frac{\langle v_i, u_{i-1} \rangle}{\langle u_{i-1}, u_{i-1} \rangle} u_{i-1} \end{cases}$$

Corollario 7.9 (esistenza della base ortonormale per prodotto scalare definito positivo) Dato V spazio vettoriale con prodotto scalare definito positivo esiste una base ortonormale di V , ossia una base $\{u_1, \dots, u_r\}$ tale che $\forall i \neq j \langle u_i, u_j \rangle = 0$ e che $\forall i \|u_i\| = 1$.

Teorema 7.10 Sia V uno spazio vettoriale con prodotto scalare definito positivo. Per ogni W sottospazio di V vale che

$$V = W \oplus W^\perp$$

Definizione 7.4 (prodotto hermitiano) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{C} . Un prodotto hermitiano su V è una funzione

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

che soddisfa le seguenti proprietà

- (i) $\forall v, w \in V$ vale $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$ (coniugato)
- (ii) $\forall v, w, u \in V$ vale $\langle v, w + u \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v, u \rangle$ e $\langle v + w, u \rangle = \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle$
- (iii) $\forall v, w \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ vale $\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$ e $\langle v, \lambda w \rangle = \bar{\lambda} \langle v, w \rangle$

Definizione 7.5 (prodotto hermitiano standard) Dati due vettori colonna $v, w \in \mathbb{C}^n$ definiamo il prodotto hermitiano standard come

$$v \cdot w = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \bar{\beta}_1 + \dots + \alpha_n \bar{\beta}_n$$

Teorema 7.11 (esistenza della base ortogonale per prodotto scalare generico) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} non banale di dimensione finita dotato di un prodotto scalare. Allora V ha una base ortogonale.

Proposizione 7.12 (base ortonormale) Sia $\{w_1, \dots, w_n\}$ una base ortogonale di V con un prodotto scalare. Posto

$$v_i = \begin{cases} \frac{w_i}{\sqrt{\langle w_i, w_i \rangle}} & \text{se } \langle w_i, w_i \rangle > 0 \\ w_i & \text{se } \langle w_i, w_i \rangle = 0 \\ \frac{w_i}{\sqrt{-\langle w_i, w_i \rangle}} & \text{se } \langle w_i, w_i \rangle < 0 \end{cases}$$

l'insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base ortonormale di V .

Teorema 7.13 (corrispondenza matrice - prodotto scalare) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} e sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V . Dato un prodotto scalare $\varphi: V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ la matrice del prodotto scalare è

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = (\varphi(v_i, v_j))_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}.$$

Viceversa data M matrice simmetrica del prodotto scalare e u, w vettori di vettori colonna $[u]_{\mathcal{B}}$ e $[w]_{\mathcal{B}}$ si ha

$$\varphi(v, w) = [u]_{\mathcal{B}}^t \cdot M \cdot [w]_{\mathcal{B}}$$

Proposizione 7.14 (radicale) Vale che $V_0 = \{v \in V : \forall w \in V, \varphi(v, w) = 0\} = \{v \in V : M_{\mathcal{B}}(\varphi) \cdot [v]_{\mathcal{B}} = 0\}$. (Moralmente $V_0 = \ker M_{\mathcal{B}}(\varphi)$).

Definizione 7.6 (spazio duale, funzionali) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} . Si definisce spazio duale di V l'insieme delle applicazioni lineari da V in \mathbb{K}

$$V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{K}) = \mathcal{L}(V) = \{L: V \rightarrow \mathbb{K} : L \text{ è lineare}\}.$$

I suoi elementi vengono detti funzionali lineari da V in \mathbb{K} e risulta $\dim V = \dim V^*$.

Definizione 7.7 (base duale) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} . Fissata una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ di V esiste una base $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ di V^* ad essa associata detta base duale di v_1, \dots, v_n definita come

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Teorema 7.15 Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} di dimensione finita con un prodotto scalare non degenere. Allora l'applicazione

$$\begin{aligned} \Phi: V &\rightarrow V^* \\ v &\mapsto L_v = \langle v, \cdot \rangle \end{aligned}$$

dove L_v è la funzionale tale che $\forall w \in V : L_v(w) = \langle v, w \rangle$, è un isomorfismo tra V e il suo duale V^* .

Teorema 7.16 (annullatore) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} di $\dim V = n$ e sia W sottospazio di V . Sia inoltre $W^\circ = \{\varphi \in V^* : \forall w \in W, \varphi(w) = 0\}$ l'annullatore di W . Allora W° è sottospazio di V^* e vale che $\dim W^\circ = n - \dim W$.

Corollario 7.17 Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} di $\dim V = n$ con prodotto scalare non degenere, sia W sottospazio di V e W^\perp il suo ortogonale. Siano inoltre V^* il duale di V e W° l'annullatore di W . Allora $\Phi(W^\perp) = W^\circ$ (in altre parole $\Phi|_{W^\perp}: W^\perp \rightarrow W^\circ$ è un isomorfismo) e vale quindi

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V$$

Teorema 7.18 Sia $\Phi: V \rightarrow V^*$ l'isomorfismo del Teorema 7.15. Detto V_0 il radicale di V vale che $V_0 = \ker \Phi$ e che $M_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{B}}(\Phi) = M_{\mathcal{B}}(L_v)$ dove \mathcal{B}^* è la base del duale associata alla base \mathcal{B} di V .

Corollario 7.19 Un prodotto scalare φ è non degenere $\iff V_0 = \{O_V\} \iff \ker M_{\mathcal{B}}(\varphi) = O_V \iff M_{\mathcal{B}}(\varphi)$ ha rango $n = \dim V$.

Corollario 7.20 Se \mathcal{B} è una base ortonormale allora la matrice del prodotto scalare è diagonale. Detti $\lambda_i = \varphi(v_i, v_i)$ si ha

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Proposizione 7.21 Se $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ è una base ortonormale di V allora

$$n_0(\varphi) = \text{card}\{i : \lambda_i = \varphi(v_i, v_i) = 0\} = \dim V_0.$$

Tale valore viene detto indice di nullità del prodotto scalare.

Teorema 7.22 (di Sylvester) Sia V uno spazio vettoriale sul campo \mathbb{K} φ un prodotto scalare su V e $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V . Esiste un numero intero $r = n_+(\varphi)$ che dipende solo da φ e non dalla base \mathcal{B} , detto indice di positività, tale che ci sono esattamente r indici i tali che $\varphi(v_i, v_i) = 1$. Analogamente esiste un $r' = n_-(\varphi)$ che dipende solo da φ e non dalla base \mathcal{B} , detto indice di negatività, tale che ci sono esattamente r' indici i tali che $\varphi(v_i, v_i) = -1$.

Definizione 7.8 (segnatura) Si definisce segnatura di un prodotto scalare φ su V la terna $(n_0(\varphi), n_+(\varphi), n_-(\varphi))$. Detta $n = \dim V$ vale

$$n_0(\varphi) + n_+(\varphi) + n_-(\varphi) = n.$$

Dato inoltre W sottospazio vettoriale di V valgono le seguenti caratterizzazioni

- $n_0(\varphi) = \dim V_0$ (radicale);
- $n_+(\varphi) = \max \{\dim W : W \subseteq V \text{ e } \varphi|_W > 0\}$;
- $n_-(\varphi) = \max \{\dim W : W \subseteq V \text{ e } \varphi|_W < 0\}$.

8 Determinante

Definizione 8.1 (gruppo simmetrico) Il gruppo simmetrico di un insieme è il gruppo formato dall'insieme delle permutazioni dei suoi elementi, cioè dall'insieme delle funzioni biettive di tale insieme in se stesso, munito dell'operazione binaria di composizione di funzioni.

In particolare detto $S_n = \{1, \dots, n\}$ l'insieme delle permutazioni

$$\Sigma_n = \Sigma(S_n) = \{\sigma: S_n \rightarrow S_n : \sigma \text{ è biettiva}\}$$

è un gruppo simmetrico. Ricordiamo che una permutazione $\sigma \in \Sigma_n$ viene spesso indicata con la seguente notazione

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

dove si intende che l'elemento i viene mandato in $\sigma(i)$ dalla permutazione.

Definizione 8.2 (trasposizione) Una trasposizione è una permutazione $\tau \in \Sigma_n$ tale che scambia due soli elementi di S_n mentre lascia invariati i restanti $n - 2$. Se τ scambia $i, j \in S_n$ scriveremo $(i \ j)$.

Proposizione 8.1 (i) Ogni permutazione $\sigma \in \Sigma_n$ è esprimibile, non in modo unico, come prodotto (composizione) di trasposizioni.

(ii) Se $\sigma = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_h = \lambda_1 \circ \cdots \circ \lambda_k$ con τ_i e λ_j trasposizioni allora h e k hanno la stessa parità. Se σ è prodotto di un numero pari (dispari) di trasposizioni diremo che σ è pari (dispari).

Definizione 8.3 Data $\sigma \in \Sigma_n$ definiamo la funzione segno $\text{sgn}: \Sigma_n \rightarrow \{-1, 1\}$ come

$$\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ è dispari} \end{cases}$$

Vale in particolare che $\text{sgn}(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \text{sgn}(\sigma_1) \cdot \text{sgn}(\sigma_2)$

Proposizione 8.2 Sia $\sigma \in \Sigma_n$ una permutazione e sia σ^{-1} la permutazione inversa. Allora $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma^{-1})$.

Teorema 8.3 (Unicità del determinante) Sia $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{K})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate a valori nel campo \mathbb{K} . Esiste una ed una sola funzione da $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{K})$ in \mathbb{K} funzione delle righe (o delle colonne) di una matrice A che rispetta i seguenti tre assiomi:

- (i) *multilineare* (lineare in ogni riga o colonna);
- (ii) *alternante* (cambia di segno se si scambiano due righe o due colonne);
- (iii) *normalizzata* (l'immagine dell'identità è 1);

Tale funzione viene detta determinante ed indicata con $\det: \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$.

Proprietà 8.1 (del determinante) Le seguenti proprietà sono conseguenza degli assiomi (i), (ii) e (iii). Sia $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{K})$ allora

- (1) Se A ha due righe uguali allora $\det A = 0$.
- (2) Se A ha una riga nulla allora $\det A = 0$.
- (3) Se alla riga A_i di A si somma un multiplo della riga A_j ($i \neq j$) si ottiene una matrice B tale che $\det A = \det B$.
- (4) Il determinante è invariante sotto l'algoritmo di Gauss (escludendo le mosse di *normalizzazione* delle righe o delle colonne) a meno di un segno che dipende dal numero di scambi di righe o di colonne fatto. In altre parole se S è una forma a scalini di A allora $\det A = \pm \det S$.
- (5) Se A è una matrice diagonale allora il suo determinante è il prodotto degli elementi sulla diagonale: $\det A = a_{11} \cdots a_{nn}$.

(6) A è invertibile $\iff \det A \neq 0$ ($\iff \operatorname{rg} A = n$).

Teorema 8.4 (esistenza del determinante) Sia $A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}} \in \operatorname{Mat}_{n \times n}(\mathbb{K})$. La funzione

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

è il determinante (in quanto è una funzione multilineare, alternante e normalizzata dallo spazio delle matrici nel campo).

Corollario 8.5 Il determinante di A è uguale al determinante della sua trasposta: $\det A = \det A^t$.

Definizione 8.4 (complemento algebrico) Il complemento algebrico o cofattore dell'elemento a_{ij} di una matrice $A \in \operatorname{Mat}_{n \times n}(\mathbb{K})$ è il determinante della matrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta cancellando da A la i -esima riga e la j -esima colonna moltiplicato per $(-1)^{i+j}$: in formule

$$\operatorname{cof}_{ij}(A) = (-1)^{i+j} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cancel{a_{1j}} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \cancel{a_{i1}} & \cdots & \cancel{a_{ij}} & \cdots & \cancel{a_{in}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cancel{a_{nj}} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Teorema 8.6 (sviluppo di Laplace) Data $A \in \operatorname{Mat}_{n \times n}(\mathbb{K})$ la seguente funzione

- fissata una riga i di A : $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \operatorname{cof}_{ij}(A)$
- fissata una colonna j di A : $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot \operatorname{cof}_{ij}(A)$

verifica gli assiomi (i), (ii) e (iii) e quindi è il determinante.

9 Diagonalizzazione, autovettori e autovalori