

Mètodes Numèrics

Pràctica 3: Interpolació

Raquel Garcia, Arnau Mas

Problema 2

Considerem la funció de Bessel de primera espècie d'ordre zero, $J_0(x)$. Volem estimar el valor en l'abscissa x^* tal que $J_0(x^*) = 0$, per això realitzarem interpolació inversa de graus 1, 3 i 5, és a dir, si $(x, J_0(x))$ són els punts de la funció de Bessel que ens donen, nosaltres prendrem $(J_0(x), x)$ com a punts per a realitzar la interpolació. De manera que si $p(x)$ és el nostre polinomi interpolador, al avaluar $p(0)$ obtindrem una aproximació de x^* .

El programa `prob2.c` donats uns punts com a entrada, calcula el polinomi interpolador de Lagrange amb el mètode de les diferències dividides de Newton i l'avalua en el punt zero amb la regla de Horner. Els resultats que hem obtingut al realitzar les interpolacions demanades han sigut els següents:

Taula 1: Interpolant valors positius de $J_0(x)$ més pròxims al canvi de signe de la funció.

Grau	x^*	$J_0(x^*)$
1	2.404728613882804	$5.03291522479392 \times 10^{-5}$
3	2.404822718113948	$1.47416266795862 \times 10^{-6}$
5	2.404825294785460	$1.36489238329446 \times 10^{-7}$

Taula 2: Interpolant valors negatius de $J_0(x)$ més pròxims al canvi de signe de la funció.

Grau	x^*	$J_0(x^*)$
1	2.400077241947102	$2.46750381340249 \times 10^{-3}$
3	2.404149375353531	$3.51087705194527 \times 10^{-4}$
5	2.404216734868258	$3.16108843546827 \times 10^{-4}$

Taula 3: Interpolant valors de $J_0(x)$ simètrics al canvi de signe de la funció.

Grau	x^*	$J_0(x^*)$
1	2.404927513002775	$-5.29287203952310 \times 10^{-5}$
3	2.404824021911155	$7.97298995297100 \times 10^{-7}$
5	2.404825653043717	$-4.94996456864148 \times 10^{-8}$

Observem que el millor resultat l'obtenim amb la interpolació de grau 5 de valors simètrics al voltant del canvi de signe de $J_0(x)$. En general les millors són les interpolacions amb els valors positius i amb els simètrics, i la interpolació amb valors negatius és prou dolenta en comparació.

De fet ja podíem esperar des del principi que la millor interpolació fos la simètrica, ja que és l'única que en l'interval de punts interpoladors conté al x^* , i en general si tenim els punts interpoladors en un interval $[a, b]$ i volem avaluar el polinomi interpolador $p(x)$ en un punt fora d'aquest interval, l'error obtingut pot ser molt gran.

Problema 3

El nostre objectiu és obtenir un valor aproximat de la integral

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{1}{4}\pi \approx 0.785398163397448 \quad (1)$$

pel mètode dels trapezis i pel mètode de Simpson dividint el interval $[0, 1]$ en quatre parts iguals.

El programa `prob3.c` calcula aquestes aproximacions i l'error que es comet amb cadascuna. Amb el mètode dels trapezis hem obtingut $I \approx 0.782794117647059$, que comparat amb el valor exacte amb 15 decimals de (1) ens dóna un error aproximat de $2.604045750389 \times 10^{-3}$.

Amb el mètode de Simpson obtenim $I \approx 0.785392156862745$, que comparat amb (1) té un error aproximat de $6.006534703 \times 10^{-6}$.

Per tant veiem que amb la regla composta de Simpson hem obtingut una millor aproximació.

Problema 4

El nostre objectiu és obtenir un valor aproximat de la integral

$$I = \int_1^5 \frac{e^x}{x} dx$$

pel mètode dels trapezis dividint el interval $[1, 5]$ en $n = 4, 8, 16, 32, 64$ parts iguals.

El programa `prob4.c` calcula aquestes aproximacions i una estimació de l'error comés. Els resultats obtinguts per a cada n són els següents:

Taula 4: Resultat i estimació de l'error obtingut per a cada n .

n	Aproximació I	Estimació error
4	40.239701356634455	10.000000000000000
8	38.782928156314796	2.500000000000000
16	38.413711363539406	0.625000000000000
32	38.321069162332130	0.156250000000000
64	38.297886904128802	0.039062500000000

L'estimació de l'error l'hem calculat segons la fórmula:

$$\left| \frac{(b-a)F}{12} h^2 \right|$$

on b i a són els extrems del interval, en el nostre cas $b = 5$ i $a = 1$, F és una fita superior de la segona derivada de la funció de la qual volem aproximar la integral al interval, i $h = (b-a)/n$. Tenim que la segona derivada de e^x/x és:

$$\frac{e^x(x^3 - 2x^2 + 2x)}{x^4} \leq \frac{e^x}{x}$$

per a $x \geq 1$, per tant hem triat $F = e^5/5 \approx 30$. De manera que per a cada n ens queda l'estimació de l'error següent:

$$10 \cdot \left(\frac{4}{n}\right)^2$$

Observem que per a un major nombre de divisions del interval esperem millorar l'aproximació de I .