

Entrega 2: Addició del moment angular. Estats de barions

Arnau Mas

10 de maig de 2019

1 Spin

A continuació estudiem els possibles estats d'spin de tres quarks, tenint en compte que els quarks són partícules d'spin $\frac{1}{2}$. Els estats més senzills són els de moment angular màxim, $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ i $|\downarrow\downarrow\downarrow\rangle$. Tenim

$$\begin{aligned} S_z |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle &= \frac{\hbar}{2} |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + \frac{\hbar}{2} |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + \frac{\hbar}{2} |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle = \frac{3\hbar}{2} |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, \\ S_z |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle &= -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle - \frac{\hbar}{2} |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle - \frac{\hbar}{2} |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle = -\frac{3\hbar}{2} |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle. \end{aligned}$$

Per tant aquests dos estats són propis de S_z amb valors propis $\frac{3}{2}\hbar$ i $-\frac{3}{2}\hbar$ respectivament. Fent servir que

$$S^2 = S_z^2 + \hbar S_z + S_- S_+ = S_z^2 - \hbar S_z + S_+ S_- \quad (1.1)$$

obtenim

$$\begin{aligned} S^2 |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle &= S_z^2 |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + \hbar S_z |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + S_- S_+ |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle = \left(\frac{3\hbar}{2}\right)^2 |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + \frac{3\hbar^2}{2} |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + 0 \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1\right) \hbar^2 |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle \end{aligned}$$

i

$$\begin{aligned} S^2 |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle &= S_z^2 |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle - \hbar S_z |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle + S_+ S_- |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle = \left(\frac{3\hbar}{2}\right)^2 |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle + \frac{3\hbar^2}{2} |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle + 0 \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1\right) \hbar^2 |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle. \end{aligned}$$

Per tant aquests dos estats tenen spin total $\frac{3}{2}\hbar$. D'aquí deduïm que $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle = \left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle$ i que $|\downarrow\downarrow\downarrow\rangle = \left|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\rangle$.

Per a trobar els altres dos estats amb spin total $\frac{3}{2}\hbar$ podem fer servir que

$$S_- \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} - 1 \right)} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{3}\hbar \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle,$$

i

$$S_+ \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle = \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) + \frac{3}{2} \left(-\frac{3}{2} + 1 \right)} \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{3}\hbar \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle.$$

D'altra banda

$$S_- \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = S_- |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle = \hbar (|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle)$$

i

$$S_+ \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle = S_+ |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle = \hbar (|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle).$$

Per tant

$$\begin{aligned} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{3}} \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

— * —

Taula 1.1: Estats propis d'spin de tres quarks

S^2	S_z	Estat
$\frac{3}{2}\hbar$	$\frac{3}{2}\hbar$	$ S_{123}^1\rangle = \uparrow\uparrow\uparrow\rangle$
$\frac{3}{2}\hbar$	$\frac{1}{2}\hbar$	$ S_{123}^2\rangle = \frac{ \uparrow\uparrow\downarrow\rangle + \uparrow\downarrow\uparrow\rangle + \downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{3}}$
$\frac{3}{2}\hbar$	$-\frac{1}{2}\hbar$	$ S_{123}^3\rangle = \frac{ \downarrow\downarrow\uparrow\rangle + \downarrow\uparrow\downarrow\rangle + \uparrow\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{3}}$
$\frac{3}{2}\hbar$	$-\frac{3}{2}\hbar$	$ S_{123}^4\rangle = \downarrow\downarrow\downarrow\rangle$
$\frac{1}{2}\hbar$	$\frac{1}{2}\hbar$	$ A_{12}^1\rangle = \frac{ \uparrow\downarrow\uparrow\rangle - \downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}\hbar$	$\frac{1}{2}\hbar$	$ S_{12}^1\rangle = \frac{2 \uparrow\uparrow\downarrow\rangle - (\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + \downarrow\uparrow\uparrow\rangle)}{\sqrt{6}}$
$\frac{1}{2}\hbar$	$-\frac{1}{2}\hbar$	$ A_{12}^2\rangle = \frac{ \downarrow\downarrow\uparrow\rangle - \uparrow\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}\hbar$	$-\frac{1}{2}\hbar$	$ S_{12}^2\rangle = \frac{2 \downarrow\downarrow\uparrow\rangle - (\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + \uparrow\downarrow\downarrow\rangle)}{\sqrt{6}}$

És clar que tots els vectors propis de S_z de valor propi $\frac{1}{2}\hbar$ són combinacions lineals de $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$, $|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$ i $|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$, que generen un subespai de dimensió 3. En aquest subespai hi ha $\left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$. Aquest estat és l'únic que pot tenir aquests valors propis ja que l'obtenim aplicant S_- a l'estat $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$, que és l'únic estat propi de S_z amb valor propi $\frac{3}{2}\hbar$. Així doncs, l'ortogonal de $\left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$ és subespai propi de S^2 amb valor propi $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \hbar$, de manera que tenim una degeneració pel que fa a l'estat $\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$. Per a trencar aquesta degeneració imposarem que els estats han de ser simètrics o antisimètrics respecte l'intercanvi dels quarks 1 i 2. Considerem un estat qualsevol $\alpha |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + \beta |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + \gamma |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$. L'ortogonalitat

equivale a $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Si requerim que sigui antisimètric aleshores $\alpha = 0$ i $\beta = -\gamma$, de manera que un cop normalitzat l'estat és

$$\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Si imposem que sigui simètric aleshores $\beta = \gamma$, i per ortogonalitat, $2\beta = -\alpha$. Un cop normalitzat, l'estat és

$$\frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - (|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle)}{\sqrt{6}}.$$

Pel que fa als estats amb $s = \frac{1}{2}$ i $m_s = -\frac{1}{2}$, podem aplicar exactament els mateixos arguments simplement intercanviant \uparrow per \downarrow i viceversa. A la taula 1.1 es mostren els diversos estats d'spin pels tres quarks.

2 Sabor

Si tenim quarks només de dos sabors, *up* i *down*, aleshores els estats $|u\rangle$ i $|d\rangle$ es comporten de la mateixa manera que els estats $|\uparrow\rangle$ i $|\downarrow\rangle$, és a dir, són propis d'uns operadors, anomenats d'isospin, que satisfan les relacions de commutació del moment angular d'una partícula d'spin $\frac{1}{2}$. Per tant els càlculs que hauriem de fer per a trobar els estats de sabor són els mateixos que els de la secció anterior. A la taula 2.1 es mostren tots els possibles estats de sabor amb els corresponents valors d'isospin col·lectiu.

Taula 2.1: Estats propis d'isospin per a tres quarks, considerant només els sabors *up*, *u*, i *down*, *d*

I^2	I_z	Estat
$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$ S_{123}^1\rangle = uuu\rangle$
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$ S_{123}^2\rangle = \frac{ uud\rangle + udu\rangle + duu\rangle}{\sqrt{3}}$
$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$ S_{123}^3\rangle = \frac{ ddu\rangle + dud\rangle + udd\rangle}{\sqrt{3}}$
$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$ S_{123}^4\rangle = ddd\rangle$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$ A_{12}^1\rangle = \frac{ udu\rangle - duu\rangle}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$ S_{12}^1\rangle = \frac{2 uud\rangle - (udu\rangle + duu\rangle)}{\sqrt{6}}$
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$ A_{12}^2\rangle = \frac{ dud\rangle - udd\rangle}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$ S_{12}^2\rangle = \frac{2 ddu\rangle - (dud\rangle + udd\rangle)}{\sqrt{6}}$

3 Color

Els possibles estats ortogonals de color neutre de tres quarks són $|rgb\rangle$, $|rbg\rangle$, $|gbr\rangle$, $|grb\rangle$, $|brg\rangle$ i $|bgr\rangle$. Per tant, un estat de color neutre serà de la forma

$$|\Psi\rangle = \alpha_1 |rgb\rangle + \alpha_2 |rbg\rangle + \beta_1 |gbr\rangle + \beta_2 |grb\rangle + \gamma_1 |brg\rangle + \gamma_2 |bgr\rangle.$$

A la natura, però, només s'observen estats de color completament antisimètrics. Hem d'imposar $P_{12}|\Psi\rangle = P_{23}|\Psi\rangle = P_{31}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle$. Quan requerim $P_{12}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle$ trobem $\alpha_1 = -\alpha_2$, $\beta_1 = -\beta_2$ i $\gamma_1 = -\gamma_2$. Per tant podem escriure

$$|\Psi\rangle = \alpha(|rgb\rangle - |rbg\rangle) + \beta(|gbr\rangle - |grb\rangle) + \gamma(|brg\rangle - |bgr\rangle).$$

Aleshores

$$P_{12}|\Psi\rangle = \alpha(|grb\rangle - |brg\rangle) + \beta(|bgr\rangle - |rgb\rangle) + \gamma(|rbg\rangle - |gbr\rangle),$$

de manera que quan imposem $P_{12}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle$ obtenim $\alpha = \beta = \gamma$. I aleshores la condició $P_{31}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle$ es compleix. Podem determinar l'últim paràmetre que queda per normalització, i per tant el singlet de color és

$$|\Psi\rangle = \frac{|rgb\rangle - |rbg\rangle + |gbr\rangle - |grb\rangle + |brg\rangle - |bgr\rangle}{\sqrt{6}}.$$

4 Estats bariònics

Els estats propis de tres quarks seran productes d'un dels possibles estats d'spin, de sabor i de color. El factor de color és únic, el singlet, que és antisimètric. Per tant el producte de l'estat d'spin i sabor ha de ser simètric. Hi ha 16 possibilitats òbvies, que són els estats de la forma $|S_{123}^n\rangle_S |S_{123}^m\rangle_I$, on n i m varient de 1 a 4, és a dir, productes d'estats amb spin total $\frac{3}{2}\hbar$ i isospin total $\frac{3}{2}$, segons les taules 1.1 i 2.1.

— * —

Per a determinar els altres possibles estats és útil saber com actuen les transposicions P_{12} , P_{23} i P_{31} sobre els estats d'spin i sabor que hem trobat. Farem els càlculs sobre els estats d'spin, però és clar que els estats de sabor satisfaran les mateixes relacions. És clar que sobre els 4 estats simètrics actuen com la identitat. També és clar que $P_{12}|S_{12}^i\rangle = |S_{12}^i\rangle$ i $P_{12}|A_{12}^i\rangle = -|A_{12}^i\rangle$, per construcció.

Tenim

$$P_{23}|A_{12}^1\rangle = \frac{|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Per saber com s'escriu aquest estat en termes de la base que hem trobat podem calcular el seu producte amb la resta dels estats. Aquest estat té $m_s = \frac{3}{2}\hbar$ i ortogonal a $|S_{123}^2\rangle$, de manera que els únics productes que no són nuls són

$$\langle A_{12}^1 | P_{23} | A_{12}^1 \rangle = \frac{1}{2}$$

i

$$\langle S_{12}^1 | P_{23} | A_{12}^1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

És a dir

$$P_{23}|A_{12}^i\rangle = \frac{|A_{12}^1\rangle + \sqrt{3}|S_{12}^1\rangle}{2}. \quad (4.1)$$

Similarment tenim

$$P_{31} |A_{12}^1\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{2}.$$

Els productes són

$$\langle A_{12}^1 | P_{31} |A_{12}^1\rangle = \frac{1}{2}$$

i

$$\langle S_{12}^1 | P_{31} |A_{12}^1\rangle = -\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Per tant

$$P_{31} |A_{12}^1\rangle = \frac{|A_{12}^1\rangle - \sqrt{3}|S_{12}^1\rangle}{2}. \quad (4.2)$$

Fem els mateixos càlculs per $P_{23} |S_{12}^1\rangle$ i $P_{31} |S_{12}^1\rangle$. Com que

$$P_{23} |S_{12}^1\rangle = \frac{2|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - (|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle)}{\sqrt{6}}$$

aleshores

$$\langle A_{12}^1 | P_{23} |S_{12}^1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

i

$$\langle S_{12}^1 | P_{23} |S_{12}^1\rangle =$$