
Chapitre 7 : limites de suites

1 Limite infinie d'une suite

1.1 Limite égale à $+\infty$

Définition. *On dit qu'une suite (u_n) a pour limite $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle du type $[A\,;+\infty[$ (avec $A \in \mathbb{R}^+$) contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note dans ce cas :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$



vidéo

Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

Propriété. *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} n = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^3 = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$$

Démonstration. Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ (pour $\ln(n)$, voir l'exercice 1 de la feuille).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Algorithme de seuil.

On admet que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$. Compléter la fonction `seuil` ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel N tel que $N^2 > A$, puis donner la valeur renvoyée par `seuil(1000)`.

.....

.....

```
def seuil(A):
    n = 0
    while ........ :
        n = n + 1
    return n
```


Propriété. *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} n^k = +\infty$$

1.2 Limite égale à $-\infty$

Définition. *On dit qu'une suite (u_n) a pour limite $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle du type $]-\infty\,;A[$ (avec $A \in \mathbb{R}$) contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

Propriété. *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} -n = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -n^2 = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -n^3 = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -\sqrt{n} = -\infty$$

Démonstration. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} -\sqrt{n} = -\infty$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété. *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} -n^k = -\infty$$

Vocabulaire.

- *Si une suite (u_n) a pour limite $+\infty$, on dit que (u_n)* ***diverge*** *vers $+\infty$.*
- *Si une suite (u_n) a pour limite $-\infty$, on dit que (u_n)* ***diverge*** *vers $-\infty$.*


2 Limite finie d'une suite

2.1 Définition et exemple

Définition. *On dit qu'une suite (u_n) a pour limite un nombre réel ℓ quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle centré en ℓ contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$$

On dit que la suite (u_n) ***converge*** *vers ℓ.*



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

Propriété. *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Démonstration. Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété. *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = 0$$

Remarque. Certaines suites n'admettent pas de limite. On dit qu'elles sont divergentes. Par exemple, la suite définie par $u_n = (-1)^n$ alterne entre 1 et -1 donc n'admet aucune limite (voir l'exercice 3 de la feuille).

3 Opérations sur les limites

3.1 Limite d'une somme

Propriété. *(u_n) et (v_n) sont deux suites. ℓ et ℓ' désignent deux nombres réels.*

Si (u_n) a pour limite	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
Si (v_n) a pour limite	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
Alors $(u_n + v_n)$ a pour limite	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	*F.I**

**F.I = Forme Indéterminée*

Remarque. Dans les cas noté F.I (Forme Indéterminée), on ne peut pas conclure immédiatement et tout résultat est possible. Il faut alors lever l'indétermination en changeant l'écriture (voir sous-partie 3.4)

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = 5 + \dfrac{1}{n}$

2. $v_n = -n^2 + \dfrac{1}{n}$

3. $w_n = -n^3 - n$

4. $z_n = n^5 + \sqrt{n}$

3.2 Limite d'un produit

Propriété. *(u_n) et (v_n) sont deux suites. ℓ et ℓ' désignent deux nombres réels.*

Si (u_n) a pour limite	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	0
Si (v_n) a pour limite	ℓ'	∞	∞	∞
Alors $(u_n \times v_n)$ a pour limite	$\ell \times \ell'$	∞^*	∞^*	*F.I*

**Appliquer la règle des signes.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = \left(2 + \dfrac{1}{n}\right)n^2$

2. $v_n = (-n + 1)n^2$

3. $w_n = \left(-5 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)(n^2 + 4)$

4. $z_n = \left(\dfrac{1}{n^3} + 3\right)\left(2 - \dfrac{1}{n^2}\right)$

3.3 Limite d'un quotient

Propriété. (v_n) *est une suite numérique telle que pour tout* $n \in \mathbb{N}, v_n \neq 0$.

Si (u_n) *a pour limite*	ℓ	$\ell \neq 0$	ℓ	∞	∞	0
Si (v_n) *a pour limite*	$\ell' \neq 0$	$0^{(1)}$	∞	ℓ'	∞	0
Alors $\frac{u_n}{v_n}$ *a pour limite*	$\frac{\ell}{\ell'}$	∞^*	0	∞^*	*F.I.*	*F.I.*

**Appliquer la règle des signes.*
(1) *On distinguera les suites qui tendent vers* 0 *par valeur positive et celles par valeur négative.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $a_n = \dfrac{n^2}{7 + \frac{1}{n}}$

2. $b_n = \dfrac{1 - \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}}$

3. $u_n = \dfrac{5 + \frac{1}{n}}{2 - \dfrac{1}{n^2}}$

4. $v_n = \dfrac{-2 + \frac{1}{n^2}}{n^3}$

3.4 Lever l'indétermination d'une limite

Pour déterminer la limite de formes indéterminées (F.I), on peut transformer l'écriture **en factorisant par le terme de plus haut degré**.

Exemples. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = n^2 - 200n$

2. $v_n = \dfrac{11n^2 + 3n}{5n + 4}$

Parfois, il suffit de **développer et/ou réduire l'expression** pour lever l'indétermination.

1. $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(n + 2)$

2. $v_n = \dfrac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}}$

4 Limites de suites géométriques

vidéo

Propriété. *Soit q un réel différent de 1.*

- *Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.*
- *Si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.*
- *Si $q \leq -1$, alors la suite de terme général (q^n) n'a pas de limite (elle est donc divergente).*

Remarque. Si $q = 1$ alors la suite de terme général (q^n) est constante égale à 1 donc elle converge vers 1.

Démonstration. (Voir l'exercice 16 de la feuille)

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n$

.....

.....

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}8^n$

.....

.....

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$

.....

.....

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{6}{7}\right)^n$

.....

.....

Exemple. ✦ Déterminer la limite d'une suite géométrique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 4^n$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 5 \times 0{,}6^n$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

.....

.....

.....

.....

.....

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -5 \times 2^n$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

.....

.....

.....

.....

4. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

.....


.....

.....

.....

5 Théorèmes de convergence

5.1 Théorème de comparaison



Théorème. *Soit (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose que :*

- *À partir d'un rang N, $u_n \geq v_n$*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

Preuve. (Voir l'exercice 15 de la feuille)

Remarque. Par abus de langage, la suite (v_n) « pousse » la suite (u_n) vers $+\infty$ à partir d'un certain rang.

Exemples. ✦ Utilisation du théorème de comparaison.

1. La suite (u_n) définie par : $u_n = n^2 + (-1)^n$

2. La suite (u_n) définie par : $u_n = n + \cos(n)$

Remarque. Ce théorème s'applique également avec une limite égale à $-\infty$.

Corollaire. *Soit (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose que :*

- *À partir d'un rang N, $u_n \leq v_n$*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$


Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$

5.2 Théorème des gendarmes (ou théorème d'encadrement)

Théorème. *Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites telles que :*

- *À partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$.*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$ *avec ℓ un nombre réel.*

Alors, (u_n) est convergente et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.



Remarque. Par abus de langage, les suites (v_n) et (w_n) « amènent » la suite (u_n) vers ℓ à partir d'un certain rang.

Exemple. ✦ Utilisation du théorème des gendarmes.

1. Soit (u_n) une suite telle que, pour tout entier naturel n non nul,

$$1 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 1 + \frac{1}{n^2+1}$$

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite (u_n).

2. Soit (v_n) une suite telle que, pour tout entier naturel n non nul,

$$-3 - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq v_n \leq -3 + \frac{1}{4n^2+1}$$

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite (v_n).

3. Démontrer que la suite (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ est convergente et déterminer sa limite.

4. Démontrer que la suite (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = 5 + \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ est convergente et déterminer sa limite.

5.3 Théorème de la limite monotone

vidéo

Définition. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que la suite (u_n) est* ***majorée*** *s'il existe un réel M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.*
- *On dit que la suite (u_n) est* ***minorée*** *s'il existe un réel m tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.*
- *La suite (u_n) est dite* ***bornée*** *si elle est à la fois majorée et minorée.*

Remarques.

- Si la suite (u_n) est définie par récurrence, on utilisera souvent un raisonnement par récurrence pour montrer que la suite (u_n) est bornée.
- Si une suite numérique est majorée, il n'y a pas qu'un seul majorant. Par exemple, une suite majorée par 4 est aussi majorée par 5.
- Un majorant ou un minorant est un **nombre fixé** qui ne dépend pas de la variable n.

Exemple. ✦ Donner des exemples de suites majorées, minorées ou bornées.

Suite majorée	**Suite minorée**	**Suite bornée**

Théorème. *(de la limite monotone) Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si (u_n) est* ***croissante*** *et* ***majorée*** *alors (u_n) converge.*
- *Si (u_n) est* ***décroissante*** *et* ***minorée*** *alors (u_n) converge.*

Propriété. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si (u_n) est* ***croissante*** *et* ***non majorée*** *alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.*
- *Si (u_n) est* ***décroissante*** *et* ***non minorée*** *alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.*

Démonstration. (Voir l'exercice 23 de la feuille)

Propriété. *(admise) Soit (u_n) une suite qui converge vers un réel ℓ, et a, b deux réels. Si, à partir d'un certain rang, $a \leq u_n \leq b$, alors $a \leq \ell \leq b$.*

Remarque. Les inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite :

$$\left.\begin{array}{l} a < u_n < b \text{ à partir d'un certain rang} \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell \end{array}\right\} \Longrightarrow a \leq \ell \leq b$$

Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{n} > 0$, mais $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Exemple. ✦ Utilisation du théorème de la limite monotone.

1. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{5}u_n + 4 \end{cases}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1} \leq 5$.

a) Justifier que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ.

b) Déterminer la limite de la suite (u_n).

2. Soit (v_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 8 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \dfrac{1}{2}v_n - 2 \end{cases}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}, -4 \leq v_{n+1} \leq v_n$.

a) Justifier que la suite (v_n) converge vers un réel ℓ.

b) Déterminer la limite de la suite (v_n).

Remarque. Attention, la limite n'est pas toujours égale au majorant donné !