181 Q4059612 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Ibest **Órgão:** CREFONO - 6ª Região **Prova:** Ibest - 2026 - CREFONO - 6ª Região - Analista/Fiscal

Em uma análise de dados realizada por uma organização, diferentes tipos de métricas são utilizados para compreender melhor os resultados. Em um dos relatórios, foram apresentados valores como média de vendas mensais, total de atendimentos realizados e porcentagem de satisfação dos clientes. Esses valores são obtidos a partir de operações matemáticas aplicadas sobre os dados coletados, permitindo resumir e avaliar o desempenho de forma quantitativa.
Considerando os tipos de métricas utilizados em dados, assinale a alternativa que identifica corretamente a classificação dessas métricas.

A Métricas qualitativas
B Métricas descritivas
C Métricas categóricas
D Métricas preditivas
E Métricas dimensionais

182 Q4061797 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Flores da Cunha - RS **Provas:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Flores da Cunha - RS - Técnico em Enfermagem ...

A temperatura externa a um laboratório é monitorada todos os dias no mesmo horário. Durante a última semana do mês de abril, a temperatura medida ao meio-dia em cada um dos dias foi, respectivamente: 31 °C, 30 °C, 35 °C, 25 °C, 21 °C, 20 °C e 20 °C. Considerando a sequência apresentada, é correto afirmar que a temperatura média da semana em questão foi de:

A 25 °C.
B 26 °C.
C 27 °C.
D 28 °C.

183 Q4062025 Estatística > Inferência estatística , Propriedades dos estimadores , Testes de hipóteses Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de Florianópolis - SC **Prova:** FEPESE - 2026 - Prefeitura de Florianópolis - SC - Economista - Edital nº 25

Analise as afirmativas abaixo acerca da heterocedasticidade no modelo de regressão linear clássico.
1. A presença de heterocedasticidade torna os estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados ordinários viesados e inconsistentes. 2. Na presença de heterocedasticidade, os estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados ordinários permanecem não viesados, porém deixam de ser eficientes. 3. A heterocedasticidade compromete a validade dos testes estatísticos usuais, caso não sejam utilizados erros-padrão robustos. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

(A) É correta apenas a afirmativa 1.

(B) É correta apenas a afirmativa 3.

(C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

(D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

(E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

184 Q4062030 Estatística > Modelos lineares , Análise de séries temporais , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de Florianópolis - SC **Prova:** FEPESE - 2026 - Prefeitura de Florianópolis - SC - Economista - Edital nº 25

No âmbito da estatística, diferentes técnicas e ferramentas são utilizadas para resumir dados, identificar padrões e modelar relações entre variáveis.
Relacione abaixo os Conceitos (Coluna 1) com suas respectivas Definições (Coluna 2). **Coluna 1** Conceitos
1. Regressão simples 2. Série temporal 3. Estatística descritiva **Coluna 2** Definições
( ) Resumo de medidas de centralidade e dispersão. ( ) Modelagem da relação entre duas variáveis. ( ) Análise de padrões ao longo do tempo. Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

(A) 1 • 3 • 2

(B) 2 • 1 • 3

(C) 2 • 3 • 1

(D) 3 • 1 • 2

(E) 3 • 2 • 1

185 Q4062577 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Flores da Cunha - RS **Provas:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Flores da Cunha - RS - Médico Clínico Geral - 20 e 40 Horas ...

Analise a tabela a seguir, que apresenta a idade dos candidatos que concorrem a uma determinada vaga em um concurso público.

Nº de candidatos	Idade
17	30
13	40
10	45
8	47
2	52

Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a idade média dos candidatos desse concurso é de:

(A) 33,8 anos.

(B) 35,7 anos.

(C) 39,2 anos.

(D) 42,8 anos.

186 Q4063948 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Pinto Bandeira - RS **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Pinto Bandeira - RS - Agente Administrativo ...

Em uma pesquisa de clima organizacional, as notas de satisfação de um grupo de funcionários foram: 7, 8,8,9,6, 10 e 8. O analista de recursos humanos precisa identificar a moda dessa sequência de dados para descrever a tendência central de percepção dos colaboradores no relatório final. A moda representa um valor específico e característico no conjunto observado. Com base nos dados coletados, qual é o valor da moda para esse grupo específico de funcionários?

(A) 9.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 8,5.

187 Q4064958

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** CIS 5ª RS - PR **Provas:** FAU - 2026 - CIS 5ª RS - PR - Assistente Social ...

Um pesquisador registrou o tempo de 5 cirurgias bariátricas realizadas em um hospital especializado neste procedimento. Os valores em horas são: 3, 2, 5, 3 e 2 horas. Com base nos dados desta amostra, o valor da variância deste procedimento é igual a:

(A) 1,2.

(B) 1,3

(C) 1,4.

(D) 1,5.

(E) 1,6.

188 Q4065741

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Campo Alegre - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Campo Alegre - SC - Advogado ...

Um conjunto de números é composto por quatro elementos, ou seja, por quatro números. Sabe-se que esses números são todos inteiros maiores do que zero, além de que são diferentes entre si; logo, não há elemento repetido no conjunto. Portanto, trata-se de um conjunto amodal, não sendo possível estabelecer uma moda. Ainda, tem-se o valor da média aritmética dos números desse conjunto, mas não se tem o valor da mediana deles. O que pode ser afirmado sobre a mediana, não sendo possível conhecer quais são esses quatro números que compõem o conjunto?

(A) Não é possível se obter a mediana apenas com os dados informados no enunciado.

(B) Como se trata de um conjunto entendido como amodal, ele também não possui mediana.

(C) A mediana é inexistente quando se observa um conjunto composto por uma quantidade par de elementos numéricos.

(D) Pode-se afirmar que a mediana é igual à média aritmética, devido à descrição do conjunto.

189 Q4069427 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Grupo TALENT **Órgão:** Câmara de São José do Rio Pardo - SP **Prova:** Grupo TALENT - 2026 - Câmara de São José do Rio Pardo - SP - Educador Legislativo

A partir dos dados apresentados, assinale a alternativa que contém, respectivamente, a média, a mediana e a moda aproximada dos valores do IPCA no período considerado.



Ⓐ 5,35 ; 4,55 ; não há moda.

Ⓑ 5,35 ; 4,60 ; 4,3.

Ⓒ 4,85 ; 4,55 ; não há moda.

Ⓓ 5,35 ; 4,55 ; 4,4.

190 Q4072186 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Cumaru - PE **Prova:** IDHTEC - 2026 - Prefeitura de Cumaru - PE - Professor II - Matemática

Em um estudo sobre o desempenho dos alunos do 9º ano de uma escola municipal de Cumaru/PE, um professor coletou as notas de 200 alunos em matemática. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências:

Classe	Intervalo	Frequência
1	$0 \vdash 2$	20
2	$2 \vdash 4$	40
3	$4 \vdash 6$	60
4	$6 \vdash 8$	50
5	$8 \vdash 10$	30

A mediana dessa distribuição pertence ao intervalo:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

191 Q4072187 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Cumaru - PE **Prova:** IDHTEC - 2026 - Prefeitura de Cumaru - PE - Professor II - Matemática

Em um estudo estatístico de regressão linear simples, o auditor Rogério analisou a relação entre o investimento em publicidade televisiva (variável X, em milhares de reais) e as vendas de um produto (variável Y, em milhares de unidades) em 200 mercados diferentes. O modelo ajustado forneceu: $\hat{y}$ = 7,03+0,0475*x* , com erro padrão residual (RSE) de 3,26 e coeficiente de determinação R^2 = 0,612. Sabendo que a média das vendas nos 200 mercados é de aproximadamente 14 mil unidades, é correto afirmar que:

(A) O modelo explica aproximadamente 38,8% da variabilidade das vendas.

(B) Para cada aumento de R$ 1.000 no investimento em TV, as vendas aumentam em média 47,5 mil unidades.

(C) O coeficiente de determinação indica que o modelo é perfeito para previsão.

(D) A reta de regressão passa pela origem do sistema de coordenadas.

(E) O erro padrão residual indica que, em média, as previsões se desviam das vendas reais em cerca de 3.260 unidades.

192 Q4075978 Estatística > Modelos lineares , Projeções do modelo , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** SEPLAG-MG **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - SEPLAG-MG - Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Administração, Gestão Pública e Transversalidade ...

Considerando que na regressão linear se tem a utilização da equação reduzida da reta, comumente escrita como **y = Ax + B**, sendo **x** a variável_____ e **y** a variável _____ **A** como coeficiente _____ e **B** como coeficiente _____ , a aproximação linear é muito importante principalmente para estimativas _____ e não muito extensas na variável **x**, ou seja, projeções de prazo.
Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

(A) dependente; independente; angular; linear; lentas; curto.

(B) independente; dependente; angular; linear; rápidas; curto.

(C) dependente; independente; linear; angular; lentas; longo.

(D) dependente; independente; angular; linear; rápidas; longo.

193 Q4075979 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** SEPLAG-MG **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - SEPLAG-MG - Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Administração, Gestão Pública e Transversalidade ...

Analise o texto a seguir:
No tratamento da informação, a construção de ajustes leva ao desenvolvimento de modelos mentais com relação a dados e, assim, a inferir resultados intuitivamente com relação à informação. É deste modo que a aplicação de conceitos associados a médias, representações, gráficos, ajustes, entre outros, molda diversas fenomenologias, seja em ciências naturais, mercados não demasiadamente voláteis, comportamento de características socioeconômicas, etc.
Acerca do texto, pode-se afirmar que ele está:

(A) Parcialmente adequado, visto que não há inferência de resultados de forma intuitiva com relação à informação.

(B) Plenamente adequado, visto que apresenta somente informações verdadeiras.

(C) Plenamente inadequado, visto que apresenta somente informações falsas.

(D) Parcialmente adequado, visto que não há forma de desenvolvimento de modelos mentais com relação a dados a partir da construção de ajustes.

194 Q4075982 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** SEPLAG-MG **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - SEPLAG-MG - Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Administração, Gestão Pública e Transversalidade ...

Alguns conceitos estatísticos são essenciais para que o profissional, ao utilizar de sua ciência, seja capaz de compreender os dados e obter inferências e conclusões de forma adequada. Nesse sentido, analise a descrição de três conceitos a seguir:
Ocorre quando o grau de correlação entre duas quantidades é proporcional e quando dados representados em um gráfico se aproximam intuitivamente de uma reta. É o processo de aproximar um conjunto de dados correlacionados por meio de uma reta e a determinação dessa reta que consiga descrever os pontos. É o grau de conexão entre duas variáveis, qualitativamente entendida como o grau de proximidade dos pontos com alguma função matemática, reta ou parábola, etc.
Qual das alternativas apresenta os conceitos acima explicados, na ordem em que aparecem, ou seja, de cima para baixo, CORRETA e respectivamente?

(A) Linearidade; Correlação; Ajuste linear.
(B) Correlação; Linearidade; Ajuste linear.
(C) Correlação; Ajuste linear; Linearidade.
(D) Linearidade; Ajuste linear; Correlação.

195 Q4075984 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** SEPLAG-MG **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - SEPLAG-MG - Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Administração, Gestão Pública e Transversalidade ...


Em um estudo voltado à análise do comportamento de indicadores socioeconômicos ao longo dos anos, uma equipe técnica precisou aplicar práticas de *fit* para representar adequadamente os dados observados em gráficos e modelos estatísticos. Durante a discussão metodológica, avaliou-se a utilização de ajustes lineares, aproximações matemáticas e identificação de tendências gerais, buscando reduzir distorções e melhorar a interpretação das informações coletadas.
Considerando os princípios relacionados às práticas de *fit* em análises estatísticas e modelagens aplicadas, é CORRETO afirmar que:

(A) A identificação de tendências impede a utilização de gráficos e recursos visuais em análises quantitativas.
(B) Aproximações e tendências podem auxiliar na representação do comportamento geral dos dados ao longo do tempo.
(C) Modelos de ajuste somente podem ser aplicados quando todos os valores observados são idênticos entre si.
(D) Práticas de *fit* substituem integralmente a necessidade de interpretação técnica dos resultados obtidos.

196 Q4079026 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Sarandi - RS **Provas:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Sarandi - RS - Agente de Almoxarifado Central ...

Analise a tabela a seguir, que apresenta a previsão do tempo para o município de Sarandi entre os dias 10 e 17 de maio de 2026.



Fonte: Climatempo (Disponível em: https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/15-dias/cidade/3049/sarandi-rs). Considerando os dados apresentados, a temperatura máxima modal, a temperatura mínima média e a temperatura máxima mediana são, respectivamente:

(A) 6 °C; 5,6 °C e 19 °C.

(B) 8 °C; 6,625 °C e 17,75 °C.

(C) 19 °C; 6,625 °C e 18,5 °C.

(D) 19 °C; 8 °C e 18 °C.

197 Q4089313 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CPCON **Órgão:** UEPB **Provas:** CPCON - 2026 - UEPB - Contador Proad ...

Considere um conjunto de dados formado por quatro números inteiros positivos consecutivos, em ordem crescente, no qual o último número aparece duas vezes. Assim, os dados podem ser representados por

$$n, n + 1, n + 2, n + 3, n + 3$$

com $n \in \mathbb{N}$ e $n \neq 0$.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que:

(A) média aritmética < moda < mediana.

(B) moda < mediana < média aritmética.

(C) mediana < média aritmética < moda.

(D) moda < média aritmética < mediana.

(E) média aritmética < mediana < moda.

198 Q4089319 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CPCON **Órgão:** UEPB **Provas:** CPCON - 2026 - UEPB - Contador Proad ...

A sigla CPCON é formada por cinco letras. Considere que cada letra seja substituída pelo valor correspondente à sua posição no alfabeto, adotando-se a convenção *A*= 1, *B*= 2, *C*= 3, e assim sucessivamente.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que:

(A) A mediana corresponde à letra *C*, a moda também corresponde à letra *C*, e a média aritmética é igual a 10.

(B) A moda corresponde à letra *C*, a mediana corresponde à letra *N*, e a média aritmética não é um número inteiro.

(C) A moda corresponde à letra *N*, a mediana corresponde à letra *O*, e a média aritmética é maior que 12.

(D) A mediana corresponde à letra *P*, a moda corresponde à letra *C*, e a média aritmética é um número inteiro.

(E) A moda corresponde à letra *O*, a mediana corresponde à letra *N*, e a média aritmética é igual a 11.

199 Q4090750 Estatística > Modelos lineares , Análise de séries temporais , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-SC **Prova:** FGV - 2026 - TCE-SC - Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Elétrica

No planejamento da expansão de sistemas elétricos, a previsão de carga é essencial para garantir a confiabilidade e a economicidade do suprimento futuro. Sobre as metodologias e horizontes de previsão de carga, assinale a afirmativa correta.

(A) O método de Previsão pelo Lado da Demanda (*Bottom-Up*) baseia-se na agregação de projeções macroeconômicas nacionais (PIB, inflação e câmbio) para estimar o consumo global de energia de uma região.

(B) Modelos de Séries Temporais (como ARIMA ou Holt-Winters) são amplamente preferidos para o planejamento de longo prazo (10 a 30 anos).

(C) Modelos Econométricos estabelecem relações de causalidade entre o consumo de energia elétrica e variáveis explicativas (como atividade econômica, renda e preço da tarifa).

(D) O método Top-Down de previsão de carga inicia-se pela análise detalhada de cada unidade consumidora (uso final de energia).

(E) No horizonte de curtíssimo prazo (operação do sistema dia a dia), as variáveis climáticas, como temperatura e umidade, são desprezíveis para a previsão da ponta de carga.

200 Q4092423 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Taiúva - SP **Prova:** Avança SP - 2026 - Prefeitura de Taiúva - SP - Psicólogo

Ao se analisar a distribuição de uma variável quantitativa com valores extremos em uma população culturalmente heterogênea, prioriza-se a medida de tendência central menos sensível a outliers, garantindo maior fidedignidade interpretativa. Trata-se de:

(A) Média aritmética.

(B) Moda.

(C) Mediana.

(D) Variância.

(E) Desvio padrão.

Respostas

181: **B** 182: **B** 183: **D** 184: **D** 185: **C** 186: **C** 187: **D** 188: **A** 189: **A** 190: **C**

191: **E** 192: **B** 193: **B** 194: **D** 195: **B** 196: **C** 197: **E** 198: **B** 199: **C** 200: **C**