701 Q3008899 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Tuparetama - PE - Agente Administrativo/Auxiliar Legislativo

O texto seguinte servirá de base para responder à questão.
Em uma etapa do mundial de surf, os atletas finalistas tiveram a oportunidade de surfar 3 ondas, valendo 10 pontos cada, com pesos 2, 3 e 5, respectivamente da primeira para a terceira. Suas pontuações simples são dadas na tabela abaixo:

	1ª onda	2ª onda	3ª onda
Luca Almeida	8,9	7,2	5,1
André Felipe	9,7	5,8	6,2

Se fosse considerada a média simples para o cálculo da nota final, Luca se classificaria para a próxima etapa, mas como é a média com pesos, ele não conseguiu atingir os 7 pontos necessários.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

702 Q2538238 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** CRA-RS **Prova:** FUNDATEC - 2024 - CRA-RS - Administrador

Tendo por base o assunto medidas de tendência central, um professor realizou uma coleta de dados em que obteve a amostra de idade de 10 alunos do Ensino Médio. As idades foram registradas como: 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 25. Assinale a alternativa que apresenta a moda, a média e a mediana, respectivamente, dessa amostra.

- (A) 22 – 22 – 22.
- (B) 21 – 22 – 21,5.
- (C) 22 – 21 – 21,5.
- (D) 22 – 21,5 – 21.
- (E) 21 – 21,5 – 22.

703 Q2543297 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-MA **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - TJ-MA - Analista Judiciário - Estatístico

Para obter o controle de qualidade dos produtos da sua empresa, a administradora Raquele sempre observa uma certa variável X em cada produto. Após uma nova diretriz emitida por determinada agência regulamentadora, a variável que deve ser observada em cada produto Y = 3/2 X + 2. Considere que μ e σ^2 são, respectivamente, a média e variância da variável X. De acordo com o exposto, quais são, respectivamente, os valores da média e variância da variável Y?

Ⓐ $\frac{3}{2}\mu + 2$ e $\frac{3}{2}\sigma^2$

Ⓑ $\frac{3}{2}\mu$ e $\frac{3}{2}\sigma^2$

Ⓒ $\frac{3}{2}\mu$ e $\frac{9}{4}\sigma^2$

Ⓓ $\frac{3}{2}\mu + 2$ e $\frac{9}{4}\sigma^2$

704 Q2543298 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-MA **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - TJ-MA - Analista Judiciário - Estatístico

Determinado Ministério Público Estadual coletou dados nas 53 comarcas do Estado com o intuito de estudar a relação entre o tempo médio (Y), em dias, gasto na triagem inicial de denúncias de abuso recebidas pela comarca e duas variáveis explicativas: o número de servidores lotados no setor responsável por avaliar as denúncias na comarca (X_1); e o número de municípios atendidos pela comarca (X_2). Considere o ajuste do modelo de regressão linear múltipla $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i$, onde i = 1,..., 53 e ε_1,..., ε_{53} são erros independentes com $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ para todo i. Os seguintes resultados foram obtidos pelo método de máxima verossimilhança: $\hat{\beta}_0$ = 21, 5, $\hat{\beta}_1$ = – 2,8 e $\hat{\beta}_2$ = 3,5. Adicionalmente, tem-se que $SQ_{\text{Regressão}}$ = 346,5 e $SQ_{\text{Resíduos}}$ = 185, 5. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

Ⓐ O estimador de máxima verossimilhança para σ^2 será igual a 3,5.

Ⓑ O modelo ajustado é capaz de explicar mais de 70% da variabilidade de Y.

Ⓒ Os valores estimados para β_0, β_1, β_2 seriam diferentes se o método de mínimos quadrados fosse utilizado.

Ⓓ Se em vez de X_1 e X_2 o ajuste considerasse as variáveis explicativas $Z_{1i} = X_{1i} - \bar{X}_1$ e $Z_{2i} = \bar{X}_{2i} - \bar{X}_2$, onde $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$ representam as médias amostrais de X_1 e X_2, respectivamente, os valores estimados para β_1 e β_2 seriam diferentes.

705 Q2543305 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-MA **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - TJ-MA - Analista Judiciário - Estatístico

A respeito de um modelo de regressão logística para uma variável resposta Y considerando a função de ligação canônica associada ao modelo *Bernoulli*, chamada de *logit*, é INCORRETO afirmar que:

Ⓐ A variável resposta indica se cada unidade amostral tem ou não uma característica específica.

Ⓑ A função *logit* fornece uma predição para Y, denotando pelo valor 1 a presença da característica estudada (sucesso) e pelo valor 0 a sua ausência (fracasso).

Ⓒ A razão de chances (*odds ratio*) associada a uma variável explicativa contínua X_1 mensura a mudança na chance (*odds*) de ocorrência de Y devido a uma mudança unitária em X_1, fixadas as demais variáveis explicativas do modelo.

Ⓓ O coeficiente β_1 de uma variável explicativa contínua X_1 fornece a mudança no logaritmo natural da chance (*odds*) de ocorrência de Y associada a uma mudança de uma unidade em X_1, assumindo que as outras variáveis explicativas sejam mantidas fixas.

706 Q2543306 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-MA **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - TJ-MA - Analista Judiciário - Estatístico

Ao se considerar um modelo linear de dados transformados para encontrar as constantes α e β do modelo de regressão não-linear $y = \alpha e^{\beta x}$ que melhor se ajusta aos dados $(x_1, y_1),\ldots,(x_n, y_n)$, a soma dos quadrados dos resíduos que deve ser minimizada é dada por:

Ⓐ $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \alpha e^{\beta x_i})^2.$

Ⓑ $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \ln(\alpha) - \beta x_i)^2.$

Ⓒ $\sum_{i=1}^{n}(\ln(y_i) - \ln(\alpha) - \beta x_i)^2.$

Ⓓ $\sum_{i=1}^{n}(\ln(y_i) - \ln(\alpha) - \beta \ln(x_i))^2.$

707 Q2567294

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística

Considere uma amostra aleatória com tamanho n = 5 do tempo de conclusão de processos, em meses, de indivíduos que respondem a processos em uma determinada Vara Federal: 2, 3, 1, 5, 3. Então, é correto afirmar que a variável tempo de conclusão de processos pode ser descrita pelas estatísticas amostrais média, mediana, desvio-padrão e coeficiente de variação cujos valores são, respectivamente:

Ⓐ 3,0 3,5 1,502 50,07%.

Ⓑ 2,5 3,3 1,482 49,71%.

Ⓒ 2,7 2,9 1,500 51,12%.

Ⓓ 2,8 3,0 1,483 52,96%.

Ⓔ 2,6 2,8 1,301 48,91%.

708 Q2567311

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística

Seja $[X_1, X_2, \ldots, X_n]$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória com distribuição normal, com média μ e variância σ^2, ou seja, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, em que os parâmetros são desconhecidos, então, os estimadores uniformemente de mínima variância não viciados, UMVU, da média μ e variância σ^2 são, respectivamente,

Ⓐ $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ e $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$

Ⓑ $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ e $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2$

Ⓒ $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ e $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$

Ⓓ $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ e $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2$

Ⓔ $\eta = \frac{x_1 + x_n}{2}$ e $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2$

709 Q2567314

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Amostragem Definições de Amostragem em Estatística

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística

O estatístico que trata da análise de dados referentes à Justiça Federal necessita conduzir um estudo que requer informações sobre determinada característica quantitativa, X, dos processados em determinada Vara Federal. Um dos objetivos é construir um intervalo de 95% de confiança para o valor médio da característica quantitativa do grupo de processados, com erro de amostragem ou precisão de 0,5 σ, meio desvio-padrão. Ele tomou, então, uma amostra aleatória piloto de tamanho $n_0 = 5$ que forneceu as seguintes estatísticas amostrais, média e variância, para a característica: $\bar{x}_0 = 127,6$ e $S_0^2 = 1290,8$. A respeito das informações anteriores, sabe-se que é possível assumir o modelo de distribuição normal para a característica quantitativa do grupo de processados, que é finito com N = 2000 indivíduos e com variância desconhecida. Assim, conhecendo o escore da distribuição t de $t_4 (0,975) = 2,78$, é correto afirmar que o tamanho definitivo da amostra n é

(A) $n \cong 25$.

(B) $n \cong 45$.

(C) $n \cong 40$.

(D) $n \cong 31$.

(E) $n \cong 27$.

710 Q2567323

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística

Considere a seguinte série temporal:

t	1	2	3	4	5
Z_t	20	21	25	24	28

É correto afirmar que a média, a variância e a autocorrelação de defasagem 2 dessa série temporal, assumindo o estimador de máxima verossimilhança para a variância, são, respectivamente:

(A) 23,6; 10,3; 0,015012.

(B) 20,5; 8,24; 0,01685.

(C) 24,1; 7,50; 0,15271.

(D) 23,6; 8,24; 0,00194.

(E) 20,5; 7,50; 0,01685.

711 Q2567324 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística

A forma geral de representar uma classe de séries temporais não estacionárias é o modelo utorregressivo integrado médias móveis de ordem (p, d, q), ou seja, ARIMA(p, d, q), em que p é o grau do polinômio aracterístico da parte autorregressiva $\Phi(B)$, q é o grau do polinômio característico da parte média móveis $\theta(B)$ e d é o grau de diferenciação ∇^d, ou seja, $\Phi(B)\nabla^d Z_t = \theta(B)a_t$ em que $\nabla^d Z_t = \omega_t$. Desse modo, tem-se $\Phi(B)\omega_t = \theta(B)a_t$ que é um modelo ARMA(p, q).

A uma determinada série temporal, ajustou-se um modelo da classe ARIMA(p, d, q), e os resultados do ajuste estão expostos a seguir:

Modelo ARIMA ajustado à série temporal

Parâmetro	Estimativa	Erro padrão	t	Valor-p p
AR(1)	0,352075	0,0771099	4,56589	0,000009
MA(1)	-0,751233	0,0559583	-13,424	0,000000
Média	0,071711	0,0369133	1,94269	0,053479
Constante	0,0464633			

Então, é correto afirmar, com aproximação de três (03) casas decimais, que

(A) o modelo ajustado é $Z_t = 0,071 + 0,352Z_{t-1} + 0,75a_{t-1}$,é estacionário, pois $\theta_1 > 0$.

(B) o modelo ajustado é $Z_t = 0,046 + 0,352Z_{t-1} + 0,751a_{t-1}$, é estacionário, pois $-1 < \Phi_1 < 1$, e invertível, pois $-1 < \theta_1 < 1$.

(C) o modelo ajustado é $Z_t = 0,352Z_{t-1} + 0,75a_{t-1}$, é estacionário, pois $\Phi_1 < 0$, e é invertível, pois $\theta_1 > 0$.

(D) o modelo ajustado é $Z_t = 0,352Z_{t-1} + 0,75Z_{t-2}$, é estacionário, pois $\Phi_1 < 0$, e é invertível, pois $\theta_1 > 0$.

(E) o modelo ajustado é $Z_t = 0,071 + 0,352Z_{t-1} - 0,751Z_{t-2}$, é estacionário, pois $\Phi 1 < 0$, e é invertível, pois $\theta_1 > 0$.

712 Q2570316 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Itaiópolis - SC **Provas:** OBJETIVA - 2024 - Prefeitura de Itaiópolis - SC - Analista Tributário **...**

Analisar os itens abaixo:
I. Para os valores 5, 4, 7, 11, 10 e 8, a mediana é igual a 7. II. Para o valores 8, 7, 3, 10 e 12, a média aritmética é igual a 8. III. Para o valores 2, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6 e 2, a moda é igual a 4. Está CORRETO o que se afirma:

(A) Apenas no item I.

(B) Apenas no item II.

(C) Apenas nos itens II e III.

(D) Em todos os itens.

713 Q2589462 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IADES **Órgão:** CENSIPAM **Prova:** IADES - 2024 - CENSIPAM - Técnico de Apoio



Data da detecção	Área de influência(ha)	Quantidade de focos (por detecção)	Duração do evento(horas)	Índice de propagação(ha/h)
2023-02-22 03:48:00	123044.0	1	457.0	0.0
2023-02-22 03:33:00	123044.0	48	456.7	0.0
2023-02-22 02:46:00	122973.0	67	455.9	0.0
2023-02-22 01:53:00	122708.0	20	455.1	170.6
2023-02-21 23:38:00	122367.0	1	452.8	0.0

Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/ defesa-aprimora-ferramenta-painel-do-fogo-para-ajudar-chile-no-combate-a-incendios>. Acesso em: 24 abr. 2024.

Com base nos dados da imagem apresentada, que faz parte de uma notícia acerca do Painel do Fogo, lançado pelo Censipam em 2021, assinale a alternativa correta.

(A) A média da quantidade de focos (por detecção) é 27.

(B) A mediana da duração do evento é 457.0 h.

(C) A moda do índice de propagação é 170.6 ha/h.

(D) A média do índice de propagação é 0.0 ha/h.

(E) A moda da quantidade de focos (por detecção) é 1.

714 Q2610522 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** ACAFE **Órgão:** CELESC **Prova:** ACAFE - 2024 - CELESC - Técnico de Nível Médio - Química

Na rotina de laboratório é necessário analisar a resposta obtida dos experimentos realizados, ou seja, o conjunto de dados, calculando-se a média aritmética e o desvio padrão, por exemplo. Nesse contexto, analise as afirmações abaixo:

I. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor do conjunto está do valor médio.

II. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância.

III. Quanto maior for a variância, mais próximos os valores estão da média.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

(A) II e III.
(B) I e II.
(C) I, II e III.
(D) I e III.
(E) Apenas I.

715 Q3443845 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** CISBRA - SP **Prova:** Avança SP - 2024 - CISBRA - SP - Contador

A Empresa Delta S.A apurou os seguintes resultados sobre o aumento de custos em seus produtos:



Sendo a Equação da Reta de Regressão dada por y = a + bx, onde a = 18,02 e b=0,06, pode-se calcular que para o dia 01/06/24 a estimativa de custos será de:

(A) 18,68%
(B) 18,02%
(C) 18,08%
(D) 18,56%
(E) 18,38%

716 Q2517674 Estatística > Inferência estatística , Intervalos de confiança , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** CVM **Prova:** FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde

Um analista investiga, mediante um modelo de regressão linear clássico, a relação entre a rentabilidade y de ofertas públicas disponíveis no mercado e um indicador de risco associado ao emissor, representado pela variável explicativa x. Considera-se que o termo de erro do modelo siga distribuição Normal. Foi utilizada uma amostra aleatória simples de 20 pares (x,y) de observações mensais. O modelo estimado está apresentado a seguir (erros padrão entre parênteses).

$$y = \underset{(0,264)}{0,528} + \underset{(0,300)}{0,627}x$$

O intervalo de 95% de confiança associado ao impacto de x sobre y é (considere apenas 3 casas decimais):

(A) [-0,009;1,255], e o impacto não é significante ao nível 0,05;

(B) [-0,033;1,257], e o impacto não é significante ao nível 0,05;

(C) [0,039;1,215], e o impacto é significante ao nível 0,05;

(D) [0,135;1,119], e o impacto é significante ao nível 0,05;

(E) [0,327;0,927], e o impacto é significante ao nível 0,05.

717 Q2517676 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** CVM **Prova:** FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde

Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura de um ativo, em termos reais. Ele considera que a rentabilidade real (em %) siga, ao longo dos anos, um modelo AR(1): $y_t = \Phi_0 + \Phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$, em que t é o ano, $E(\varepsilon_t) = 0$ e $corr(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-s}) = 0$, para s = 1, 2, ... Sabe-se que a rentabilidade real prevista pelo modelo para o longuíssimo prazo foi de 4% ao ano. Se a estimativa obtida para o parâmetro Φ_1 foi 0,8, a estimativa do parâmetro Φ_0 foi:

(A) 0,2;

(B) 0,4;

(C) 0,5;

(D) 0,6;

(E) 0,8.

718 Q2518873 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** INPE **Prova:** FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Júnior I - Metrologia Mecânica e Metrologia Física

Sabe-se que os modelos estatísticos de regressão foram construídos com base em algumas suposições.

Dessa forma, assinale a opção que apresenta a suposição que se aplica aos modelos de regressão múltipla e não está presente nos modelos de regressão simples.

(A) A ausência de multicolinearidade.

(B) Os resíduos são normalmente distribuídos.

(C) Os resíduos são homocedásticos.

(D) Os resíduos são não-autocorrelacionados.

(E) A variável ou as variáveis independentes não são estocásticas.

719 Q2518874 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** INPE **Prova:** FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Júnior I - Metrologia Mecânica e Metrologia Física

Uma indústria contratou um engenheiro de qualidade para realizar um experimento completamente aleatorizado com o intuito de avaliar se o tipo de equipamento usado na fabricação de certo produto tinha influência no tempo total de fabricação.

Os resultados estão dispostos na tabela a seguir.

Equipamento	Observações do tempo total de fabricação (em min)				
	1	2	3	4	5
A	20	18	21	20	21
B	23	20	21	19	22

Para a realização desse experimento, o engenheiro elaborou um teste de hipótese.

Considerando que

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{5} y_{ij}^2 = 4221\ ;\ \sum_{i=1}^{2} \frac{y_{i.}^2}{n} = 4205$$

o valor calculado da estatística do teste é

(A) 0,89.

(B) 1,41.

(C) 2,50.

(D) 2,81.

(E) 3,60.

720 Q2523151 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de São José - SC **Prova:** FEPESE - 2024 - Prefeitura de São José - SC - Administrador

Analise as afirmativas abaixo.
1. É possível que não exista moda em um conjunto de dados. 2. A mediana é uma medida afetada pelos valores extremos de um conjunto de dados. 3. A média é uma medida afetada pelos valores extremos de um conjunto de dados. 4. A moda é uma medida afetada pelos valores extremos de um conjunto de dados. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

(A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
(B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
(C) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
(D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
(E) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

Respostas

701: **C** 702: **C** 703: **D** 704: **A** 705: **B** 706: **C** 707: **D** 708: **C** 709: **D** 710: **D**

711: **B** 712: **B** 713: **E** 714: **B** 715: **A** 716: **B** 717: **E** 718: **A** 719: **D** 720: **B**