821 Q4235185 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** UNIFAP **Órgão:** UNIFAP **Prova:** UNIFAP - 2024 - UNIFAP - Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Atenção a Saúde do Adulto e do Idoso - Enfermagem

Acerca dos resultados do artigo "*Diabetes e hipertensão e a orientação familiar e comunitária como atributos da atenção primária à saúde*" de Nascimento *et al*. (2023) leia as afirmativas abaixo:
I – Houve predomínio do sexo masculino na amostra. II – A média de idade foi de 34,1 (DP =8,6) anos. III – O tempo de Serviço na APS teve média de 4 anos (DP=5,4). IV – Cerca de 42% dos profissionais possuem especialização em saúde pública, saúde coletiva ou saúde da família. V - A média do Escore Geral da APS foi de 6.43 (DP=1.20), com 50% (n=31) de classificações Alto e 50%(n=31) de classificações Baixo. Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa CORRETA.

(A) I, II e III estão corretas
(B) II, III e V estão corretas
(C) I e IV estão corretas
(D) II, IV e V estão corretas
(E) IV e V estão corretas

822 Q2348076 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Belo Jardim - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Belo Jardim - PE - Auxiliar Administrativo

Julgue o item subsequente. A mediana de um conjunto de dados numéricos é o valor que se situa no meio do conjunto quando os valores são ordenados em sequência crescente ou decrescente. Se o número de elementos do conjunto for par, a mediana será a média dos dois valores centrais.

◯ Certo
◯ Errado

823 Q2348105 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Belo Jardim - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Belo Jardim - PE - Auxiliar Administrativo

Julgue o item subsequente. Em um conjunto de dados, a moda representa o valor que aparece com maior frequência. Um conjunto é considerado bimodal quando possui duas modas, ou seja, dois valores que apresentam a maior frequência de ocorrência.

◯ Certo
◯ Errado

824 Q2348846 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de São José dos Campos - SP **Provas:** FGV - 2024 - Prefeitura de São José dos Campos - SP - Assistente em Gestão Municipal ...

Considere a amostra de 5 valores 7, X, 3, 12, 3.
Sabe-se que a mediana dessa amostra é igual a 6. A diferença entre a média e a moda dessa amostra é igual a

(A) 3.
(B) 3,1.
(C) 3,2.
(D) 3,3.
(E) 3,4.

825 Q2351908 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Câmara Municipal de São Paulo - SP **Provas:** FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Técnico Legislativo - Contador ...

Considere a seguinte amostra de 7 números inteiros positivos:
3, 3, 6, 3, x, 5, 11. Sabe-se que a média dessa amostra também é um número inteiro. Sendo *S* a soma da moda, da mediana e da média dessa amostra, o menor valor possível de *S* é

(A) 11.
(B) 12.
(C) 13.
(D) 14.
(E) 15.

826 Q2353385 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** DPE-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística

O contador de uma empresa realizou uma amostragem de auditoria para investigar o número de erros encontrados nas contas de sua empresa. A tabela a seguir resume os dados referentes ao número de erros encontrados em uma amostra aleatória de 20 contas:

Erros	Frequência acumulada
2	5
3	14
4	17
5	19
6	20

De acordo com os resultados amostrais, os valores da média, mediana e moda do número de erros encontrados são, respectivamente:

Ⓐ 3,25 – 3,00 – 3,00

Ⓑ 3,25 – 3,50 – 4,00

Ⓒ 3,00 – 3,00 – 3,00

Ⓓ 3,00 – 3,50 – 4,00

827 Q2353402 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** DPE-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística

A figura apresenta parte do resultado do ajuste de um modelo de regressão linear realizado através da função *lm()* do *software* R.

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  8.03253    0.67279   11.94 7.27e-05 ***
x1          -3.57336    0.19548  -18.28 9.01e-06 ***
x2           0.96716    0.04887   19.79 6.08e-06 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.8205 on 5 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9881,    Adjusted R-squared:  0.9834
F-statistic:   208 on 2 and 5 DF,  p-value: 1.536e-05
```

De acordo com os dados fornecidos e as propriedades do modelo de regressão linear, assinale a afirmativa INCORRETA.

Ⓐ A análise foi baseada em uma amostra de tamanho 8.

Ⓑ O quadrado médio dos resíduos é, aproximadamente, igual a 0,673.

Ⓒ As probabilidades *Pr(>|t|)* foram calculadas com base em uma distribuição *t* de *Student* com 5 graus de liberdade.

Ⓓ A variável resposta y irá reduzir –2,6062 unidades quando ambas as variáveis explicativas *x1* e *x2* forem acrescidas de uma unidade.

828 Q2359184 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-BR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CAU-BR - Analista de Geotecnologia

X	frequência absoluta acumulada
0	5
1	15
2	30
3	45
4	55
5	60

Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa *X* - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por *n* observações, julgue o seguinte item.

A mediana amostral da variável *X* é igual a 2,5.

◯ Certo

◯ Errado

829 Q2359185 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-BR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CAU-BR - Analista de Geotecnologia

Supondo que a covariância entre duas variáveis *Y* e *W* seja igual a 60 e que o desvio padrão de *W* seja igual a 5, julgue o próximo item.

Se o coeficiente de determinação do modelo de regressão linear simples da variável *W* sobre a variável *Y* for igual a 0,9, e se o intercepto do modelo não for nulo, então a correlação linear de Pearson entre essas variáveis será inferior a 0,9.

◯ Certo

◯ Errado

830 Q2359187 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-BR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CAU-BR - Analista de Geotecnologia

Supondo que a covariância entre duas variáveis *Y* e *W* seja igual a 60 e que o desvio padrão de *W* seja igual a 5, julgue o próximo item.

O coeficiente angular da reta de regressão linear simples da variável resposta *Y* sobre a variável regressora *W* - considerando que o intercepto não seja nulo - é igual a 2,4.

◯ Certo

◯ Errado

831 Q2360315 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de São José dos Campos - SP **Prova:** FGV - 2024 - Prefeitura de São José dos Campos - SP - Analista em Gestão Municipal -Ciências Econômicas

Segundo dados do IBGE, o IPCA mensal registrou os seguintes valores entre janeiro e julho de 2023 (em %):

jan/23	0,53
fev/23	0,84
mar/23	0,71
abr/23	0,61
mai/23	0,23
jun/23	-0,08
jul/23	0,12

Considerando esse período, a mediana e a amplitude (em %) foram iguais, respectivamente, a

(A) 0,42 e 0,76.
(B) 0,53 e 0,76.
(C) 0,53 e 0,92.
(D) 0,53 e 0,485.
(E) 0,57 e 0,84.

832 Q2367111 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CTI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CTI - Tecnologista Pleno 2 - I - Especialidade: Tecnologias Habilitadoras - Área de Atuação: Inteligência Artificial e Ciências de Dados

Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística.

Nos modelos de inferência baseada em regressão linear simples, os erros são correlacionados e sua média é superior a zero.

◯ Certo
◯ Errado

833 Q2367113 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CTI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CTI - Tecnologista Pleno 2 - I - Especialidade: Tecnologias Habilitadoras - Área de Atuação: Inteligência Artificial e Ciências de Dados

Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística.

Os modelos de regressão polinomial envolvem funções polinomiais de variável explicativa.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

834 Q2367117 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CTI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CTI - Tecnologista Pleno 2 - I - Especialidade: Tecnologias Habilitadoras - Área de Atuação: Inteligência Artificial e Ciências de Dados

Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística.

Os modelos de regressão resistente são alternativas em que os estimadores são baseados em medianas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

835 Q2367118 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CTI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CTI - Tecnologista Pleno 2 - I - Especialidade: Tecnologias Habilitadoras - Área de Atuação: Inteligência Artificial e Ciências de Dados

Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística.

Abordagens baseadas em regras para a incerteza adicionam um fator de confusão a cada regra para acomodar a incerteza dos eventos.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

836 Q2367125 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CTI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CTI - Tecnologista Pleno 2 - I - Especialidade: Tecnologias Habilitadoras - Área de Atuação: Inteligência Artificial e Ciências de Dados

Julgue o item a seguir, a respeito de algoritmos e técnicas supervisionadas e não supervisionadas de aprendizado de máquina e aprendizagem profunda.

Se os números em um conjunto estiverem igualmente espaçados, então a mediana e a média desse conjunto serão iguais.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

837 Q2369330 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Câmara de Anápolis - GO **Provas:** CS-UFG - 2024 - Câmara de Anápolis - GO - Assistente Administrativo ...

As notas finais em Matemática de uma determinada turma de um colégio são as seguintes:
9,0 – 7,5 – 5,0 – 7,0 – 6,0 – 3,0 – 6,0 – 9,5 – 7,5 – 6,0 Qual a relação entre a média, moda e mediana dessas notas?

(A) Mediana > Média > Moda.

(B) Mediana > Moda> Média.

(C) Média > Moda > Mediana.

(D) Média > Mediana > Moda.

838 Q2382831 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ITAIPU BINACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Geógrafo

Com relação a estatística descritiva, a média aritmética é
I uma medida de tendência central que não é afetada por valores discrepantes nos dados, fato que a torna inutilizável em distribuições simétricas. II a única medida de tendência central que sempre produz resultados inteiros, mesmo quando aplicada a variáveis discretas. III calculada como sendo a soma de todos os valores integrantes de um conjunto de dados, dividida pela quantidade de elementos desse conjunto. Assinale a opção correta.

(A) Nenhum item está certo.

(B) Apenas o item I está certo.

(C) Apenas o item II está certo.

(D) Apenas o item III está certo.

(E) Todos os itens estão certos.

839 Q2382832 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ITAIPU BINACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Geógrafo

Definida no âmbito da estatística descritiva, a mediana é

(A) o valor médio de um conjunto de dados, independentemente do número de elementos, sendo afetada por valores discrepantes.

(B) determinada, em um conjunto de dados com número ímpar de elementos, pela soma de todos os valores seguida da divisão pelo número total de elementos do conjunto.

(C) o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados com número ímpar de elementos, não sendo influenciada por valores discrepantes.

(D) a medida de tendência central mais apropriada para variáveis categóricas, sendo calculada pela soma dos valores extremos do conjunto de dados.

(E) calculada fazendo-se a média dos dois valores centrais em um conjunto de dados, não podendo ser utilizada para distribuições assimétricas.

840 Q2382833

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ITAIPU BINACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Geógrafo

Com relação a medidas de posição e a medidas de dispersão, conceitos da estatística descritiva, assinale a opção correta.

(A) Medidas de posição descrevem o centro de um conjunto de dados, enquanto as medidas de dispersão indicam a variação ou distribuição dos dados em torno do centro.

(B) Medidas de dispersão são calculadas para determinar o ponto central dos dados, enquanto as medidas de posição são utilizadas para identificar *outliers* e anomalias nos dados.

(C) Medidas de posição e dispersão são utilizadas exclusivamente em estatísticas avançadas e não têm aplicação em análises estatísticas básicas ou em pesquisas cotidianas.

(D) Medidas de posição são irrelevantes para a interpretação de dados, enquanto as medidas de dispersão são as únicas que fornecem *insights* significativos sobre um conjunto de dados.

(E) Medidas de posição são usadas apenas para dados qualitativos, e as medidas de dispersão são aplicáveis somente a dados quantitativos.

Respostas

821: **B** 822: **C** 823: **C** 824: **C** 825: **B** 826: **A** 827: **D** 828: **C** 829: **E** 830: **C**

831: **C** 832: **E** 833: **C** 834: **C** 835: **C** 836: **C** 837: **D** 838: **D** 839: **C** 840: **A**