101 Q4163696 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Fundação La Salle **Órgão:** Prefeitura de São Leopoldo - RS **Provas:** Fundação La Salle - 2026 - Prefeitura de São Leopoldo - RS - Médico Veterinário - Tarde ...

Os tempos, em minutos, que cinco alunos levaram para concluir uma atividade foram: 18, 25, 21, 37, 24. Qual é a mediana desses tempos?

(A) 18
(B) 21
(C) 24
(D) 25
(E) 37

102 Q4163814 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IBADE **Órgão:** COREN-AM **Provas:** IBADE - 2026 - COREN-AM - Administrador ...

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) realizou um levantamento sobre a quantidade de atendimentos administrativos concluídos por cinco servidores em determinado setor durante uma semana. Os resultados obtidos foram: 18, 22, 22, 25 e 33 atendimentos. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que indica corretamente a mediana do conjunto.

(A) 18
(B) 20
(C) 22
(D) 24
(E) 25

103 Q4163843 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** IBADE **Órgão:** COREN-AM **Prova:** IBADE - 2026 - COREN-AM - Administrador

A estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos constitui um conjunto de métodos quantitativos utilizados para monitorar desempenho, reduzir variabilidade, identificar causas de falhas e subsidiar a tomada de decisão organizacional baseada em evidências. Acerca do tema, julgue as frases abaixo.
I. Em ambientes produtivos, administrativos ou de serviços, a análise estatística permite compreender o comportamento dos processos por meio da coleta, organização, interpretação e inferência de dados, possibilitando maior previsibilidade operacional e controle da qualidade. II. Entre os principais conceitos utilizados destacam-se as medidas de tendência central (média, mediana e moda), medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio-padrão) e análise de distribuição de frequências, fundamentais para avaliar estabilidade e uniformidade dos processos. III. A estatística é aplicada na análise de capacidade do processo, permitindo verificar se o desempenho operacional atende aos limites e especificações previamente estabelecidos. Indicadores como Cp e Cpk avaliam a aptidão do processo para produzir resultados dentro dos padrões desejados. Está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

(A) III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) I, II e III.

104 Q4174681 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDEPES **Órgão:** Prefeitura de Maceió - AL **Prova:** FUNDEPES - 2026 - Prefeitura de Maceió - AL - Guarda Civil Municipal

O quadro apresenta o número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal de um Município ao longo de uma semana.

Dia	Número de ocorrências
Segunda-feira	8
Terça-feira	6
Quarta-feira	10
Quinta-feira	6
Sexta-feira	12
Sábado	14
Domingo	8

Com base nos dados apresentados, dadas as afirmativas, I. A mediana do número de ocorrências registradas na semana é igual a 8. II. A média do número de ocorrências registradas na semana é superior a 9. III. A distribuição possui duas modas: 6 e 8. verifica-se que está/ão correta/s

(A) II, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

105 Q4175020 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** CISCOPAR **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - CISCOPAR - Técnico em Segurança do Trabalho ...

O setor de recursos humanos registrou o tempo de serviço, em anos completos, de uma pequena equipe de técnicos de enfermagem recém-promovidos: 2, 2, 3, 5, 7, 8, 15. Para um relatório gerencial de fluxo de carreira, a chefia exige a apresentação de um indicador que represente o ponto central dessa distribuição de dados. Ao ordenar as informações coletadas, qual é o valor que divide exatamente esse conjunto de tempos de serviço em duas partes com igual número de servidores?

A 2.

B 7.

C 6.

D 5.

106 Q4184003 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Assistente em Administração

As medidas de tendência central são frequentemente calculadas durante o uso de métodos quantitativos no contexto da gestão.
Sobre esta afirmação, assinale a alternativa CORRETA.

A A mediana, considerada uma medida de tendência central, representa o índice de distribuição de frequência dos dados coletados em relação a determinada variável.

B O coeficiente de variação, considerado uma medida de tendência central, representa o valor que separa um conjunto de dados ordenados em duas partes iguais.

C A moda, considerada uma medida de tendência central, representa a amplitude dos valores de determinado conjunto de dados.

D A amplitude, considerada uma medida de tendência central, representa o valor que mais se repete em um determinado conjunto de dados.

E A média aritmética simples, considerada uma medida de tendência central, é representada pela divisão entre o somatório dos valores observados e o número de registros. A moda é o valor mais frequente de um conjunto de dados.

107 Q4184005

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Assistente em Administração

A média aritmética simples é frequentemente aplicada durante o uso de métodos quantitativos no contexto da gestão.
Sobre a afirmação, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A moda é um exemplo de medida de variabilidade utilizada com o propósito de identificar os níveis de dispersão dos dados em relação à média.

(B) A variância, é um exemplo de medida de tendência central utilizada com o propósito de identificar o comportamento da distribuição de frequência dos dados coletados em relação à determinada variável.

(C) O desvio padrão é uma medida de tendência central usada com o propósito de identificar o grau de dispersão dos dados em relação à média.

(D) A média é uma medida de tendência central e deve ser acompanhada por algumas medidas de variabilidade com o propósito de identificar os graus de dispersão dos dados em relação ao seu valor.

(E) A mediana é uma medida de medida de variabilidade usada com o propósito de identificar a amplitude dos valores de determinado conjunto de dados.

---

108 Q4184367

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Administrador

Assinale a alternativa CORRETA.

(A) A moda é um exemplo de medida de variabilidade utilizada com o propósito de identificar os níveis de dispersão dos dados em relação à média.

(B) O desvio padrão é uma medida de tendência central usada com o propósito de identificar o grau de dispersão dos dados em relação à média.

(C) A amplitude, considerada uma medida de tendência central, representa o valor que mais se repete em determinado conjunto de dados.

(D) No uso de métodos quantitativos aplicados à gestão, os cálculos de média, moda e mediana são realizados para determinar as medidas de tendência central dos dados obtidos de variáveis consideradas importantes para estudos, avaliações e tomadas de decisão.

(E) A mediana é uma medida de variabilidade usada com o propósito de identificar a amplitude dos valores de determinado conjunto de dados.

109 Q4184684 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** Câmara de Reserva - PR **Provas:** Instituto Legalle - 2026 - Câmara de Reserva - PR - Assistente Administrativo ...

Durante os oito primeiros dias de um mês, o departamento de atendimento emitiu diarlamente as seguintes quantidades de ofícios: 8,5,12,10,7, 15, 6 e 10. Para fins de auditoria interna, a chefia solicitou a mediana desse conjunto de dados diários para avaliar a regularidade dos atendimentos. Com isso, o valor CORRETO da mediana encontrado a partir dos registros de ofícios desse período de oito dias do mês avaliado e:

(A) 9,1.

(B) 8,9.

(C) 8,0.

(D) 9,0.

110 Q4186331 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Técnico de Laboratório (Biologia)

Em uma área urbana de Macapá, foi avaliado o comprimento rostro-cloacal (CRC) de indivíduos de *Rhinella marina*. Os resultados foram organizados separadamente por sexo, conforme a tabela abaixo.

Sexo	Número de indivíduos	CRC (mm) médio	Desvio Padrão (mm)
Machos	36	112,0	4,8
Fêmeas	42	128,0	5,2

Considerando os resultados apresentados, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As fêmeas apresentaram maior comprimento médio e maior dispersão dos valores de CRC em relação aos machos.

(B) O maior desvio padrão das fêmeas indica que todas apresentaram CRC superior a 128 mm.

(C) Como os desvios padrão dos dois grupos apresentaram valores próximos, conclui-se que machos e fêmeas possuem o mesmo tamanho corporal médio.

(D) O maior comprimento médio das fêmeas permite afirmar que todas apresentaram CRC superior ao dos machos.

(E) Como o número de fêmeas avaliadas foi maior, o comprimento médio desse grupo necessariamente também seria maior.

111 Q4186527 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Estatístico

Um pesquisador da gestão pública analisou a distribuição salarial de servidores de um órgão federal: média = 50 mil, mediana = 45 mil, moda = 40 mil. Em relação ao comportamento dessa distribuição, julgue os itens a seguir:

I. A relação média > mediana > moda indica assimetria positiva (à direita), ou seja, a cauda da distribuição se alonga para valores mais altos, puxando a média para cima.

II. Em uma distribuição assimétrica positiva, a média é maior que a mediana, que por sua vez é maior que a moda. O fato de haver poucos salários muito elevados influencia a média mais do que a mediana.

III. Se a distribuição fosse simétrica, esperaríamos média = mediana = moda (aproximadamente). No caso apresentado, a diferença indica assimetria à direita.

IV. A curtose da distribuição pode ser avaliada pela comparação entre média e mediana; como a média é maior que a mediana, a distribuição é leptocúrtica (caudas pesadas).

V. Em uma distribuição com assimetria positiva, a mediana é geralmente a medida de tendência central mais robusta para representar o salário típico, pois não é puxada pelos valores extremos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (V/F):

(A) V – V – V – F – V

(B) V – F – V – V – F

(C) F – V – V – F – V

(D) F – F – V – V – F

(E) V – V – F – F – V

112 Q4186541

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Estatístico

Um teste de hipóteses bicaudal foi realizado para verificar se a média de vendas diárias de um produto (μ) é diferente de R$ 1.000. As hipóteses são H_0: μ = 1000 e H_1: μ ≠ 1000. O valor *p* calculado foi de 0,035, e o nível de significância adotado foi α = 0,05. Em relação à interpretação e aos conceitos associados a esse resultado, julgue os itens a seguir:

I. A conclusão correta é rejeitar H_0 ao nível de 5%, pois $p = 0,035 < 0,05$. Isso significa que a probabilidade de se obter um resultado tão extremo quanto o observado, assumindo H_0 verdadeira, é de apenas 3,5%.

II. Rejeitar H_0 nesse contexto implica que a probabilidade de cometer um erro tipo I (rejeitar H_0 quando ela é verdadeira) é exatamente igual ao valor *p* (3,5%), independentemente do escolhido a priori.

III. Se o nível de significância fosse 1% (α = 0,01), a conclusão seria diferente: não rejeitaríamos H_0, pois $p = 0,035 > 0,01$. Isso mostra que a conclusão do teste depende da escolha de α antes da análise.

IV. O valor *p* de 0,035 indica que a probabilidade de H_0 ser verdadeira é de 3,5%. Essa é uma interpretação incorreta, mas comumente encontrada em práticas não estatísticas.

V. Para um teste bicaudal, o valor *p* é definido como $2 \times P(T \geq |t_{obs}| \mid H_0)$ quando a distribuição do teste é simétrica. Se o teste fosse unilateral à direita com a mesma estatística, o valor *p* seria metade (0,0175), e com α = 0,05 também levaria à rejeição de H_0.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (V/F):

(A) V – F – V – V – V
(B) V – V – F – V – F
(C) F – V – V – F – V
(D) V – V – V – F – F
(E) F – F – V – V – F

113 Q4186542 Estatística > Inferência estatística , Métodos de estimação , Estimativa de Máxima Verossimilhança
Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Estatístico

Em uma avaliação de impacto de um novo programa de atenção primária à saúde, um gestor público modela a probabilidade de óbito em até 30 dias (variável resposta binária: 1 = óbito, 0 = sobrevida) usando regressão logística binária, com variáveis explicativas: idade, índice de comorbidades, adesão ao protocolo e condição socioeconômica. Em relação à teoria e prática da regressão logística, julgue os itens a seguir:

I. O modelo de regressão logística estima a probabilidade $P(Y = 1 \mid X) = 1 / 1+e^{-X\beta}$, sendo que os parâmetros β são obtidos por máxima verossimilhança (MV), e diferentemente do modelo linear de probabilidade (MLP), os valores preditos ficam restritos ao intervalo [0,1].

II. Se o coeficiente estimado para idade for $\beta_{idade} = 0,05$, a interpretação é que um aumento de uma unidade na idade está associado a um aumento de 5% na probabilidade de óbito, mantendo as demais variáveis constantes.

III. O modelo logístico não requer normalidade dos resíduos nem homocedasticidade, mas exige independência das observações e ausência de multicolinearidade perfeita ou quase perfeita.

IV. A área sob a curva ROC (AUC) é uma medida de acurácia discriminativa do modelo: valores próximos a 0,5 indicam discriminação aleatória, enquanto valores acima de 0,8 sugerem bom poder discriminativo.

V. O teste de Hosmer-Lemeshow é frequentemente usado para avaliar a calibração do modelo logístico, ou seja, se as probabilidades preditas correspondem às frequências observadas. Um resultado não significativo ($p > 0,05$) indica boa calibração.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (V/F):

(A) V – F – V – V – V
(B) V – V – F – V – F
(C) F – V – V – F – V
(D) V – F – V – F – F
(E) F – F – V – V – V

114 Q4186545

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Estatístico

Em uma pesquisa de clima organizacional aplicada a 2.000 servidores públicos federais, foram coletadas respostas a 20 perguntas (escala Likert de 1 a 5). O estatístico responsável deseja identificar construtos latentes subjacentes (ex.: satisfação com liderança, engajamento, condições de trabalho) que expliquem as correlações observadas entre as variáveis manifestas. Para isso, ele opta pela Análise Fatorial por Eixos Principais com rotação oblíqua (promax), após verificar que o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo ($p < 0,001$) e a medida KMO = 0,87. Avalie as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) A Análise Fatorial exige que as variáveis originais sejam independentes entre si, condição verificada pelo teste de Bartlett significativo.

( ) A rotação varimax (ortogonal) seria mais adequada do que a promax, pois a rotação oblíqua sempre produz fatores correlacionados, o que invalida o modelo.

( ) O teste KMO mede a adequação da amostra para a análise fatorial; valores acima de 0,8 indicam boa adequação, como no caso apresentado.

( ) Na Análise Fatorial, as comunalidades representam a parcela da variância total de cada variável que não é explicada pelos fatores comuns.

( ) A rotação dos fatores altera a solução matemática dos autovalores e a variância total explicada, sendo desaconselhada quando o objetivo é puramente redução de dimensionalidade.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V – V – F – F – V
(B) F – V – V – F – F
(C) F – F – V – F – F
(D) V – F – V – V – F
(E) F – F – V – V – V

115 Q4196847

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de São Miguel Arcanjo - SP **Provas:** Avança SP - 2026 - Prefeitura de São Miguel Arcanjo - SP - Médico do Trabalho ···

Durante uma inspeção de qualidade, um técnico mediu a concentração de partículas sólidas em cinco amostras de água industrial. Os valores obtidos (em mg/L) foram:
11,7 – 13,9 – 12,5 — 14,2 – 15,1
Com base nesses dados, qual é a média simples da concentração de partículas nas amostras? Assinale a alternativa correta.

(A) 13,20
(B) 13,48
(C) 13,80
(D) 14,0
(E) 14,5

116 Q4199275 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Auxiliar Administrativo ...

Durante uma semana, Gael anotou quantos passarinhos vieram beber água no bebedouro que ele colocou no quintal de casa. Assim:
• na segunda-feira, ele contou 8 passarinhos;
• na terça-feira, 12;
• na quarta-feira, 10;
• na quinta-feira, 15;
• na sexta-feira, 10;
• no sábado, 18; e
• no domingo, 11.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

A mediana do número de passarinhos registrados na semana foi igual a 10.

◯ Certo

◯ Errado

117 Q4199276 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Auxiliar Administrativo ...

A moda do número de passarinhos registrados na semana foi igual a 10.

◯ Certo

◯ Errado

118 Q4201013 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Dois Irmãos - RS **Provas:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Dois Irmãos - RS - Agente de Endemias ...

Uma comissão organizadora de concurso público realizou uma capacitação com servidores recém-admitidos e, ao final do curso, aplicou uma avaliação com notas variando de 0 a 10. As notas obtidas pelosseis participantes foram as seguintes:
8,0 – 7,5 – 9,0 – 8,0 – 6,5 – 9,0 As medidas de tendência central constituem importantes ferramentas estatísticas para resumir e interpretar conjuntos de dados, sendo frequentemente utilizadas em pesquisas, avaliações e relatórios administrativos. Considerando exclusivamente os dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA.

Ⓐ A média aritmética é 8,0, a mediana é 8,0 e a distribuição apresenta duas modas.

Ⓑ A média aritmética é 8,2, a mediana é 7,5 e a moda é 9,0.

Ⓒ A média aritmética é 7,8, a mediana é 8,5 e não existe moda.

Ⓓ A média aritmética é 8,5, a mediana é 8,0 e a moda é 8,0.

119 Q4201082 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Analista Administrativo ...

Durante 30 dias, Sebastião anotou a quantidade de pacotes de pipoca vendidos por dia. Assim: em 6 dias, vendeu 20 pacotes por dia; em 8 dias, vendeu 25 pacotes por dia; em 10 dias, vendeu 30 pacotes por dia; e, em 6 dias, vendeu 35 pacotes por dia.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

A distribuição das quantidades diárias de pacotes vendidos é bimodal.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

120 Q4201083 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Analista Administrativo ...

A média diária de pacotes vendidos foi inferior a 28.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

101: **C**	102: **C**	103: **E**	104: **E**	105: **D**	106: **E**	107: **D**	108: **D**	109: **D**	110: **A**
111: **A**	112: **A**	113: **A**	114: **C**	115: **B**	116: **E**	117: **C**	118: **A**	119: **E**	120: **C**