121 Q4201084 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Analista Administrativo ...

Durante 30 dias, Sebastião anotou a quantidade de pacotes de pipoca vendidos por dia. Assim: em 6 dias, vendeu 20 pacotes por dia; em 8 dias, vendeu 25 pacotes por dia; em 10 dias, vendeu 30 pacotes por dia; e, em 6 dias, vendeu 35 pacotes por dia.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

A mediana da quantidade diária de pacotes vendidos foi igual a 25.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

122 Q4202294 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Caxias do Sul - RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Caxias do Sul - RS - Auditor Fiscal da Receita Municipal - Bloco 1

No âmbito da Administração Tributária, um auditor pretende avaliar a relação entre o valor declarado pelos contribuintes e o valor efetivamente apurado em fiscalização, utilizando um modelo estatístico para verificar se existe associação linear entre essas variáveis. Sobre esse modelo, assinale a alternativa correta.

- (A) O método busca descrever a relação entre uma variável resposta e uma única variável explicativa, produzindo uma equação capaz de estimar valores esperados da primeira a partir de valores observados da segunda.
- (B) Sua aplicação pressupõe correlação linear perfeita entre as variáveis, circunstância em que as diferenças entre valores observados e estimados se anulam.
- (C) O coeficiente angular da reta obtida expressa exclusivamente a intensidade da associação entre as variáveis, sem indicar a variação esperada da variável resposta.
- (D) A identificação de associação estatística entre duas variáveis permite concluir, por si só, que existe relação de causa e efeito entre elas.

123 Q4202529 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Caxias do Sul - RS **Provas:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Caxias do Sul - RS - Técnico em Contabilidade **...**

Uma biblioteca registrou o número de livros emprestados durante uma semana. Com base nos dados apresentados na tabela abaixo, é correto afirmar que:

Segunda	18
Terça	22
Quarta	15
Quinta	25
Sexta	20

(A) A média diária de empréstimos foi inferior a 19 livros.

(B) Em mais de dois dias da semana foram emprestados pelo menos 20 livros.

(C) A diferença entre o maior e o menor número de empréstimos foi de 8 livros.

(D) O total de livros emprestados na semana foi 95.

124 Q4202710 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Prefeitura de Porto Velho - RO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Prefeitura de Porto Velho - RO - Auditor Fiscal da Receita Municipal - Conhecimentos Gerais

A fim de estimar a receita mensal arrecadada em sanções fiscais aplicadas pelo órgão de fiscalização e controle de certo estado (*Y*, em milhares de reais) com base no número de fiscalizações realizadas no mês (*X*), um agente de arrecadação ajustou um modelo de regressão linear simples com a equação $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$.

A partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta.

(A) O coeficiente angular (β_1) indica o impacto marginal, ou seja, o aumento médio esperado na arrecadação das sanções do órgão de fiscalização e controle (*Y*) para cada nova fiscalização (*X*) inserida na pauta.

(B) A variável *X* atua como a variável dependente do modelo, pois a quantidade de fiscalizações mensais é determinada e dependente da receita de arrecadação (*Y*).

(C) O intercepto (β_0) representa o teto máximo de arrecadação de sanções que o órgão consegue recolher no mês, independentemente de quantas fiscalizações ocorram.

(D) O coeficiente angular (β_1) estabelece uma garantia determinística: se $\beta_1 = 5$, uma nova fiscalização resultará rigorosamente na emissão de R$ 5 mil em sanções, sem nenhuma oscilação.

(E) O termo de erro (ε) sinaliza falhas na contabilização das multas pelo sistema financeiro, indicando que a base de dados do órgão de fiscalização e controle não é confiável para a auditoria.

125 Q4205409 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Câmara de Holambra - SP **Prova:** Avança SP - 2026 - Câmara de Holambra - SP - Contador

Carolina e Júlio são pesquisadores em um laboratório de análises ambientais. Durante a conferência dos resultados de um experimento, Carolina informou que a média aritmética de um conjunto com 64 medições era igual a 37. Pouco depois, ela percebeu que o teste realizado deveria conter apenas 63 medições e que, portanto, uma medição havia sido incluída indevidamente, embora a média calculada para as 64 medições estivesse correta. Júlio foi orientado a remover essa medição excedente e recalcular a nova média simples. Se a nova média, agora considerando apenas as 63 medições corretas, passou a ser 35, qual foi o valor da medição retirada? Assinale a alternativa correta:

Ⓐ 194,5

Ⓑ 163

Ⓒ 100

Ⓓ 75

Ⓔ 68,5

126 Q4206855 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Nova Candelária - RS **Provas:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Nova Candelária - RS - Assistente Social **...**

Um auditor tributário da prefeitura analisou os valores de 15 declarações de imposto sobre serviços, em milhares de reais, referentes a um determinado mês. Os valores, após ordenados, são:
12, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 48 Com base nesses dados, qual é o valor da mediana, em milhares de reais?

Ⓐ 27.

Ⓑ 30.

Ⓒ 33.

Ⓓ 35.

127 Q4208378 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CPCON **Órgão:** Prefeitura de Zabelê - PB **Provas:** CPCON - 2026 - Prefeitura de Zabelê - PB - Assistente Social ...

Dado o conjunto A = {6, 6, 7, 9, 10}. Considere o que acontece, caso:
I- substitua-se o primeiro elemento do conjunto por 7. O valor da média permanece o mesmo. II- substitua-se o quarto e o quinto elementos do conjunto por 8 e 11, respectivamente. Os valores da mediana, média e moda permanecem os mesmos. III- substitua-se o quinto elemento do conjunto por 8. Os valores da mediana e da moda permanecem os mesmos. IV- substitua-se o segundo e o quarto elementos do conjunto por 8. O valor da média permanece o mesmo. É CORRETO o que se afirma apenas em:

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) I e III.

(D) I e IV.

(E) II e IV.

128 Q4210720 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares R2 e R2 ajustado do modelo , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** Instituto Consulplan - 2026 - Prefeitura de Vitória - ES - Analista em Gestão Pública - Estatístico

Considere, hipoteticamente, que a Prefeitura Municipal de Vitória está avaliando fatores associados à redução do tempo médio de atendimento ao cidadão nos postos presenciais de serviços administrativos. Para isso, um analista de dados da secretaria de gestão pública ajustou um modelo de regressão linear múltipla, utilizando informações de 12 regionais administrativas do município. A variável dependente considerada foi Y = redução média no tempo de atendimento (em minutos). As variáveis independentes foram: X1 = investimento em digitalização de processos (em dezenas de milhares de reais); e X2 = número médio de horas de capacitação dos servidores. O modelo foi ajustado pelo método dos mínimos quadrados ordinários, produzindo os seguintes resultados:
• Estimativa do intercepto do modelo = 4,5; • Estimativa do coeficiente de X1 = 1,6; • Estimativa do coeficiente de X2 = 0,25; • Soma de quadrados da regressão = 540,0; • Soma de quadrados dos resíduos = 60,0; e • Valor-p do teste F da ANOVA = 0,003. Com base nessas informações, assinale a afirmativa INCORRETA.

(A) O coeficiente de determinação ajustado é igual a 0,90.

(B) O modelo de regressão é estatisticamente significativo ao nível de 3% de significância.

(C) Se X_1 e X_2 aumentarem, respectivamente, em 5 e 4 unidades, estima-se que a redução média do tempo de atendimento aumentará em 9 minutos.

(D) Mantendo X_2 constante, estima-se que um aumento de uma unidade em X1 está associado a um aumento de 1,6 minuto na redução média do tempo de atendimento.

129 Q4210731 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** Instituto Consulplan - 2026 - Prefeitura de Vitória - ES - Analista em Gestão Pública - Estatístico

Determinada prefeitura está avaliando o padrão de gastos mensais com materiais de expediente em duas secretarias administrativas distintas. Para isso, um analista de controle interno selecionou amostras de cinco setores de cada secretaria, obtendo os seguintes gastos mensais (em centenas de reais):
• Secretaria A: 12, 21, 18, 24, 15; e • Secretaria B: 14, 16, 22, 20, 18.
Com base nos dados apresentados, analise as afirmativas a seguir. I. As duas secretarias apresentam a mesma média e mesma mediana de gastos mensais. II. A variância amostral dos gastos da Secretaria A é maior que a da Secretaria B. III. A distribuição dos gastos da Secretaria A apresenta maior dispersão relativa em torno da média do que a distribuição da Secretaria B. IV. A distribuição dos gastos mensais é simétrica em torno da média nas duas secretarias. Está correto o que se afirma em

(A) I, II, III e IV.

(B) I e IV, apenas.


(C) II e III, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

130 Q4211144 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Demografia

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** Instituto Consulplan - 2026 - Prefeitura de Vitória - ES - Analista em Gestão Pública - Economista

Os gráficos contextualizam as questão. Analise-os atentamente.



Considerando as informações que podem ser extraídas dos gráficos, assinale a afirmativa INCORRETA.

(A) A taxa de escolarização apresentou melhoria no período avaliado, mantendo-se superior a 99%.

(B) Desde 2008, o número médio de filhos tido por mulheres brasileiras em idade fértil é inferior a 2.

(C) A taxa de desemprego apresentou constantes decréscimos em todos os trimestres do período considerado.

(D) A taxa de analfabetismo apresentou melhoria no período considerado, mantendo-se abaixo de 5,5% desde 2023.

131 Q4220480 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Westfália - RS **Prova:** OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Westfália - RS - Professor de Educação Básica - Matemática

De acordo com as informações consolidadas pelo Inmet na última segunda-feira de 2025, estas foram as temperaturas mais altas registradas no Brasil nesse dia:

- 1º - Aragarças (GO) - 39.2ºC
- 2º - Pão de Açúcar (AL)- 39.2ºC
- 2º - Três Rios (RJ) - 39.2 ºC
- 4º - Barra (BA) - 38.9ºC
- 5º - Coronel Pacheco (MG) - 38.7ºC
- 5º - Marilândia (ES) - 38.7ºC
- 5º - Piranhas (AL) - 38.7ºC
- 8º - Ibotirama (BA) - 38.6ºC
- 9º - Araçuaí (MG) - 38.5ºC
- 10º - Cambuci (RJ) - 38.3ºC

A partir da análise dessa série estatística, verifica-se a existência de dois valores modais. Com base nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta o valor absoluto da diferença entre esses valores modais.

(A) 1/2
(B) 1/3
(C) 1/4
(D) 1/5

132 Q4341849 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAFIPA **Órgão:** Prefeitura de Colombo - PR **Prova:** FAFIPA - 2026 - Prefeitura de Colombo - PR - Professor

O comitê organizador de uma Copa do Mundo realizou um levantamento do número de gols marcados por uma seleção em suas últimas 5 partidas oficiais. Os dados coletados foram:
Jogo A: 1 gol Jogo B: 4 gols Jogo C: 2 gols Jogo D: 1 gol Jogo E: 7 gols Com base nessa série de dados, o valor da média, da moda e da mediana de gols dessa seleção são, respectivamente:

(A) 3,0 ; 1,0 ; 2,0.
(B) 1,5 ; 3,0 ; 2,0.
(C) 3,0 ; 1,0 ; 1,0.
(D) 1,0 ; 3,0 ; 2,0.
(E) 5,0 ; 1,0 ; 2,0.

133 Q4103400 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Dona Emma - SC **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Dona Emma - SC - Monitor de Transporte Escolar ...

Em uma análise de gastos mensais com combustível, os valores foram: R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.800 e R$ 2.300. Para entender o quanto o valor mais frequente se afasta do valor médio equilibrado dos gastos realizados pela frota de veículos públicos no período de cinco meses analisado, qual é a diferença entre a média aritmética e a moda desse conjunto de valores?

(A) R$ 350,00.

(B) R$ 400,00.

(C) R$ 380,00.

(D) R$ 420,00.

134 Q4106021 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Mato Leitão - RS **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Mato Leitão - RS - Técnico em Enfermagem 20H ...

As notas de uma turma em um treinamento interno foram distribuídas da seguinte forma: 4 alunos tiraram 10, 6 alunos tiraram 8 e 10 alunos tiraram 5. Assim, qual é a média ponderada das notas dessa turma, considerando que o número de alunos em cada faixa de nota atua como o peso para o cálculo do desempenho global do grupo submetido à capacitação profissional?

(A) 7,2.

(B) 6,9.

(C) 7,5.

(D) 7,0.

135 Q4106225 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Dona Emma - SC **Prova:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Dona Emma - SC - Engenheiro Civil

Durante a elaboração de um modelo de regressão para avaliação de imóveis urbanos em determinada região do município, foram identificadas amostras com comportamento discrepante em relação ao conjunto principal de dados, influenciando signif icativamente os valores ajustados do modelo estatístico utilizado no laudo avaliatório. Com relação à identificação de pontos influenciantes (*outliers*) em modelos estatísticos aplicados à avaliação de imóveis urbanos, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Pontos influenciantes podem ser identificados por gráf icos de resíduos em relação às variáveis independentes ou aos valores ajustados do modelo.

(B) A estatística de Cook é utilizada para avaliação da dispersão global das amostras imobiliárias em torno da reta de regressão.

(C) A distância de Mahalanobis é aplicada à dispersão residual do modelo avaliatório apos o ajuste final da regressão.

(D) Observações influentes alteram a dispersão residual, sem modificar os coeficientes ajustados do modelo.

136 Q4106351 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Mato Leitão - RS **Prova:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Mato Leitão - RS - Técnico em Enfermagem 40H

Um relatório de monitoramento ambiental apresenta o registro dos seguintes valores coletados por sensores em campo: 2, 4, 4,6, 8, 10, 12. Se o valor extremo 20 for incluído posteriormente como um novo dado de leitura neste conjunto específico, qual será o impacto observado no valor que divide essa série de dados ao meio, em comparação com o resultado obtido antes da inserção dessa nova variável?

(A) Aumentará de 6 para 7.

(B) Permanecerá em 6.

(C) Aumentará de 6 para 8.

(D) Diminuirá em 5.

137 Q4121438 Estatística > Inferência estatística , Intervalos de confiança , Testes de hipóteses Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Tremembé - SP **Prova:** VUNESP - 2026 - Prefeitura de Tremembé - SP - Médico do Trabalho

Em um estudo epidemiológico conduzido com trabalha dores expostos a solventes orgânicos, avaliou-se a associação entre tempo de exposição e redução da velocidade de condução nervosa. A análise estatística apresentou valor de p = 0,04 para o coeficiente de regressão linear, e o intervalo de confiança de 95% para a diferença média entre expostos e não expostos variou de –2,1 a –0,3 ms.

Considerando esses achados, assinale a alternativa correta.

(A) O valor de p indica a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira, estimada em 4% nesse estudo.

(B) O intervalo de confiança não inclui o valor nulo, indicando significância estatística ao nível de 5%.

(C) O valor de *p* inferior a 0,05 permite inferir relevância clínica da associação observada.

(D) A amplitude do intervalo de confiança indica elevada precisão da estimativa e magnitude expressiva do efeito.

(E) A presença de valores negativos no intervalo de confiança indica efeito protetor da exposição sobre o desfecho avaliado.

138 Q4121716 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** PM-SP **Prova:** VUNESP - 2026 - PM-SP - 2º Tenente Médico PM Estagiário (Especialidade: Medicina do Trabalho)

Ao analisar dados de absenteísmo por doenças osteomusculares em uma unidade, o médico do trabalho calcula a média aritmética do número de afastamentos por trabalhador em determinado período. No contexto da análise estatística, as medidas de tendência central são utilizadas para

(A) sintetizar um conjunto de dados por meio de um valor representativo, indicando o comportamento típico da distribuição, embora sua representatividade possa ser comprometida em distribuições assimétricas ou na presença de valores extremos, situação em que a mediana pode ser mais adequada.

(B) expressar o grau de variabilidade dos dados em torno de um valor médio, permitindo avaliar a heterogeneidade da distribuição, especialmente quando se utiliza o coeficiente de variação para comparar conjuntos com escalas diferentes.

(C) descrever a relação entre duas variáveis quantitativas, indicando a direção e a intensidade da associação entre elas, podendo ser aplicadas tanto em análises paramétricas (Pearson) quanto não paramétricas (Spearman), independentemente da distribuição dos dados.

(D) inferir relações causais entre exposição ocupacional e ocorrência de agravos à saúde, utilizando-se de modelos de regressão linear ou logística que assumem a normalidade dos resíduos para validade dos testes de hipótese.

(E) estimar valores populacionais a partir de dados amostrais, considerando a variabilidade e o erro amostral envolvidos, sendo fundamentais para o cálculo de intervalos de confiança e para a determinação do tamanho amostral em estudos epidemiológicos.

---

139 Q4123551 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Fundação La Salle **Órgão:** Prefeitura de Esteio - RS **Provas:** Fundação La Salle - 2026 - Prefeitura de Esteio - RS - Bibliotecário - Manhã **...**

Em uma eleição municipal, o número de votos recebidos por um candidato em 9 seções eleitorais foi registrado, em ordem crescente, conforme a lista abaixo:
120, 150, 150, 180, 200, 200, 200, 220, 300 Com base nesses dados, analise as afirmativas: I. A média de votos por seção é igual a 200. II. A mediana do número de votos é 200. III. A moda é 200. Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas I está correta.

(B) Apenas II está correta.

(C) Apenas II e III estão corretas.

(D) Apenas I e III estão corretas.

(E) I, II e III estão corretas.