
261 Q269643 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2012 **Banca:** FAURGS **Órgão:** TJ-RS **Prova:** FAURGS - 2012 - TJ-RS - Analista Judiciário - Estatística

**Instrução:** A tabela abaixo apresenta a Distribuição Normal Padrão.

Distribuição Normal Padrão
$Z \sim N(0, 1)$
Corpo da tabela dá a probabilidade $p$, tal que $p = P(0 < Z < Z_c)$




| parte inteira e primeira decimal de $Z_c$ | Segunda decimal de $Z_c$ | | | | | | | | | | parte inteira e primeira decimal de $Z_c$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | p = 0 | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 00000 | 00399 | 00798 | 01197 | 01595 | 01994 | 02392 | 02790 | 03188 | 03586 | 0,0 |
| 0,1 | 03983 | 04380 | 04776 | 05172 | 05567 | 05962 | 06356 | 06749 | 07142 | 07535 | 0,1 |
| 0,2 | 07926 | 08317 | 08706 | 09095 | 09483 | 09871 | 10257 | 10642 | 11026 | 11409 | 0,2 |
| 0,3 | 11791 | 12172 | 12552 | 12930 | 13307 | 13683 | 14058 | 14431 | 14803 | 15173 | 0,3 |
| 0,4 | 15542 | 15910 | 16276 | 16640 | 17003 | 17364 | 17724 | 18082 | 18439 | 18793 | 0,4 |
| 0,5 | 19146 | 19497 | 19847 | 20194 | 20540 | 20884 | 21226 | 21566 | 21904 | 22240 | 0,5 |
| 0,6 | 22575 | 22907 | 23237 | 23565 | 23891 | 24215 | 24537 | 24857 | 25175 | 25490 | 0,6 |
| 0,7 | 25804 | 26115 | 26424 | 26730 | 27035 | 27337 | 27637 | 27935 | 28230 | 28524 | 0,7 |
| 0,8 | 28814 | 29103 | 29389 | 29673 | 29955 | 30234 | 30511 | 30785 | 31057 | 31327 | 0,8 |
| 0,9 | 31594 | 31859 | 32121 | 32381 | 32639 | 32894 | 33147 | 33398 | 33646 | 33891 | 0,9 |
| 1,0 | 34134 | 34375 | 34614 | 34850 | 35083 | 35314 | 35543 | 35769 | 35993 | 36214 | 1,0 |
| 1,1 | 36433 | 36650 | 36864 | 37076 | 37286 | 37493 | 37698 | 37900 | 38100 | 38298 | 1,1 |
| 1,2 | 38493 | 38686 | 38877 | 39065 | 39251 | 39435 | 39617 | 39796 | 39973 | 40147 | 1,2 |
| 1,3 | 40320 | 40490 | 40658 | 40824 | 40988 | 41149 | 41309 | 41466 | 41621 | 41774 | 1,3 |
| 1,4 | 41924 | 42073 | 42220 | 42364 | 42507 | 42647 | 42786 | 42922 | 43056 | 43189 | 1,4 |
| 1,5 | 43319 | 43448 | 43574 | 43699 | 43822 | 43943 | 44062 | 44179 | 44295 | 44408 | 1,5 |
| 1,6 | 44520 | 44630 | 44738 | 44845 | 44950 | 45053 | 45154 | 45254 | 45352 | 45449 | 1,6 |
| 1,7 | 45543 | 45637 | 45728 | 45818 | 45907 | 45994 | 46080 | 46164 | 46246 | 46327 | 1,7 |
| 1,8 | 46407 | 46485 | 46562 | 46638 | 46712 | 46784 | 46856 | 46926 | 46995 | 47062 | 1,8 |
| 1,9 | 47128 | 47193 | 47257 | 47320 | 47381 | 47441 | 47500 | 47558 | 47615 | 47670 | 1,9 |
| 2,0 | 47725 | 47778 | 47831 | 47882 | 47932 | 47982 | 48030 | 48077 | 48124 | 48169 | 2,0 |
| 2,1 | 48214 | 48257 | 48300 | 48341 | 48382 | 48422 | 48461 | 48500 | 48537 | 48574 | 2,1 |
| 2,2 | 48610 | 48645 | 48679 | 48713 | 48745 | 48778 | 48809 | 48840 | 48870 | 48899 | 2,2 |
| 2,3 | 48928 | 48956 | 48983 | 49010 | 49036 | 49061 | 49086 | 49111 | 49134 | 49158 | 2,3 |
| 2,4 | 49180 | 49202 | 49224 | 49245 | 49266 | 49286 | 49305 | 49324 | 49343 | 49361 | 2,4 |
| 2,5 | 49379 | 49396 | 49413 | 49430 | 49446 | 49461 | 49477 | 49492 | 49506 | 49520 | 2,5 |
| 2,6 | 49534 | 49547 | 49560 | 49573 | 49585 | 49598 | 49609 | 49621 | 49632 | 49643 | 2,6 |
| 2,7 | 49653 | 49664 | 49674 | 49683 | 49693 | 49702 | 49711 | 49720 | 49728 | 49736 | 2,7 |
| 2,8 | 49744 | 49752 | 49760 | 49767 | 49774 | 49781 | 49788 | 49795 | 49801 | 49807 | 2,8 |
| 2,9 | 49813 | 49819 | 49825 | 49831 | 49836 | 49841 | 49846 | 49851 | 49856 | 49861 | 2,9 |
| 3,0 | 49865 | 49869 | 49874 | 49878 | 49882 | 49886 | 49889 | 49893 | 49897 | 49900 | 3,0 |
| 3,1 | 49903 | 49906 | 49910 | 49913 | 49916 | 49918 | 49921 | 49924 | 49926 | 49929 | 3,1 |
| 3,2 | 49931 | 49934 | 49936 | 49938 | 49940 | 49942 | 49944 | 49946 | 49948 | 49950 | 3,2 |
| 3,3 | 49952 | 49953 | 49955 | 49957 | 49958 | 49960 | 49961 | 49962 | 49964 | 49965 | 3,3 |
| 3,4 | 49966 | 49968 | 49969 | 49970 | 49971 | 49972 | 49973 | 49974 | 49975 | 49976 | 3,4 |
| 3,5 | 49977 | 49978 | 49978 | 49979 | 49980 | 49981 | 49981 | 49982 | 49983 | 49983 | 3,5 |
| 3,6 | 49984 | 49985 | 49985 | 49986 | 49986 | 49987 | 49987 | 49988 | 49988 | 49989 | 3,6 |
| 3,7 | 49989 | 49990 | 49990 | 49990 | 49991 | 49991 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 3,7 |
| 3,8 | 49993 | 49993 | 49993 | 49994 | 49994 | 49994 | 49994 | 49995 | 49995 | 49995 | 3,8 |
| 3,9 | 49995 | 49995 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49997 | 49997 | 3,9 |
| 4,0 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49998 | 49998 | 49998 | 49998 | 4,0 |
| 4,5 | 49999 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 4,5 |

Considere a seguinte variável aleatória: número de chamadas telefônicas a cobrar realizadas em um departamento de denúncias por dia útil. Essa variável é denotada por X e tem distribuição conhecida, conforme dados a seguir. W representa a despesa diária dessas chamadas. Cada chamada custa R$ 0,25.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(X=x) | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |

Considerando VAR(X)=0,81, o valor esperado de W e a variância de W para esse tipo de chamada no departamento em questão são de, respectivamente,

(A) R$ 0,325 e R$ 0,81.

(B) R$ 0,325 e R$ 0,0506.

(C) R$ 1,5 e R$ 0,81.

(D) R$ 1,3 e R$ 0,81.

(E) R$ 1,3 e R$ 0,0506.

262 Q269658 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2012 **Banca:** FAURGS **Órgão:** TJ-RS **Prova:** FAURGS - 2012 - TJ-RS - Analista Judiciário - Estatística

Em relação aos objetivos e suposições do Teste Não Paramétrico de amostras pareadas de Wilcoxon, no qual a diferença para cada par *i* é dada por $D=X_i - Y_i$ , considere a hipótese nula $H_0:\eta_D=0$, onde $\eta_D$ é a diferença de medianas de X e Y na população. Considerando a estatística T como a soma dos *ranks* entre as diferenças, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta.

(A) No teste pareado Wilcoxon, se as diferenças dos *ranks* são positivas e negativas com igual frequência, a estatística T tende a estar próxima de zero e o teste conduz à rejeição da hipótese nula.

(B) Para a hipótese nula de $H0:\eta_D=0$, quando a amostra aleatória de *n* diferenças é selecionada de uma população simétrica, pode-se realizar uma estatística $Z^* = (T/\sigma_T)$ que segue uma distribuição Normal padrão quando *n* é suficientemente grande.

(C) Como suposição do teste Wilcoxon, as diferenças na população são contínuas e assimétricas.

(D) O teste Wilcoxon pode ser aplicado somente para hipóteses alternativas unilaterais.

(E) O teste dos Sinais é mais poderoso que o teste Wilcoxon por considerar, também, a ordem das diferenças entre pares de amostras.

263 Q291580 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2012 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** EPE **Prova:** CESGRANRIO - 2012 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Planejamento da Geração de Energia

Uma distribuição de frequência incompleta é apresentada na tabela a seguir.

| Classes | Frequência absoluta | Frequência relativa | Frequência relativa acumulada |
|---|---|---|---|
| de 55 a 75 | 30 | 0,15 | |
| de 75 a 125 | | | y |
| de 125 a 200 | 100 | | |
| | x | | |

Os valores de x e y são, respectivamente, iguais a

(A) 130 e 0%

(B) 130 e 10%

(C) 150 e 35%

(D) 200 e 35%

(E) 200 e 50%

264 Q2214161 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2012 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** MPE-MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Estatistica

Num estudo para avaliação do grau de satisfação com a vida pessoal de trabalhadores de uma empresa, uma amostra aleatória de n=50 trabalhadores foi selecionada. Cada trabalhador foi convidado a responder um questionário sendo suas respostas finais convertidas num valor numérico que representava o grau de satisfação com sua vida pessoal (na escala de 0 a 100). Quanto maior o valor numérico, maior é o grau de satisfação do trabalhador. Os valores numéricos dos coeficientes de assimetria e curtose amostrais foram respectivamente iguais a: -3,35 e 14,24. Esses valores indicam que a distribuição amostral do grau de satisfação dos trabalhadores é

(A) assimétrica à direita e leptocúrtica
(B) assimétrica à direita e platocúrtica
(C) assimétrica à esquerda e leptocúrtica
(D) assimétrica à esquerda e platocúrtica

265 Q284405 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

**Ano:** 2012 **Banca:** ESAF **Órgão:** MI **Prova:** ESAF - 2012 - MI - Estatístico

Pelo valor do quociente entre o momento centrado de terceira ordem e o cubo do desvio padrão da distribuição de frequências apresentada na Questão 11, pode-se concluir que a distribuição

(A) é mesocúrtica.
(B) é simétrica.
(C) possui assimetria negativa.
(D) possui assimetria positiva.
(E) é leptocúrtica.

266 Q284435 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2012 **Banca:** ESAF **Órgão:** MDIC **Prova:** ESAF - 2012 - MDIC - Analista de Comércio Exterior - Prova 2 - Grupo 5

Considere os N valores da variável *x* que formam uma população finita e sejam $\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$ e $\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2$ seu momento de primeira ordem e momento de segunda ordem, centrado na média, respectivamente. Dessa maneira, a expressão $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left((x_i-\mu)/\sigma\right)^3$ seria uma medida de qual característica da distribuição de x ?

(A) Posição.
(B) Dispersão.
(C) Assimetria.
(D) Normalidade.
(E) Curtose.

267 Q232784 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2012 **Banca:** FCC **Órgão:** TRE-SP **Prova:** FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Estatística

Uma variável aleatória U tem distribuição uniforme contínua no intervalo [a, 3a]. Sabe-se que U tem média 12. Uma amostra aleatória simples de tamanho n, com reposição, é selecionada da distribuição de U e sabe-se que a variância da média dessa amostra é 0,1. Nessas condições, o valor de n é

(A) 80.

(B) 100.

(C) 120.

(D) 140.

(E) 150.

268 Q232798 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2012 **Banca:** FCC **Órgão:** TRE-SP **Prova:** FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Estatística

A função de distribuição empírica $F_{40}(x)$ abaixo corresponde a uma pesquisa realizada em 40 domicílios de uma região, em que x é o número de eleitores verificado no domicílio.

$$F_{40}(x) = \begin{cases} 0{,}00 \text{ se } x < 0 \\ 0{,}15 \text{ se } 0 \le x < 1 \\ 0{,}35 \text{ se } 1 \le x < 2 \\ 0{,}60 \text{ se } 2 \le x < 3 \\ 0{,}80 \text{ se } 3 \le x < 4 \\ 1{,}00 \text{ se } x \ge 4 \end{cases}$$

O número de domicílios em que se verificou possuir, pelo meno, 1 eleitor e no máximo 3 eleitores é

(A) 34.

(B) 32

(C) 28.


(D) 26.

(E) 24.

269 Q232799 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2012 **Banca:** FCC **Órgão:** TRE-SP **Prova:** FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Estatística

Para analisar a distribuição da renda familiar mensal de dois grupos 1 e 2, considere o desenho esquemático abaixo que apresenta a distribuição das respectivas rendas em cada grupo.




QuestoesdeConcursos.com.br

Com relação aos diagramas dos dois grupos, verifica-se que

(A) a distância interquartil do Grupo 1 é igual à distância interquartil do Grupo 2.

(B) o menor valor apresentado pelo Grupo 1 coincide com o menor valor apresentado pelo Grupo 2.

(C) ambas as distribuições são simétricas.

(D) a amplitude total correspondente aos salários do Grupo 1 supera a amplitude total correspondente aos salários do Grupo 2.

(E) o módulo da diferença entre as medianas dos 2 grupos corresponde a um valor inferior a 25% do valor da mediana do Grupo 2.

270 Q223625 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2012 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** TSE **Prova:** CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

A variável X apresenta as seguintes observações X = {6; 4; 6; 4; 3; 8; 7; 9; 2; 6}. Assim, o desvio-padrão dessas observações é 6,67. Pelo segundo coeficiente de assimetria de Pearson (o que compara média e mediana), o coeficiente de assimetria é

(A) 0,075.

(B) – 0,075.

(C) – 0,225.

(D) – 1,245.

271 Q213968 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2011 **Banca:** FCC **Órgão:** TCE-PR **Prova:** FCC - 2011 - TCE-PR - Analista de Controle - Atuarial

A função de distribuição acumulada da variável aleatória X é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ x^2, & \text{se } 0 < x < 1 \\ 1, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

O valor da diferença entre a média de X e o quadrado da mediana de X é

(A) 1.

(B) $\frac{2}{3}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{1}{3}$.

(E) $\frac{1}{6}$.

272 Q265883 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** AL-CE **Prova:** CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística

| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frequência absoluta | 80 | 47 | 30 | 20 | 6 | 1 |

Um levantamento foi realizado para se avaliar, por município, a quantidade X de obras que estão sob suspeita de irregularidade. Com base em uma amostra de municípios, foi obtida a distribuição de frequências mostrada na tabela acima. Com base nessas informações, julgue o item.

A distribuição da quantidade X apresenta assimetria à direita (ou positiva).

◯ Certo

◯ Errado

273 Q201495 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EBC **Prova:** CESPE - 2011 - EBC - Analista - Administração

| classes | receitas (em R$ ) | quantidade de empresas |
|---|---|---|
| 1 | 0 – 200.000 | 1.100 |
| 2 | 200.001 – 400.000 | 900 |
| 3 | 400.001 – 600.000 | 550 |
| 4 | 600.001 – 800.000 | 300 |
| 5 | 800.001 – 1.000.000 | 150 |

Com base nos dados do quadro acima, em que se demonstra adistribuição de frequência das receitas de todas as empresas de umacidade, julgue os itens a seguir.

A frequência acumulada relativa das empresas que estão nas classes de 1 a 3 é de 85%.

◯ Certo

◯ Errado

274 Q224296 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

**Ano:** 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EBC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - EBC - Analista - Estatística

**cálculo do IDH**

| | uma vida longa e sadia | conhecimento | | nível decente de vida |
|---|---|---|---|---|
| indicadores elementares | **esperança de vida ao nascer** $I_{esp} = \frac{x - 25}{60}$ | **taxa de alfabetização de adultos** (pessoas de 15 anos ou mais) $I_{alf} = \frac{x}{100}$ | **taxa bruta de escolarização** (taxa bruta de matrículas nos três níveis de ensino: fundamental, médio e superior em relação à população de 7 a 22 anos) $I_{esc} = \frac{x}{100}$ | PIB percapita em paridade com o poder de compra |
| índice | $I_{esp} = \frac{x - 25}{60}$ | $I_{ee} = \frac{2}{3} I_{alf} + \frac{1}{3} I_{esc}$ | | $I_{pib} = \frac{\log x - \log 100}{\log 40 - \log 100}$ |
| IDH | $IDH = \frac{1}{3} I_{esp} + \frac{1}{3} I_{ee} + \frac{1}{3} I_{pib}$ | | | |

Internet: <www.rededosaber.sp.gov.br>.

QuestoesdeConcursos.com.br

O quadro acima mostra a forma de cálculo do índice de desenvolvimento humano (IDH) divulgado periodicamente pelo PNUD. O índiceé calculado para cada país participante, e os 169 países participantes são agrupados em quatro categorias de desenvolvimento humano.Um país estará no grupo muito elevado se o seu IDH estiver no quartil superior; no grupo elevado, se o seu IDH estiver nos percentis51–75; no grupo médio, se o seu IDH estiver nos percentis 26–50; e no grupo baixo, se o seu IDH estiver no quartil inferior. Com basenessas informações, julgue o próximo item.

O IDH pode ser utilizado em análises longitudinais.

◯ Certo

◯ Errado

275 Q224297 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

**Ano:** 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EBC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - EBC - Analista - Estatística

O IDH atribui pesos distintos para as dimensões renda, educação e expectativa de vida.

◯ Certo

◯ Errado

276 Q224298 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

**Ano:** 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EBC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - EBC - Analista - Estatística

Considerando que em 2010 o Brasil obteve o septuagésimo terceiro maior índice, é correto afirmar que nesse ano o Brasil foi classificado no grupo elevado.

◯ Certo

◯ Errado

277 Q2876229 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2011 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2011 - Petrobras - Estatístico Júnior - 2011

O coeficiente de curtose de uma variável aleatória X, com média μ e desvio padrão σ, é

Obs.: E(θ) é a esperança da variável θ.

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

278 Q2876230 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2011 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2011 - Petrobras - Estatístico Júnior - 2011

X e Y são variáveis aleatórias com função de densidade conjunta: $f(x, y) = k(y^2 + x)$, $0 < x < 1 - y^2$, $-1 < y < 1$, sendo k uma constante a ser determinada. O valor de k é

Ⓐ 1/8

Ⓑ 3/4

Ⓒ 3/8

Ⓓ 5/4

Ⓔ 5/8

279 Q2876236 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2011 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2011 - Petrobras - Estatístico Júnior - 2011

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas, com funções de densidade marginais $f_X(x)$ e $f_Y(y)$, respectivamente, e função de densidade conjunta $f_{X,Y}(x,y)$.

As variáveis X e Y são independentes se

(A) $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y)$

(B) $f_{X,Y}(x,y) = 0$

(C) $E(XY) = E(X)E(Y)$

(D) X e Y têm distribuições normais

(E) a correlação entre X e Y é igual a zero

280 Q3002392 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2011 **Banca:** VUNESP **Órgão:** SEDUC-SP **Prova:** VUNESP - 2011 - SEDUC-SP - Executivo Público

Uma escola distribuiu um questionário para avaliar um professor. A avaliação é classificada como excelente (E), Boa (B), Regular (R) e Fraca (F). As respostas dos quarenta questionários respondidos estão na tabela seguinte:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | E | E | B | R | B | E | E | B | E |
| B | E | F | R | E | F | R | E | B | E |
| E | R | B | E | E | F | B | E | B | E |
| E | B | B | B | E | E | E | B | R | B |

Após efetuar a respectiva distribuição de frequências, pode- -se afirmar que

(A) mais de 90% dos alunos classificaram o professor como excelente ou bom.

(B) apenas 3% classificaram-no como fraco.

(C) 20% classificaram-no como fraco ou regular.

(D) 10% classificaram-no como regular.

(E) mais de 60% classificaram-no como excelente.

**Respostas**

261: **B** 262: **B** 263: **E** 264: **C** 265: **D** 266: **C** 267: **C** 268: **D** 269: **E** 270: **C**

271: **E** 272: **C** 273: **C** 274: **C** 275: **E** 276: **C** 277: **E** 278: **D** 279: **A** 280: **C**