321 Q113202 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** COSEAC **Órgão:** DATAPREV **Prova:** COSEAC - 2009 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Informações

Se X_1 tem distribuição N(17,9) e X_2 tem distribuição N(34,16), sendo X_1 e X_2 e independentes, determine $\sigma(X_1+X_2)$.

(A) 12;
(B) 25;
(C) 5;
(D) 18;
(E) 51.

322 Q148818 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SERPRO **Provas:** CESPE - 2008 - SERPRO - Técnico - Segurança do Trabalho ...

A tabela de freqüências do número *X* diário de falhas registradas na versão beta de um sistema operacional é mostrada abaixo.

X	freqüência absoluta
0	60
1	100
2	80
3	50
4 ou mais	10
total	**300**

QuestoesdeConcursos.com.br

Com base nessa tabela, julgue os itens a seguir.

Em 2% dos dias de observação, não foram registradas falhas na versão beta do sistema operacional.

◯ Certo
◯ Errado

323 Q160566 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose , Amostragem Amostragem aleatória simples

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 5ª Região (BA) **Prova:** CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística

De uma amostra aleatória simples de 20 trabalhadores da construção civil, foram obtidos os seguintes valores daremuneração mensal, em salários-mínimos:1, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1.Considerando essas informações, julgue os próximos itens.

O coeficiente de assimetria é igual ou superior a zero.

◯ Certo


◯ Errado

324 Q212119 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2008 **Banca:** FGV **Órgão:** Senado Federal **Prova:** FGV - 2008 - Senado Federal - Estatístico

A figura a seguir representa o diagrama de dispersão de dez pontos (X_i,Y_i) e a reta de regressão ajustada pelo método de mínimos quadrados dada por Y = 0,42 + 2,45X . Quanto ao ponto de coordenadas X=8 e Y=8, pode-se afirmar que ele:

QuestoesdeConcursos.com.br



Ⓐ é o ponto com maior desvio da reta de regressão.

Ⓑ é um ponto influente nessa regressão.

Ⓒ é um dado legítimo que indica a relação linear entre X e Y.

Ⓓ indica que o modelo é provavelmente heterocedástico.

Ⓔ é uma observação incorreta que deve ser eliminada da análise.

325 Q364098 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Principais distribuições de probabilidade

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INPE **Prova:** CESPE - 2008 - INPE - Tecnologista Pleno - TS08

Com base em amostragens históricas, aplicáveis a modelos de longo prazo que cobrem previsões em um horizonte temporal grande, os analistas inferem distribuições que possibilitam uma generalização maior sobre os dados. Em relação a variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade, julgue os itens a seguir.
Distribuições tais como a triangular e uniforme são utilizadas com frequências e estimativas de impacto objetivas.


◯ Certo

◯ Errado

326 Q50890 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2008 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CAPES **Prova:** CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Assistente em Ciência e Tecnologia

Para responder às questões de nos 47 a 49, utilize os dados do gráfico a seguir, relativos à Avaliação Trienal dos cursos e programas de pós-graduação realizada pela Capes em 2007.



QuestoesdeConcursos.com.br

O número total de programas, na área, avaliados pela Capes foi

Ⓐ 7.

Ⓑ 17.

Ⓒ 20.

Ⓓ 49.

Ⓔ 68.

327 Q213829 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2008 **Banca:** UNEMAT **Órgão:** SEFAZ-MT **Prova:** UNEMAT - 2008 - SEFAZ- MT - Agente de Tributos - Estaduais

Os elementos fundamentais de séries estatísticas são “fato”, “local” e “época”. Aplicando corretamente estes elementos, é solicitado apresentar a arrecadação de ICMS dos municípios X, Y e K de Mato Grosso, referente ao mês de abril de 2008.
Esta apresentação é classificada como série estatística:

(A) Histórica
(B) Geográfica
(C) Específica
(D) Heterógrada
(E) Fatorial

328 Q2957781 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2008 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CAPES **Prova:** CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Analista - Biblioteconomia

Em estatística, quando dispomos de uma tabela primitiva ou de um rol, precisamos estabelecer a quantidade e o intervalo das classes que vamos criar, pois, de outro modo a distribuição de freqüência pode não ser útil para a análise. Uma das maneiras de determinar o número de classes é usar a(o)

(A) porcentagem.
(B) Regra de Sturges.
(C) amplitude amostral.
(D) desvio padrão
(E) ponto médio de uma classe.

329 Q50505 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-DFT **Prova:** CESPE - 2008 - TJ-DFT - Analista Judiciário - Área Administrativa

QuestoesdeConcursos.com.br

nota	freqüência
0	2
1	10
2	20
3	47
4	46
total	**125**

A tabela acima apresenta a distribuição de freqüência absolutadas notas dadas por 125 usuários de um serviço público, em umaavaliação da qualidade do atendimento. Considerando essasinformações, julgue os próximos itens.

A média, a moda e a mediana dos valores apresentados na tabela são superiores a 2,8 e inferiores a 3,3.

◯ Certo

◯ Errado

330 Q54411 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSS **Prova:** CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais

As aproximações para o sinistro agregado em determinada apólice incluem a normal. Acerca desse tipo de aproximação, julgue o item abaixo.
A aproximação normal não costuma ser muito precisa na aproximação do sinistro agregado, já que possui coeficiente de assimetria diferente de zero.

◯ Certo

◯ Errado

331 Q409122 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSS **Prova:** CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Estatística

	50% mais pobres	40% intermediários	10% mais ricos	índice de Gini
março/2002	10,11%	40,77%	49,12%	0,633
julho/2002	9,95%	39,78%	50,28%	0,639
julho/2003	11,03%	41,43%	47,53%	0,615
julho/2004	11,62%	40,73%	47,65%	0,609
julho/2005	12,17%	40,67%	47,17%	0,601
junho/2006	12,20%	40,91%	46,89%	0,600

Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O mercado de trabalho brasileiro promoveu nos últimos quatro anos uma melhor distribuição de renda. Entre março de 2002 e junho de 2006, a participação dos 50% trabalhadores mais pobres na renda do país passou de 10,11% para 12,20%, enquanto a fatia de 10% dos trabalhadores mais ricos caiu de 49,12% para 46,89% no mesmo período. Com isso o índice de Gini recuou de 0,633 para 0,600 (quadro acima). No período de 2002 a 2006, embora ainda ganhem 23 vezes menos que os abastados, foram os trabalhadores mais pobres que tiveram melhor ganho de renda. Entre 2002 e 2006, 50% dos trabalhadores mais pobres viram sua renda média crescer 29,5%, de R$ 59,49 para R$ 77,03, enquanto que 10% dos trabalhadores mais ricos tiveram apenas 1,18% de ganho, de R$ 1.775,23 para R$ 1.796,23. No mesmo período, 40% trabalhadores intermediários (a conhecida classe média) tiveram 7,75% de ganho, de R$ 342,16 para R$ 368,69. **Correio Braziliense**, 23/8/2006, p. 14 (com adaptações).

Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue o item que se segue.
O índice de Gini é uma razão sobre a curva de Lorenz que mede o grau de assimetria na distribuição de renda da população. Esse índice varia de zero a infinito, e quanto mais próximo de zero estiver o índice, menor será o grau de assimetria da distribuição de renda dos trabalhadores.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

332 Q1402273 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Prefeitura de Rio Branco - AC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Técnico em Gestão Pública

número diário de usuários	freqüência absoluta (dias)
	50
	50
82	200
83	150
	50
total	**500**

Considerando a tabela acima, que apresenta a distribuição do número diário de usuários de um restaurante comunitário em um período de 500 dias de funcionamento, julgue o próximo item.

<<07PMRB060100I1397F_C\C19_76>>O número médio de usuários por dia é superior a 82.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

333 Q1402274 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Prefeitura de Rio Branco - AC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Técnico em Gestão Pública

número diário de usuários	freqüência absoluta (dias)
	50
	50
82	200
83	150
	50
total	**500**

Considerando a tabela acima, que apresenta a distribuição do número diário de usuários de um restaurante comunitário em um período de 500 dias de funcionamento, julgue o próximo item.

<<07PMRB060100I2397F_C\C19_77>>A mediana da distribuição do número diário de usuários é igual a 82.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

334 Q1402275 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Prefeitura de Rio Branco - AC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Técnico em Gestão Pública

número diário de usuários	freqüência absoluta (dias)
	50
	50
82	200
83	150
	50
total	**500**

Considerando a tabela acima, que apresenta a distribuição do número diário de usuários de um restaurante comunitário em um período de 500 dias de funcionamento, julgue o próximo item.

A variância amostral do número diário de usuários é superior a 1,4.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

335 Q1402276 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Prefeitura de Rio Branco - AC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Técnico em Gestão Pública

número diário de usuários	freqüência absoluta (dias)
	50
	50
82	200
83	150
	50
total	**500**

Considerando a tabela acima, que apresenta a distribuição do número diário de usuários de um restaurante comunitário em um período de 500 dias de funcionamento, julgue o próximo item.

A moda da distribuição do número diário de usuários é igual a 200.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

336 Q1402277 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Prefeitura de Rio Branco - AC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Técnico em Gestão Pública

número diário de usuários	freqüência absoluta (dias)
	50
	50
82	200
83	150
	50
total	**500**

Considerando a tabela acima, que apresenta a distribuição do número diário de usuários de um restaurante comunitário em um período de 500 dias de funcionamento, julgue o próximo item.

<<07PMRB060100I5397F_C\C19_80>>Em 80% dos 500 dias de funcionamento do restaurante, a quantidade de usuários por dia foi igual ou superior a 82.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

337 Q2883201 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - Petrobras - Enfermeiro

Com relação aos métodos de coleta de dados, tabulação e análise, entre outros parâmetros, objetos de estudo da bioestatística, julgue os itens seguintes.

Considere-se que, em um estudo sobre agravos à saúde dos trabalhadores de uma empresa, tenham sido identificados, em determinado ano, 10 casos de tendinite no mês de janeiro, 15 em fevereiro e 20 em março. Essa representação numérica é denominada freqüência absoluta.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

338 Q57667 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** FCC **Órgão:** MPU **Prova:** FCC - 2007 - MPU - Analista de Documentação - Estatística

Instruções: Para responder às questões de números 47 a 49,
considere o enunciado a seguir.A tabela de dupla entrada abaixo apresenta a distribuiçãoconjunta das freqüências relativas a X e Y, onde:X = preço, em reais, do produto X.Y = preço em reais, do produto Y.

X \ Y	2	3	4
1	0,2	0,1	0,1
2	0	0,1	0,1
3	0,3	0	0,1

QuestoesdeConcursos.com.br

Para fabricação de uma peça Z são utilizadas os produtos X e Y e está sendo analisada a viabilidade econômica desta peça. Se esta peça utiliza 3 unidades de X, e 5 unidades de Y, o custo médio de Z é

(A) 11 reais.
(B) 12 reais.
(C) 15,5 reais.
(D) 20 reais.
(E) 22 reais.

339 Q57668 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2007 **Banca:** FCC **Órgão:** MPU **Prova:** FCC - 2007 - MPU - Analista de Documentação - Estatística

A proporção de vezes em que o valor de Y supera o de X é

(A) 0,3
(B) 0,6
(C) 0,7
(D) 0,8
(E) 0,9

340 Q2219836 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

Considere as estatísticas a seguir, em que $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ seja uma amostra aleatória simples de uma população com média zero e com momentos centrais finitos.

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{k=1}^{n} Y_k}{n}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n} (Y_k - \bar{Y})^2}{n-1}}$$

Q_2 = mediana($Y_1, Y_2, ..., Y_n$);

$$M_3 = \frac{\sum_{k=1}^{n} (Y_k - \bar{Y})^3}{n\sigma^3}$$

$$M_4 = \frac{\sum_{k=1}^{n} (Y_k - \bar{Y})^4}{n\sigma^4}$$

$$T_1 = \frac{\bar{Y} - Q_2}{S}$$

$$H_1 = \frac{\sum_{k=1}^{n} sen\, Y_k}{n}$$

A quantidade de estatísticas entre as apresentadas acima, que medem o grau de assimetria é igual a

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

Respostas

321: **C** 322: **E** 323: **C** 324: **B** 325: **E** 326: **D** 327: **B** 328: **B** 329: **C** 330: **E**

331: **E** 332: **C** 333: **C** 334: **E** 335: **E** 336: **C** 337: **C** 338: **D** 339: **C** 340: **D**