41 Q3888976 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Assimetria negativa indica que a distribuição possui maior concentração de valores à esquerda e uma cauda mais longa que se estende para a direita.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

42 Q3888978 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Com base no referencial teórico das medidas descritivas de curtose, julgue o item subsequente.

Curtose alta indica apenas um pico mais elevado, não estando relacionada às caudas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

43 Q3888988 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Considerando que a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua *X* seja dada por

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot x^6, & \text{se } |x| \leq 1, \\ 0, & \text{se } |x| > 1, \end{cases}$$

em que *C* é a constante normalizadora,

julgue o item a seguir.

*X* possui assimetria nula.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

44 Q4219665 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2026 **Banca:** Grupo TALENT **Órgão:** Câmara de Luz - MG **Prova:** Grupo TALENT - 2026 - Câmara de Luz - MG - Secretário Parlamentar

A partir dos dados apresentados, analise a tabela abaixo, que mostra a distribuição de proposições apresentadas e aprovadas na Câmara Municipal de Luz durante o ano de 2025:

| Tipo de Proposição | Apresentadas | Aprovadas |
|---|---|---|
| Projetos de Lei Ordinária | 48 | 36 |
| Projetos de Lei Complementar | 6 | 4 |
| Projetos de Resolução | 15 | 12 |
| Requerimentos | 92 | 88 |
| Indicações | 120 | 115 |

Com base na tabela, assinale a alternativa correta:

A) A taxa de aprovação de projetos de lei complementar é superior à taxa de aprovação de projetos de lei ordinária.

B) O tipo de proposição com maior número absoluto de rejeições é o de projetos de lei ordinária.

C) A taxa de aprovação geral de todas as proposições combinadas é superior a 92%.

D) A diferença entre a taxa de aprovação de requerimentos e a de indicações é superior a 3 pontos percentuais.

45 Q3683267 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2025 **Banca:** FUNATEC **Órgão:** Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras - MA **Prova:** FUNATEC - 2025 - Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras - MA - Professor de Matemática

Em uma tabela de distribuição de frequências, a frequência relativa representa:

A) O valor máximo encontrado na amostra.

B) A quantidade de vezes que um valor aparece no conjunto de dados.

C) A proporção ou percentual que uma frequência absoluta representa em relação ao total.

D) O intervalo entre o maior e o menor valor.

46 Q4260467 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2025 **Banca:** UFGD **Órgão:** UFGD **Provas:** UFGD - 2025 - UFGD - Engenheiro - Área: Equipamentos - Edital nº 19 ...

Observe os dados da tabela apresentada e analise as distribuições dos estudantes adultos das cinco regiões imediatas da Região Intermediária de Dourados (IBGE, 2017) por cor/etnia e níveis de instrução.

TABELA: **Estudantes adultos da Região Intermediária de Dourados, por nível de ensio cor/etnia, 2022**

| Região Imediata | Cor/Etnia * | Número de Estudantes | Estudantes (%) | Ensino fundamental (%) | Ensino médio (%) | Ensino Superior (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dourados** | **Total** | **36344** | **100.00** | **18.79** | **23.73** | **57.48** |
| | **Branca** | 17981 | 49.47 | 7.16 | 10.13 | 32.20 |
| | **Negra** | 16466 | 45.30 | 9.53 | 11.44 | 24.34 |
| | **Indígena** | 1896 | 5.22 | 2.12 | 2.16 | 0.95 |
| **Naviraí - Mundo Novo** | **Total** | **6768** | **100.00** | **15.90** | **22.55** | **61.56** |
| | **Branca** | 3049 | 45.05 | 4.89 | 8.20 | 31.96 |
| | **Negra** | 3443 | 50.87 | 10.04 | 12.36 | 28.48 |
| | **Indígena** | 276 | 4.08 | 0.97 | 1.98 | 1.13 |
| **Nova Andradina** | **Total** | **5632** | **100.00** | **14.24** | **24.66** | **61.11** |
| | **Branca** | 2384 | 42.33 | 5.57 | 8.03 | 28.74 |
| | **Negra** | 3245 | 57.62 | 8.70 | 16.56 | 32.38 |
| | **Indígena** | 3 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| **Ponta Porã** | **Total** | **11356** | **100.00** | **15.80** | **28.22** | **55.99** |
| | **Branca** | 5746 | 50.60 | 6.49 | 13.85 | 30.24 |
| | **Negra** | 5454 | 48.03 | 8.64 | 13.85 | 25.54 |
| | **Indígena** | 156 | 1.37 | 0.66 | 0.53 | 0.18 |
| **Amambai** | **Total** | **5007** | **100.00** | **31.47** | **24.91** | **43.61** |
| | **Branca** | 2043 | 40.80 | 9.69 | 7.01 | 24.13 |
| | **Negra** | 1823 | 36.41 | 14.71 | 8.53 | 13.21 |
| | **Indígena** | 1141 | 22.79 | 7.09 | 9.39 | 6.29 |

* A quantidade populacional de cor/etnia branca expressa a soma das populações amarela e branca e a quantidade de pessoas negras expressa a soma das populações pretas e pardas, respectivamente.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao.html>. Acesso em: 18 jul. 2025 (adaptado).

Assinale a alternativa correta.

(A) As quantidades totais de estudantes das regiões imediatas expressam os tamanhos das populações municipais. As maiores proporções de estudantes das populações indígenas estão no ensino básico e da população negra da região de Amambai, no ensino fundamental, evidenciando uma das faces das desigualdades étnico-raciais.

(B) A distribuição das quantidades de estudantes adultos por regiões resulta do acesso e permanência nos diferentes níveis de ensino. As proporções por cor/etnia no ensino médio evidenciam a equidade no acesso, como se pode observar na região de Ponta Porã. No ensino superior, destacam-se as porcentagens das populações brancas.

(C) Os dados contribuem com estratégias para diminuir as desigualdades étnico-raciais na região, orientam o geomarketing de instituições de ensino e promovem o desenvolvimento regional. As proporções por cor/ etnia no ensino médio evidenciam a equidade no acesso, como se pode observar na região de NaviraíMundo Novo.


(D) A distribuição das quantidades totais de estudantes adultos está associada aos diferentes portes populacionais das cidades da região. A região imediata de Amambai se destaca ao contar com o maior número de estudantes indígenas em todos os níveis de ensino, como a maior proporção de estudantes universitários.

(E) A população negra tem a maior proporção no ensino superior da região de Nova Andradina, o que aponta para estratégias de acesso que promovem a inclusão sociocultural e econômica. Os dados contribuem com estratégias para diminuir as desigualdades étnico-raciais na região e promover o desenvolvimento regional.

47 Q3586050 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Em um estudo estatístico sobre o tempo médio de tramitação de processos judiciais em quatro varas cíveis de certo tribunal, considerou-se uma base de dados referentes ao tempo (em dias) de tramitação de 1.200 processos. A amostra foi estratificada por vara, e os dados foram tratados e analisados por meio de gráficos, tabelas e medidas descritivas, com o objetivo de identificar padrões, desvios e oportunidades de melhoria na gestão processual. A seguir, são apresentados diagramas *boxplots* elaborados para cada vara, bem como as medidas de tendência central, dispersão e curtose.




| medida | vara A | vara B | vara C | vara D |
|---|---|---|---|---|
| média | 50 | 44 | 64 | 64 |
| mediana | 50 | 40,5 | 68 | 60 |
| desvio padrão | 12 | 13,5 | 14,5 | 18,5 |
| curtose | −1,2 | 2,0 | 1,7 | 16,0 |

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A curtose negativa observada na vara A indica que a distribuição dos tempos de tramitação nessa vara é menos achatada do que uma distribuição normal, apresentando maior concentração em torno da média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

48 Q3586051 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Na vara B, o fato de a média ser superior à mediana, associado à curtose positiva, sugere que a distribuição dos tempos de tramitação possui cauda mais pesada à sua esquerda.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

49 Q3586053 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Apesar de apresentarem médias iguais, as varas C e D diferem quanto à forma da distribuição: a curtose bastante elevada na vara D reflete a presença de pontos exteriores indicados no seu diagrama *boxplot*.


◯ Certo

◯ Errado

50 Q3417023 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SUSEP **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - SUSEP - Analista Técnico: - Área: Contabilidade Pública •••

Para organizar relatórios estatísticos acerca do comportamento de sinistros de determinado ramo de seguros, um consultor analisou uma base de dados com os valores de 100 indenizações pagas por uma seguradora no último ano, cujo histograma é representado a seguir.




Considerando que, no histograma apresentado, os dados estão agrupados em intervalos de classe, julgue o item que se segue, a respeito da distribuição das indenizações pagas.

O histograma apresenta uma distribuição com assimetria negativa, já que há maior concentração de valores à esquerda da mediana dessa distribuição.


◯ Certo

◯ Errado

51 Q3241698 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

**Ano:** 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Campinas - SP **Provas:** VUNESP - 2025 - Prefeitura de Campinas - SP - Agente de Apoio à Saúde - Farmácia **...**

O gráfico a seguir representa a distribuição das respostas dadas a uma pergunta, sendo que cada respondente escolheu apenas uma das alternativas, A, B ou C.




Sabendo que o setor correspondente à resposta C tem um ângulo central de 60º, pode-se concluir corretamente que o número total de respondentes à pergunta foi igual a

(A) 278.
(B) 280.
(C) 276.
(D) 274.
(E) 272.

52 Q3261472 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Amostragem , Definições de Amostragem em Estatística

**Ano:** 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Planejamento e Controle de Produção

As ferramentas estatísticas são essenciais para o controle da produção, permitindo monitorar e melhorar processos industriais por meio da coleta, análise e interpretação de dados. Técnicas como gráficos de controle, análise de variabilidade e métodos de amostragem ajudam a identificar desvios, prevenir defeitos e garantir a qualidade do produto final, além de contribuir para a redução de custos e aumento da eficiência. Acerca das ferramentas estatísticas, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1.Gráfico de controle. 2.Histograma. 3.Diagrama de causa e efeito. 4. Amostragem estatística. 5. Capacidade do processo (Índice Cp). ( ) Ferramenta utilizada para identificar causas potenciais de problemas em um processo. ( ) Método que mede a capacidade de um processo em produzir dentro de limites especificados. ( ) Representação gráfica que ilustra a distribuição de frequências de um conjunto de dados. ( ) Técnica que permite monitorar a estabilidade de um processo ao longo do tempo. ( ) Método para coletar dados representativos de um processo ou lote, reduzindo custos de inspeção. A sequência está correta em

Ⓐ 1, 3, 4, 5, 2.
Ⓑ 3, 2, 1, 4, 5.
Ⓒ 3, 5, 2, 1, 4.
Ⓓ 4, 5, 3, 1, 2.

53 Q3262711 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2025 **Banca:** SELECON **Órgão:** HEMOMINAS **Prova:** SELECON - 2025 - HEMOMINAS - Analista de Hematologia e Hemoterapia - MEDHH - Nível III - Grau A - Médico Patologista

A distribuição de frequência é uma ferramenta estatística básica usada para organizar dados em categorias ou intervalos, facilitando a visualização de padrões ou tendências. Ela pode ser apresentada em tabelas ou gráficos, permitindo uma análise clara da frequência com que os valores ocorrem em um conjunto de dados. Em uma distribuição de frequência, representa a frequência relativa:

Ⓐ o intervalo com maior número de ocorrências
Ⓑ a soma acumulada de todas as frequências até certo ponto
Ⓒ a proporção ou porcentagem de observações em relação ao total
Ⓓ o número total de observações em cada intervalo

54 Q3262712 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** SELECON **Órgão:** HEMOMINAS **Prova:** SELECON - 2025 - HEMOMINAS - Analista de Hematologia e Hemoterapia - MEDHH - Nível III - Grau A - Médico Patologista

Em análises laboratoriais, os pesquisadores frequentemente lidam com dados que não seguem uma distribuição normal, sendo muitas vezes assimétricos. A medida de tendência central mais adequada para representar dados laboratoriais altamente assimétricos é:

(A) média

(B) moda


(C) mediana

(D) desvio padrão

55 Q3265988 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Demografia

**Ano:** 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA **Prova:** FGV - 2025 - Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA - Auditor Ambiental

O gráfico abaixo mostra a pirâmide etária da população brasileira obtida a partir do Censo de 2022.




Fonte: IBGE

Com base nas informações apresentadas no gráfico, assinale a afirmativa correta.

(A) A maioria da população está entre 35 e 39 anos.

(B) Mais de 50% da população possui até 39 anos.

(C) A população até 29 anos é formada, predominantemente, por mulheres.

(D) Na faixa etária de 80 a 84 anos existem mais homens que mulheres.

(E) Na faixa etária até 4 anos de idade existem mais mulheres que homens.

56 Q3281646 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** FCC **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Prova:** FCC - 2025 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Tecnologia da Informação e Comunicação

Um Analista de TI da prefeitura está avaliando os seguintes dados referentes às consultas realizadas nos postos de saúde do município ao longo de um ano:
- Média: 350 consultas por mês - Mediana: 300 consultas por mês - Desvio padrão: 80 consultas - Coeficiente de variação (CV): 22,86% Com base nesses valores,

(A) o coeficiente de variação indica que os dados possuem altíssima variabilidade em relação à média.

(B) a mediana maior que a média indica uma distribuição assimétrica negativa (cauda longa à esquerda).

(C) o desvio padrão sozinho é suficiente para interpretar de forma completa a dispersão dos dados em relação à média.

(D) o coeficiente de variação sugere que a variabilidade dos dados é baixa em relação à média.

(E) a diferença entre a média e a mediana é irrelevante na análise exploratória de dados.

57 Q3287017 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista – Área: Gestão da Informação – Subárea: Engenharia de Dados

Acerca de conceitos de estatística descritiva e de inferência estatística, julgue o item a seguir.

Em uma distribuição com cauda à direita, a maior parte dos valores se concentra à esquerda do gráfico, enquanto valores maiores e mais raros se estendem à direita.

◯ Certo

◯ Errado

58 Q3217179 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Principais distribuições de probabilidade Distribuição Normal

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANM **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - ANM - Especialista em Recursos Minerais - Especialidade: Qualquer Área de Formação (Suporte à Gestão, Estratégia e Governança)

Uma empresa de mineração de ferro está analisando os dados coletados durante suas operações para melhorar os processos de extração e beneficiamento. O conjunto de dados inclui as seguintes variáveis:

• teor_de_ferro: percentual de ferro presente em amostras do minério.

• toneladas_extraidas: quantidade de minério extraída por turno.

Durante o estudo, foi utilizada a técnica de categorização de dados e, mais especificamente, a discretização de dados. Além disso, os conjuntos de dados presentes nas tabelas 22A6-I e 22A6-II, a seguir, serão utilizados como input de algoritmos de aprendizagem de máquina. Na tabela 22A6-I, as variáveis quantidade de minério e profundidade são dadas em toneladas e em metros, respectivamente, e, na tabela 22A6-II, as variáveis temperatura e precipitação são dadas em graus Celsius e em milímetros, respectivamente.

**Tabela 22A6-I**

| mina | quantidade de minério | profundidade |
|---|---|---|
| A | 1.500 | 200 |
| B | 4.000 | 350 |
| C | 2.800 | 500 |
| D | 3.600 | 300 |
| E | 1.200 | 150 |
| F | 10.000 | 100 |
| G | 10.000 | 100 |
| H | 10.000 | 100 |

**Tabela 22A6-II**

| dia | temperatura | precipitação |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 |
| 2 | 22 | 12 |
| 3 | 21 | 8 |
| 4 | 19 | 6 |
| 5 | 23 | 5 |

A partir da situação hipotética precedente, julgue o próximo item.

Quanto à normalização estatística, na tabela 22A6-I, as variáveis quantidade de minério e profundidade devem ser normalizadas. Já na tabela 22A6-II, não há necessidade de se normalizar as variáveis temperatura e precipitação.

◯ Certo

◯ Errado

59 Q3150495 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Na análise de dados, a curtose é definida para medir:

(A) a dispersão dos dados em torno da média, sendo mais sensível a outliers do que a variância.
(B) o grau de achatamento ou pico de uma distribuição, ajudando a identificar caudas pesadas.
(C) a assimetria da distribuição dos dados em torno da mediana.
(D) a relação entre os quartis superior e inferior de um conjunto de dados.

60 Q3150499 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Qual das alternativas a seguir descreve corretamente a função de uma tabela de frequência?

(A) Organizar dados numéricos ou categóricos mostrando o número de vezes que cada valor ou categoria aparece.
(B) Calcular a média e a mediana dos dados e apresenta-os em forma tabular.
(C) Organizar dados apenas qualitativos em ordem alfabética, ou em forma ordinal quando possível.
(D) Calcular a variância e o desvio padrão de um conjunto de dados através de fórmulas tabulares.

**Respostas**

41: **E** 42: **E** 43: **C** 44: **B** 45: **C** 46: **A** 47: **E** 48: **E** 49: **C** 50: **E** 51: **C** 52: **C**

53: **C** 54: **C** 55: **B** 56: **D** 57: **C** 58: **C** 59: **B** 60: **A**