61 Q3150503 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

O coeficiente de assimetria é uma medida importante em Estatística Descritiva. Dentre as opções a seguir, qual melhor representa como ele é calculado e o seu significado?

A O coeficiente de assimetria é calculado como a razão entre o desvio padrão e a média, representando a dispersão dos dados em torno da média.

B O coeficiente de assimetria é calculado utilizando a terceira potência das diferenças entre os valores e a média, dividido pelo desvio padrão ao cubo, e indica a simetria ou assimetria da distribuição dos dados em relação à média.

C O coeficiente de assimetria é calculado como a média dividida pela variância, representando a uniformidade dos dados.

D O coeficiente de assimetria é calculado usando a mediana e a moda dos dados, e representa o grau de achatamento da distribuição.

62 Q3152263 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Unesc **Órgão:** Prefeitura de Maracajá - SC **Prova:** Unesc - 2025 - Prefeitura de Maracajá - SC - Biólogo

Na avaliação dos dados em bioestatística existem as medidas de tendência central que indicam um ponto, em torno do qual, se distribuem ou concentram os números do conjunto de dados, este que tende a estar localizado no centro da distribuição dos dados.
Fonte: DE MEDEIROS, Henrique Rocha; ZAROS, Lilian Giotto. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Natal: EDUFRN, 2011. Dentre as medidas de tendência central, uma delas refere-se ao valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados, denominada:

A mediana.

B média.

C moda.

D mediatriz.

63 Q3154012 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** SEFAZ-RS **Prova:** FGV - 2025 - SEFAZ-RS - Auditor do Estado (Manhã)

Os dados a seguir representam a quantidade de produtos vendidos por 30 vendedores em uma loja, organizados em classes.

Produtos Vendidos	1–10	11–20	21–30	31–40	41–50
Frequência Absoluta (fi)	3	8	12	4	3

A frequência relativa acumulada até a classe 31–40 é igual a

(A) 13,33%.

(B) 75,00%.

(C) 80,00%.

(D) 85,00%.

(E) 90,00%.

64 Q3162150 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2025 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2025 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação / Área: Ciência de Dados

Durante a votação para escolher o mascote oficial de uma faculdade, o centro acadêmico resolveu fazer uma pesquisa com os 200 alunos cadastrados, perguntando qual mascote eles preferiam: o Tigre, o Lobo ou a Águia. Após reunir os resultados, constatou-se que 58 alunos escolheram o Tigre, 42 optaram pelo Lobo, 100 votaram na Águia. Com base nesses dados, qual a frequência absoluta e relativa do mascote Lobo, respectivamente?

(A) 21 e 22%

(B) 41 e 22%

(C) 42 e 21%

(D) 42 e 42%

65 Q3166237 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item a seguir, considerando que, em certo tribunal regional, a duração de 1.000 processos encerrados nos últimos dois anos variou entre dois e sessenta meses, com quartis, para os dados levantados, iguais a 12, 18 e 24 meses.

O coeficiente quartílico de assimetria é igual a zero.

◯ Certo

◯ Errado

66 Q3166239 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Duzentos cidadãos foram entrevistados para avaliarem o grau de satisfação por certo serviço público. Nessa pesquisa, cada entrevistado atribuiu uma nota entre zero e 5, em que zero e 5 expressam, respectivamente, o menor e o maior grau de satisfação por esse serviço, sendo a frequência absoluta das notas apresentada na tabela a seguir.

nota	frequência absoluta
0	20
1	20
2	30
3	30
4	40
5	60

Com base nesse conjunto de dados, julgue o seguinte item.

Para esse caso em particular, a curtose representa uma medida que poderia indicar quão próximos os dados se encontram da hipótese de normalidade.

◯ Certo

◯ Errado

67 Q3166241 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Com base nesse conjunto de dados, julgue o seguinte item.

Esse conjunto de dados apresenta assimetria positiva.

◯ Certo

◯ Errado

68 Q3176672 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** SELECON **Órgão:** SENAPPEN **Prova:** SELECON - 2025 - SENAPPEN - Analista Técnico em Economia

Chamamos de distribuição de frequência assimétrica quando:

Ⓐ a “cauda” do gráfico se alonga mais em um dos lados

Ⓑ o “centro” do gráfico se alonga mais em um dos lados

Ⓒ a “base” do gráfico se achata

Ⓓ o “vértice” do gráfico se projeta para um dos lados

69 Q3112484 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item a seguir, considerando as técnicas empregadas em resumos de dados levantados de uma população. Ao se agrupar os dados de uma variável quantitativa contínua por faixas (classes) de valores para se construir uma tabela de frequências, a perda de informação será tanto maior quanto maior for o número de classes escolhidas.


◯ Certo

◯ Errado

70 Q3112489 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Dispondo de uma série de estatísticas de ordem $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{20}$, um analista calculou a mediana m_e da série e os números $u_i = m_e - x_i$ e $v_i = x_{(21-i)} - m_e$, para $i = 1, 2, \ldots, 10$. A partir desses números, o analista plotou os pares ordenados (u_i, v_i) em um plano cartesiano, obtendo o gráfico a seguir.



Com relação à situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente. O gráfico permite inferir que há uma assimetria à direita na distribuição dos dados.


◯ Certo

◯ Errado

71 Q3112490 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Dispondo de uma série de estatísticas de ordem $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{20}$, um analista calculou a mediana m_e da série e os números $u_i = m_e - x_i$ e $v_i = x_{(21-i)} - m_e$, para $i = 1, 2, \ldots, 10$. A partir desses números, o analista plotou os pares ordenados (u_i, v_i) em um plano cartesiano, obtendo o gráfico a seguir.




Com relação à situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente. As informações fornecidas permitem concluir que a média da série é maior que a sua mediana.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

72 Q3223613 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Dados

Considere o seguinte histograma, que se refere à medição de HDL (“colesterol bom”) em amostras de sangue, em mg/dL (miligramas por decilitro), de um grupo de pacientes. Cada paciente corresponde a uma única amostra de sangue.



O número total de pacientes representados nesse histograma é igual a

Ⓐ 6

Ⓑ 12

Ⓒ 18

Ⓓ 36

Ⓔ 70

73 Q3223614 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Dados

Um histograma bimodal é caracterizado pelo(a)

Ⓐ aparecimento de dois picos.

Ⓑ existência de exatamente duas classes.

Ⓒ existência de pelo menos duas classes.


Ⓓ fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2.

Ⓔ fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

74 Q3253943 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** IBAM **Órgão:** Prefeitura de Guarulhos - SP **Prova:** IBAM - 2024 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Técnico (a) de Saúde - Necrópsia

No curso de Design Gráfico de um colégio técnico estão matriculadas no período noturno 60 pessoas sendo 28 mulheres e 32 homens, e as frequências desses alunos em uma determinada semana do mês de outubro estão representadas no gráfico de colunas a seguir.



Como podemos observar, no topo de cada coluna desse gráfico está informado o número de alunos presentes naquele referido dia da semana, identificando a quantidade de mulheres e homens presentes naquele dia. Analisando a distribuição dos alunos presentes no curso conforme apresentado no gráfico, podemos concluir como verdadeira qual das afirmações a seguir:

Ⓐ Em todos os dias da semana o número de mulheres presentes foi inferior ao número de homens.

Ⓑ A maior presença de alunos ocorreu na segunda-feira e foi superior em 11 pessoas em relação ao número de presentes no dia em que ocorreu a menor frequência.

Ⓒ Em todos os dias da semana o número de homens presentes foi superior ao número de mulheres.

Ⓓ O dia em que menos alunos compareceram no curso foi registrado a presença de 53 pessoas.

Ⓔ No dia em que ocorreu o maior número de alunos presentes, registrou-se 60 pessoas.

75 Q3192602 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Paraty - RJ **Prova:** Avança SP - 2024 - Prefeitura de Paraty - RJ - Professor de Educação Básica II - Matemática

Observe a tabela abaixo que mostra os dados das frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamento de uma empresa:

Classe de salários	Frequência n_i	Porcentagem $100f_i$
4,00 ⊢ 8,00	10	27,78
8,00 ⊢ 12,00	12	33,33
12,00 ⊢ 16,00	8	22,22
16,00 ⊢ 20,00	5	13,89
20,00 ⊢ 24,00	1	2,78
Total	36	100,00

Fonte: Adaptado de BUSSAB & MORETIN. Estatística Básica. Editora Atual.

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a distribuição:

(A) Não possui qualquer assimetria, logo a média, mediana e moda são iguais.
(B) Possui assimetria à esquerda (negativa), logo a média é menor que a mediana que é menor que a moda.
(C) Possui assimetria à esquerda (negativa), logo a média é maior que a mediana que é maior que a moda.
(D) Possui assimetria à direita (positiva), logo a média é menor que a mediana que é menor que a moda.
(E) Possui assimetria à direita (positiva), logo a média é maior que a mediana que é maior que a moda.

76 Q3104065 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Administrativa

Em relação à estatística descritiva e à análise exploratória de dados, julgue o seguinte item.

Considere um conjunto de dados referentes à escolaridade de 100 servidores, distribuídos da seguinte forma: 30 têm ensino médio completo, 50 têm graduação completa e 20 têm pós-graduação completa. Nesse caso, para representar a distribuição de frequência desses dados, é correto o uso de um diagrama de caixa (*box-plot*).

◯ Certo
◯ Errado

77 Q3190072 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** IVIN **Órgão:** Prefeitura de Bragança - PA **Prova:** IVIN - 2024 - Prefeitura de Bragança - PA - Estatístico

Com relação à curtose, podemos afirmar, exceto que:

(A) A curtose é a medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade.

(B) A curtose é ilimitada superiormente e inferiormente.

(C) Se o valor da curtose for zero, então tem o mesmo achatamento que a distribuição normal, essa função é classificada como mesocúrtica.

(D) Se o valor da curtose é maior que zero ou três, então a distribuição em questão é mais alta e concentrada, essa função é classificada como leptocúrtica.

(E) Se o valor da curtose é igual a três, então a função de distribuição é mais achatada que a distribuição normal, essa distribuição é classificada como platicúrtica.

78 Q3259431 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Meio AMbiente / Desenvolvimento Regional / Socioeconomia)

A distribuição de frequência abaixo representa o percentual de consumidores por faixa de consumo de uma cidade com apenas 2000 consumidores.

Consumo em KWh	0 |--- 100	100 |--- 200	200 |--- 400	400 |---| 800
Percentual de Consumidores	60	25	15	10

Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o grau de assimetria e a curva de achatamento da distribuição dos consumidores são, respectivamente,

(A) assimétrica positiva e leptocúrtica.

(B) assimétrica positiva e platicúrtica.

(C) assimétrica positiva e mesocúrtica.

(D) assimétrica negativa e leptocúrtica.

(E) assimétrica negativa e platicúrtica.

79 Q3259432

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Meio AMbiente / Desenvolvimento Regional / Socioeconomia)

O diretor de certa empresa do setor energético verificou que a média mensal do consumo de gás diminuiu 25% de um ano A para o ano A + 1. Dessa forma, sobre a variabilidade do consumo de gás no ano A + 1, é correto afirmar que

(A) a variância diminui 25%
(B) a variância aumenta 50%
(C) O desvio-padrão reduz 50%
(D) O desvio-padrão aumenta 25%
(E) Não há alteração na variabilidade

80 Q3261645

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Petróleo - Abastecimento)

Em uma cidade com 1.764.835 eleitores registrados, haverá 2º turno para as eleições municipais.
A tabela a seguir, apresenta as intenções de voto da amostra de eleitores consultados.

Intenções de voto	Número de eleitores
Candidato A	1.715
Candidato B	691
Indecisos	141
Brancos ou nulos	103

As frequências relativas para os candidatos A e B e a soma das frequências de indecisos e brancos e nulos são, respectivamente,

(A) 0,64%, 0,26% e 3,9%.
(B) 64,7%, 26,1% e 9,2%.
(C) 17,5%, 6,91%, e 2,44%.
(D) 0,01%, 0,04% e 0,01%.
(E) 6,47%, 2,61% e 0,92%.

Respostas

61: **B** 62: **C** 63: **E** 64: **C** 65: **C** 66: **E** 67: **E** 68: **A** 69: **E** 70: **C** 71: **C** 72: **D**

73: **A** 74: **B** 75: **E** 76: **E** 77: **E** 78: **A** 79: **E** 80: **B**