81 Q3261649 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Petróleo - Abastecimento)

Em uma empresa fornecedora de peças para a indústria de óleo e gás, foi realizada uma pesquisa com 150 funcionários, com levantamento de várias informações, como o tempo de serviço que o trabalhador tem no emprego atual.
Os resultados estão apresentados na tabela de frequências, a seguir.

Tempo (anos)	Frequência absoluta	Frequência relativa	%
1	45	d	h
2	48	e	i
3	a	f	20
4	b	g	j
5 ou mais	c	0,16	k
Total	**150**	**1**	**100**

A soma de h+i e o número de funcionários que está há pelo menos 3 anos no atual emprego são, respectivamente,

(A) 30% e 47.
(B) 62% e 57.
(C) 32% e 57.
(D) 62% e 47.
(E) 47% e 57.


82 Q2563766 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (*X*) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue o item que se segue. O histograma a seguir representa corretamente a distribuição de frequências da variável *X*.



◯ Certo

◯ Errado


83 Q2563767 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (*X*) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue o item que se segue.



O tamanho da amostra é igual a 1.010.

- ◯ Certo
- ◯ Errado


84 Q2563768 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue o item que se segue.



A média de X é inferior a 1.

- ◯ Certo
- ◯ Errado


85 Q2563769 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue o item que se segue.



A moda da variável X é igual a 4.

- ◯ Certo
- ◯ Errado


86 Q2563770 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (*X*) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue o item que se segue.



A mediana de *X* é igual a 2.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

87 Q2496461 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Um estatístico realizou uma análise exploratória de dados sobre o desempenho acadêmico dos alunos de uma instituição de ensino. Ele coletou informações sobre as notas de uma avaliação e construiu um histograma para visualizar a distribuição das notas. Após a construção, o profissional observou que a distribuição era simétrica e concentrada em torno da moda.
A medida descritiva utilizada para aferir o grau de achatamento da distribuição das notas é:

(A) assimetria;

(B) curtose;

(C) mediana;

(D) média;

(E) moda.

88 Q2496465 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Um pesquisador coletou dados sobre a idade de 1.000 pessoas em uma determinada região e organizou esses dados em uma série estatística. Ao analisar a série do tipo univariada, ele percebeu que a distribuição das idades era positivamente assimétrica.
Considerando essa informação, a afirmação correta é:

(A) a média das idades será maior que a mediana;

(B) a moda das idades poderá ser um valor com frequência igual a cinco;

(C) o intervalo interquartílico das idades será simétrico em torno da média;

(D) o terceiro quartil representa o terceiro dado ordenado crescentemente;

(E) o percentil 50 é equivalente à moda.

89 Q2554341 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** Banestes **Prova:** Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística

Analise as assertivas abaixo:
I. O grau de achatamento (ou afilamento) de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão (chamada curva normal padrão) denomina-se assimetria. II. A medida de curtose é maior do que a da distribuição normal. A curva é mais alta e mais fechada (ou mais afilada) que a curva da distribuição normalmente se denominaleptocúrtica. III. Mesocúrtica: a medida de curtos e é menor do que a da distribuição normal. A curva é mais aberta (ou mais achatada) que a curva da distribuição normal. Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas a afirmativa II que está correta.

(B) A afirmativa I e II estão corretas.

(C) A afirmativa I e III estão corretas.

(D) Todas estão corretas.

90 Q2456119 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** Qconcursos **Órgão:** Qconcursos **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - CNU - Bloco 7 - 2° Simulado

[Questão Inédita] Com base nos dados do quadro abaixo, em que se demonstra a distribuição de frequência das receitas de todas as empresas de uma cidade, julgue o item a seguir.

classes	receitas (em R$)	quantidade de empresas
1	0 – 200.000	1.100
2	200.001 – 400.000	900
3	400.001 – 600.000	550
4	600.001 – 800.000	300
5	800.001 – 1.000.000	150

A frequência acumulada relativa das empresas que estão nas classes de 1 a 3 é de:

(A) 66%

(B) 90%

(C) 25%

(D) 85%

(E) 97%

91 Q2456120 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** Qconcursos **Órgão:** Qconcursos **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - CNU - Bloco 7 - 2° Simulado

[Questão Inédita] A distribuição dos salários dos 1000 funcionários Umbrella, em número de salários-mínimos, está apresentada na tabela abaixo:

Faixa salarial (em número de salários mínimos)	Frequência Absoluta
1 — 3	200
3 — 5	400
5 — 7	200
7 — 9	200

Supondo o salário-mínimo igual a R$1.400,00, a média dos salários, é igual a

(A) R$6.720,00

(B) R$6.300,00

(C) R$6.440,00

(D) R$5.880,00

(E) R$7.000,00

92 Q2386376 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** IBFC **Órgão:** TRF - 5ª REGIÃO **Provas:** IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Desenvolvimento de Sistemas da Informação ...

Com base nos dados apresentados na Tabela 1 – Distribuição das idades (em anos) dos sócios do Clube Juvenil de Recreação e Bem-Estar, assinale a alternativa incorreta.

Idade (em anos)	Número de Sócios
10 ⊢ 12	92
12 ⊢ 14	107
14 ⊢ 16	231
16 ⊢ 18	189
Total	619

Tabela 1 – Distribuição das idades (em anos) dos sócios do Clube Juvenil de Recreação e Bem-Estar.

(A) Um jovem com 12 anos completos é alocado na primeira classe, 10 ⊢ 12

(B) A mediana assume um valor dentro da terceira classe, 14 ⊢ 16

(C) Por ser a classe de maior frequência, a terceira classe, 14 ⊢ 16, contém o valor da moda

(D) A idade média pode ser calculada usando o ponto médio de cada classe, uma vez que não temos a informação dos valores observados

93 Q2353393 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** DPE-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística

Em estatística descritiva, as medidas de forma visam descrever características adicionais sobre as distribuições dos dados, complementando os aspectos representados pelas medidas de posição e de variabilidade. A assimetria e a curtose são exemplos de medidas descritivas de forma. De acordo com o exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Em distribuições unimodais, observa-se a simetria quando média = mediana = moda.

(B) As distribuições mesocúrticas possuem o mesmo grau de achatamento da distribuição normal.

(C) Em distribuições unimodais, observa-se a assimetria à esquerda quando média > mediana > moda.

(D) As distribuições leptocúrticas possuem um grau de achatamento menor que o da distribuição normal.

94 Q2359181 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-BR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CAU-BR - Analista de Geotecnologia

X	frequência absoluta acumulada
0	5
1	15
2	30
3	45
4	55
5	60

Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa *X* - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por *n* observações, julgue o seguinte item.

A variável *X* se distribui em torno da sua média de forma assimétrica.

◯ Certo

◯ Errado

95 Q2359182 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-BR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CAU-BR - Analista de Geotecnologia

X	frequência absoluta acumulada
0	5
1	15
2	30
3	45
4	55
5	60

Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa X - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por n observações, julgue o seguinte item.

A amostra aleatória simples em questão é constituída por 210 observações.

◯ Certo

◯ Errado

96 Q2459191 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** Fundação CETREDE **Órgão:** Prefeitura de Caucaia - CE **Prova:** Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Estatísitco

Uma distribuição de frequência é uma série estatística na qual os dados estão organizados em grupos de classes ou categorias estabelecidas convenientemente. É INCORRETA a afirmação.

(A) A soma das frequências absolutas é sempre igual a 1.

(B) A frequência acumulada percentual da última classe é igual a 100.

(C) A frequência relativa é dada pela razão entre a frequência absoluta de cada classe e a frequência total ou soma das frequências absolutas.

(D) A utilização da frequência relativa facilita as comparações entre mais de um conjunto de dados com diferentes números de elementos.

(E) A frequência acumulada é a soma da frequência absoluta da classe em questão com as frequências absolutas das classes anteriores, sendo a frequência acumulada da última classe igual ao número total de observações.

97 Q2332922 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Esquema de Cinco Números e Boxplot Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Em relação à variável representada no diagrama ramo-e-folhas abaixo (Diagrama 1), <u>não</u> podemos afirmar que:

3	5 8
4	1 3 5
5	1 3 6
6	3 3 4
7	2 4 5 6 6
8	2 2 2 3 4 5
9	1 1 3 5 7 8 9 9
10	3 4 6 6 8 9
11	4 5 6 7 7 8
12	2 5 8
13	4 4 7
14	5 5
15	3

Diagrama 1

(A) A maior parte dos valores se distribui entre 72 e 118

(B) O valor da média dos dados deve assumir um valor menor que 60

(C) Valores menores que 40 e maiores que 150 são pouco observados

(D) A ramo com maior incidência é o ramo 9

(E) Os dados revelam uma distribuição com tendência à simetria

98 Q2332929

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

O diagrama de Pareto abaixo (Gráfico 1) mostra quais os tipos de defeitos observados nas peças produzidas por uma confecção.




Gráfico 1 **Em relação a ele, assinale a alternativa <u>incorreta</u>.**

Ⓐ A área com melhor desempenho é a de acabamento

Ⓑ Matéria-prima e costura têm desempenho semelhante em relação à quantidade de defeitos produzidos

Ⓒ A área que mais se destaca é a de defeitos por molde

Ⓓ A área que deve ter correção mais imediata é a de corte

Ⓔ A área que deve ter correção mais imediata é a de molde

---

99 Q2341815

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

São exemplos de medidas resumo de posição, dispersão e assimetria, respectivamente

Ⓐ média, variância e coeficiente de assimetria de Pearson.

Ⓑ média, moda e coeficiente de assimetria de Sturges.

Ⓒ mediana, moda e coeficiente de assimetria de Pearson.

Ⓓ mediana, variância e coeficiente de assimetria de Sturges.

---

100 Q2341818

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

O teste de postos com sinal de Wilcoxon é um teste não paramétrico utilizado para comparar

Ⓐ duas amostras independentes.

Ⓑ três ou mais amostras independentes.

Ⓒ duas amostras pareadas ou relacionadas.

Ⓓ três ou mais amostras pareadas ou relacionadas.

Respostas

81: **B** 82: **E** 83: **E** 84: **C** 85: **E** 86: **E** 87: **B** 88: **A** 89: **A** 90: **D** 91: **A** 92: **A**

93: **C** 94: **E** 95: **E** 96: **A** 97: **B** 98: **D** 99: **A** 100: **C**