1 Q4305417 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** PREVCOM **Prova:** VUNESP - 2026 - PREVCOM - Analista de Tecnologia

A análise quantitativa busca extrair informações a partir da aplicação de métodos matemáticos e estatísticos aos dados.
Um exemplo de dado quantitativo é

(A) a categoria do produto.
(B) o endereço do cliente.
(C) o estado civil do funcionário.
(D) o sobrenome do usuário.
(E) o tempo de permanência no estabelecimento.

2 Q4305421 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** PREVCOM **Prova:** VUNESP - 2026 - PREVCOM - Analista de Tecnologia

Variáveis quantitativas e qualitativas apresentam características distintas, o que influencia os recursos gráficos utilizados para sua visualização.
Um gráfico adequado para analisar variáveis qualitativas é o

(A) Diagrama de Dispersão.
(B) Gráfico de Barras.
(C) Gráfico de Linhas.
(D) Histograma.
(E) Polígono de Frequência.

3 Q4307204 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** IF SUL - MG **Órgão:** IF Sul - MG **Prova:** IF SUL - MG - 2026 - IF Sul - MG - Professor EBTT - MCH-6 - Matemática

Um Instituto Federal analisou o tempo de serviço de 200 professores. A distribuição dos profissionais segundo o tempo de atuação na instituição está representada na tabela a seguir:

Distribuição dos professores segundo o tempo de serviço

Tempo de serviço no Instituto Federal (anos)	Quantidade de professores
Até 5	24
Mais de 5 até 10	68
Mais de 10 até 15	57
Mais de 15 até 20	25
Mais de 20 até 25	14
Mais de 25	12
Total	**200**

A análise dos dados individuais indicou que a média do tempo de serviço foi superior à mediana. Considerando essa informação em conjunto com a distribuição de frequências apresentada, assinale a alternativa correta.

Ⓐ A concentração de professores nos menores tempos de serviço, associada à média superior à mediana, é compatível com uma distribuição assimétrica à direita.

Ⓑ A distribuição é compatível com assimetria à esquerda, pois a concentração nos menores tempos de serviço forma uma cauda em direção aos valores mais baixos.

Ⓒ A distribuição pode ser considerada aproximadamente simétrica, pois as frequências se distribuem de maneira equilibrada em torno dos intervalos centrais.

Ⓓ A distribuição é compatível com assimetria à direita, sendo a mediana mais influenciada pelos tempos de serviço elevados do que a média.

Ⓔ A distribuição é compatível com assimetria à esquerda, pois a mediana tende a ser inferior à média quando existem valores elevados.

4 Q4308115

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** PREVCOM **Prova:** VUNESP - 2026 - PREVCOM - Analista de Investimentos

A média aritmética de um conjunto de dados corresponde a 8,327, a mediana a 8,510, e o desvio padrão a 0,571. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta desses dados.

(A) O conjunto de dados é homogêneo e com baixa dispersão, onde a maioria dos valores é alta e fica acima de 8,327.

(B) O conjunto de dados é heterogêneo e apresenta alta dispersão, o que invalida o uso da média aritmética e da mediana para qualquer análise preditiva.

(C) A distribuição dos dados possui assimetria positiva (à direita), indicando que a maior parte dos valores medidos está concentrada abaixo da média de 8,327.

(D) O conjunto de dados é perfeitamente simétrico e segue uma distribuição normal exata, já que a diferença entre a média e a mediana é matematicamente irrelevante.

(E) A dispersão dos dados é extremamente alta porque o desvio padrão ultrapassa o limite aceitável de 5% do valor da mediana, tornando a amostra inconsistente.

---

5 Q4321324

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FEPESE **Órgão:** SAPE - SC **Prova:** FEPESE - 2026 - SAPE - SC - Analista Técnico Administrativo II

A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados. Na gestão pública, pode ser utilizada nos processos de planejamento e gestão de projetos e políticas públicas.
Analise as afirmativas abaixo sobre a estatística descritiva. 1. Variáveis contínuas só podem tomar valores inteiros. 2. Os histogramas são gráficos utilizados para representar tabelas intervalares. 3. Mediana é o valor que surge com mais frequência, se os dados são discretos, ou, ainda, o intervalo de classe com maior frequência, se os dados são contínuos. 4. A média é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados. 5. Quando a distribuição é simétrica, a média e a mediana coincidem. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

(A) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.

(B) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

(C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

(D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

(E) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

---

6 Q4220337

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose Cálculo de Probabilidades , Momentos e Função geratriz de momentos de uma variável aleatória

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Considere três variáveis aleatórias reais, *X, Y* e *Z*, para as quais são conhecidos os seguintes momentos populacionais: 1. Variável aleatória *X*:
• 1º Momento Ordinário igual a 5; • 2º Momento Ordinário igual a 1; • 3º Momento Central igual a 2. 2. Variável aleatória *Y*:
• 1º Momento Ordinário igual a 2; • 2º Momento Ordinário igual a 7; • 3º Momento Central igual a 0. 3. Variável aleatória *Z*:
• 1º Momento Ordinário igual a 3; • 2º Momento Ordinário igual a 9; • 1º Momento Central igual a 0. Com base exclusivamente nessas informações, assinale a afirmativa correta.

(A) A variância de *Y* é igual a 5.

(B) A distribuição de *Y* é necessariamente normal.

(C) A distribuição de *X* é necessariamente simétrica.

(D) Os dados fornecidos para *X* e *Z* são inconsistentes.

(E) As realizações da variável aleatória *Z* são, quase certamente, maiores ou iguais a zero.

7 Q4226029

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2026 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Santa Filomena - PE **Provas:** IDHTEC - 2026 - Prefeitura de Santa Filomena - PE - Assistente Social •••

A epidemiologia tem sido usada como ferramenta fundamental no planejamento de políticas públicas de saúde, na alocação de recursos e nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde na população brasileira. As Variáveis é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Como o nome diz, seus valores variam de elemento para elemento. Elas podem ser quantitativas e qualitativas. É um exemplo de Quantitativa discreta:

(A) Número de cômodos de uma residência;

(B) Peso corporal (em quilogramas)

(C) distância da casa até a construção do córrego (em metros);

(D) Tempo de moradia no assentamento (1 –Menos de 1 ano; 2 – De 1 ano a 4 anos; 3 – Mais de 5 anos) etc.;

(E) Destino do esgoto da casa (privada; fossa séptica com sumidouro; fossa séptica; fossa negra).

8 Q4233111 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Polícia Penal - RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - Polícia Penal - RS - Analista da Polícia Penal - Estatística

A gestão de uma unidade pública analisou o número diário de atendimentos realizados durante 50 dias. Os dados foram organizados conforme a seguinte distribuição de frequências:

Número diário de atendimentos	Frequência
10 a 14	4
15 a 19	8
20 a 24	14
25 a 29	12
30 a 34	7
35 a 39	5

Considerando os dados agrupados em classes, assinale a alternativa que apresenta corretamente a média, a mediana, a moda e o tipo de assimetria da distribuição.

(A) Média = 24,50; mediana ≈ 24,14; moda ≈ 23,25; assimetria positiva.

(B) Média = 24,14; mediana = 24,50; moda ≈ 23,25; assimetria negativa.

(C) Média = 23,25; mediana ≈ 24,14; moda = 24,50; assimetria positiva.

(D) Média = 24,50; mediana ≈ 23,25; moda ≈ 24,14; assimetria negativa.

(E) Média = 25,00; mediana ≈ 24,50; moda ≈ 24,14; distribuição simétrica.

9 Q4260710 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2026 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de Brusque - SC **Prova:** FEPESE - 2026 - Prefeitura de Brusque - SC - Economista

É uma variável estatística que assume valores numéricos, geralmente inteiros, correspondentes a contagens, formando um conjunto finito ou enumerável de possibilidades (*Guedes et al*.). Essa definição corresponde à variável:

(A) quantitativa contínua.

(B) qualitativa ordinal.

(C) qualitativa nominal.

(D) quantitativa amostral.

(E) quantitativa discreta.

10 Q4186527 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Estatístico

Um pesquisador da gestão pública analisou a distribuição salarial de servidores de um órgão federal: média = 50 mil, mediana = 45 mil, moda = 40 mil. Em relação ao comportamento dessa distribuição, julgue os itens a seguir:

I. A relação média > mediana > moda indica assimetria positiva (à direita), ou seja, a cauda da distribuição se alonga para valores mais altos, puxando a média para cima.

II. Em uma distribuição assimétrica positiva, a média é maior que a mediana, que por sua vez é maior que a moda. O fato de haver poucos salários muito elevados influencia a média mais do que a mediana.

III. Se a distribuição fosse simétrica, esperaríamos média = mediana = moda (aproximadamente). No caso apresentado, a diferença indica assimetria à direita.

IV. A curtose da distribuição pode ser avaliada pela comparação entre média e mediana; como a média é maior que a mediana, a distribuição é leptocúrtica (caudas pesadas).

V. Em uma distribuição com assimetria positiva, a mediana é geralmente a medida de tendência central mais robusta para representar o salário típico, pois não é puxada pelos valores extremos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (V/F):

(A) V – V – V – F – V
(B) V – F – V – V – F
(C) F – V – V – F – V
(D) F – F – V – V – F
(E) V – V – F – F – V

---

11 Q4186538 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Estatístico

Em um estudo sobre a qualidade de vida em grandes centros urbanos, foram coletadas as seguintes informações de uma amostra de 1.000 indivíduos:

I. Nível de escolaridade (Fundamental, Médio, Superior, Pós-graduação).

II. Renda mensal (em salários-mínimos).

III. Número de filhos.

IV. Satisfação com o transporte público (Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Neutro, Satisfeito, Muito Satisfeito).

Assinale a alternativa que classifica corretamente os tipos de variáveis apresentadas.

(A) I: Qualitativa Nominal; II: Quantitativa Contínua; III: Quantitativa Discreta; IV: Qualitativa Ordinal.
(B) I: Qualitativa Ordinal; II: Quantitativa Discreta; III: Quantitativa Contínua; IV: Qualitativa Nominal.
(C) I: Qualitativa Nominal; II: Quantitativa Discreta; III: Quantitativa Contínua; IV: Qualitativa Nominal.
(D) I: Qualitativa Ordinal; II: Quantitativa Contínua; III: Quantitativa Discreta; IV: Qualitativa Ordinal.
(E) I: Qualitativa Discreta; II: Quantitativa Contínua; III: Qualitativa Ordinal; IV: Quantitativa Discreta.

---

12 Q4092515 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2026 **Banca:** IDECAN **Órgão:** PROCON-RJ **Prova:** IDECAN - 2026 - PROCON-RJ - Agente Administrativo

Em um levantamento realizado pelo setor de pessoal de uma instituição pública, foram coletadas as seguintes informações dos servidores: estado civil, grau de instrução, número de dependentes, salário mensal e idade.
Tendo por base o exposto, marque a alternativa que apresenta apenas variáveis classificadas como quantitativas.

(A) Estado civil, grau de instrução e idade.

(B) Estado civil, número de dependentes e salário mensal.

(C) Grau de instrução, estado civil e salário mensal.

(D) Número de dependentes, salário mensal e idade.

(E) Idade, grau de instrução e estado civil.

---

13 Q3888973 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Assimetria elevada frequentemente indica a presença de valores extremos, que impactam a forma da distribuição.

◯ Certo

◯ Errado

---

14 Q3888974 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Assimetria igual a zero não implica, necessariamente, uma distribuição totalmente simétrica.

◯ Certo

◯ Errado

---

15 Q3888975 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Distribuições com assimetria à esquerda geralmente apresentam média menor que a mediana.

◯ Certo

◯ Errado

---

16 Q3888976 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Assimetria negativa indica que a distribuição possui maior concentração de valores à esquerda e uma cauda mais longa que se estende para a direita.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

17 Q3888978 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Com base no referencial teórico das medidas descritivas de curtose, julgue o item subsequente.

Curtose alta indica apenas um pico mais elevado, não estando relacionada às caudas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

18 Q3888988 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Considerando que a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua *X* seja dada por

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot x^6, & \text{se } |x| \leq 1, \\ 0, & \text{se } |x| > 1, \end{cases}$$

em que *C* é a constante normalizadora,

julgue o item a seguir.

X possui assimetria nula.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

19 Q4130264 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Covariância, Correlação

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** HCFMUSP **Prova:** VUNESP - 2025 - HCFMUSP - Residência Multiprofissional - Psicologia

Um pesquisador deseja investigar a relação entre horas de estudo semanal e notas em uma disciplina universitária. Após coletar os dados de 50 estudantes, ele utiliza o coeficiente de correlação de Pearson (r) para analisar a associação entre essas duas variáveis. Nessa situação, é correto afirmar que

(A) o coeficiente de Pearson medirá o grau em que uma das variáveis investigadas determinará a outra.

(B) valores próximos de +1 indicam que quanto menos o aluno estuda, maior a probabilidade de que tenha boas notas na disciplina.

(C) o valor de r indicará tanto a força quanto a direção da relação linear entre as duas variáveis quantitativas.

(D) o uso do coeficiente de Pearson é inadequado, porque ele só pode ser aplicado a variáveis qualitativas nominais.


(E) a expectativa do pesquisador é de que o r de Pearson seja igual a zero, indicando ausência de causalidade entre as variáveis estudadas.

---

20 Q3586050 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Em um estudo estatístico sobre o tempo médio de tramitação de processos judiciais em quatro varas cíveis de certo tribunal, considerou-se uma base de dados referentes ao tempo (em dias) de tramitação de 1.200 processos. A amostra foi estratificada por vara, e os dados foram tratados e analisados por meio de gráficos, tabelas e medidas descritivas, com o objetivo de identificar padrões, desvios e oportunidades de melhoria na gestão processual. A seguir, são apresentados diagramas *boxplots* elaborados para cada vara, bem como as medidas de tendência central, dispersão e curtose.



medida	vara A	vara B	vara C	vara D
média	50	44	64	64
mediana	50	40,5	68	60
desvio padrão	12	13,5	14,5	18,5
curtose	−1,2	2,0	1,7	16,0

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A curtose negativa observada na vara A indica que a distribuição dos tempos de tramitação nessa vara é menos achatada do que uma distribuição normal, apresentando maior concentração em torno da média.

◯ Certo

◯ Errado

Respostas

1: **E** 2: **B** 3: **A** 4: **A** 5: **A** 6: **E** 7: **A** 8: **A** 9: **E** 10: **A** 11: **D** 12: **D** 13: **C**

14: **C** 15: **C** 16: **E** 17: **E** 18: **C** 19: **C** 20: **E**