
21 Q3586051 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Em um estudo estatístico sobre o tempo médio de tramitação de processos judiciais em quatro varas cíveis de certo tribunal, considerou-se uma base de dados referentes ao tempo (em dias) de tramitação de 1.200 processos. A amostra foi estratificada por vara, e os dados foram tratados e analisados por meio de gráficos, tabelas e medidas descritivas, com o objetivo de identificar padrões, desvios e oportunidades de melhoria na gestão processual. A seguir, são apresentados diagramas *boxplots* elaborados para cada vara, bem como as medidas de tendência central, dispersão e curtose.




| medida | vara A | vara B | vara C | vara D |
|---|---|---|---|---|
| média | 50 | 44 | 64 | 64 |
| mediana | 50 | 40,5 | 68 | 60 |
| desvio padrão | 12 | 13,5 | 14,5 | 18,5 |
| curtose | −1,2 | 2,0 | 1,7 | 16,0 |

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Na vara B, o fato de a média ser superior à mediana, associado à curtose positiva, sugere que a distribuição dos tempos de tramitação possui cauda mais pesada à sua esquerda.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

22 Q3586053 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Apesar de apresentarem médias iguais, as varas C e D diferem quanto à forma da distribuição: a curtose bastante elevada na vara D reflete a presença de pontos exteriores indicados no seu diagrama *boxplot*.


◯ Certo

◯ Errado

23 Q3417023 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SUSEP **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - SUSEP - Analista Técnico: - Área: Contabilidade Pública •••

Para organizar relatórios estatísticos acerca do comportamento de sinistros de determinado ramo de seguros, um consultor analisou uma base de dados com os valores de 100 indenizações pagas por uma seguradora no último ano, cujo histograma é representado a seguir.




Considerando que, no histograma apresentado, os dados estão agrupados em intervalos de classe, julgue o item que se segue, a respeito da distribuição das indenizações pagas.

O histograma apresenta uma distribuição com assimetria negativa, já que há maior concentração de valores à esquerda da mediana dessa distribuição.

◯ Certo

◯ Errado

24 Q3257208 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BDMG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - BDMG - Analista de Desenvolvimento - Gestão, Finanças e Controladoria ...

Acerca de ciência de dados, análise exploratória de dados, ferramentas de *data science* e utilização de bibliotecas e ferramentas, julgue o item seguinte.
Variáveis quantitativas contínuas podem assumir qualquer valor numérico, mesmo que ele não corresponda a um número inteiro.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

25 Q3257209 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BDMG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - BDMG - Analista de Desenvolvimento - Gestão, Finanças e Controladoria ...

Acerca de ciência de dados, análise exploratória de dados, ferramentas de *data science* e utilização de bibliotecas e ferramentas, julgue o item seguinte.
Valores *outliers*, isto é, inválidos para a amostra, como um valor textual em vez de um valor que deveria ser numérico, devem ser identificados na etapa de preparação de dados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

26 Q3257742 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Em relação a tipos de variáveis e seus níveis de mensuração, julgue o item a seguir.

Para dados de uma variável expressa em escala de razão, podem ser aplicadas somente algumas estatísticas descritivas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

27 Q3257743 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Em relação a tipos de variáveis e seus níveis de mensuração, julgue o item a seguir.

A variável dicotômica é um tipo de variável qualitativa à qual podem ser atribuídos valores numéricos.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

28 Q3257744 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Em relação a tipos de variáveis e seus níveis de mensuração, julgue o item a seguir.

Suponha que, em uma pesquisa realizada para verificar a aceitação de um produto, o respondente deva marcar a faixa salarial de usuários à qual ele pertence. Nessa situação, esse tipo de variável deve ser classificado como métrica.

◯ Certo

◯ Errado

29 Q3257745 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Em relação a tipos de variáveis e seus níveis de mensuração, julgue o item a seguir.

Uma variável qualitativa expressa por três categorias pode ser representada por uma variável *dummy.*

◯ Certo

◯ Errado

30 Q3262712 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** SELECON **Órgão:** HEMOMINAS **Prova:** SELECON - 2025 - HEMOMINAS - Analista de Hematologia e Hemoterapia - MEDHH - Nível III - Grau A - Médico Patologista

Em análises laboratoriais, os pesquisadores frequentemente lidam com dados que não seguem uma distribuição normal, sendo muitas vezes assimétricos. A medida de tendência central mais adequada para representar dados laboratoriais altamente assimétricos é:

Ⓐ média

Ⓑ moda

Ⓒ mediana

Ⓓ desvio padrão

31 Q3281646 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** FCC **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Prova:** FCC - 2025 - Prefeitura de São Paulo - SP - Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Tecnologia da Informação e Comunicação

Um Analista de TI da prefeitura está avaliando os seguintes dados referentes às consultas realizadas nos postos de saúde do município ao longo de um ano:
- Média: 350 consultas por mês - Mediana: 300 consultas por mês - Desvio padrão: 80 consultas - Coeficiente de variação (CV): 22,86% Com base nesses valores,

(A) o coeficiente de variação indica que os dados possuem altíssima variabilidade em relação à média.

(B) a mediana maior que a média indica uma distribuição assimétrica negativa (cauda longa à esquerda).

(C) o desvio padrão sozinho é suficiente para interpretar de forma completa a dispersão dos dados em relação à média.

(D) o coeficiente de variação sugere que a variabilidade dos dados é baixa em relação à média.

(E) a diferença entre a média e a mediana é irrelevante na análise exploratória de dados.

---

32 Q3284659 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Agricultura e Climatologia ...

Acerca das técnicas de análise estatística, julgue o item a seguir.

O erro percentual absoluto médio é a métrica que mais penaliza *outliers*.

◯ Certo

◯ Errado

---

33 Q3287017 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista – Área: Gestão da Informação – Subárea: Engenharia de Dados

Acerca de conceitos de estatística descritiva e de inferência estatística, julgue o item a seguir.

Em uma distribuição com cauda à direita, a maior parte dos valores se concentra à esquerda do gráfico, enquanto valores maiores e mais raros se estendem à direita.

◯ Certo

◯ Errado

---

34 Q3206652 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos

Supondo que os valores 105, 115, 98, 102 e 110 constituam uma amostra aleatória de preços diários, em reais, de determinado título financeiro oferecido por uma instituição financeira, julgue o item a seguir.

A estimativa do erro padrão da média amostral foi inferior a 6.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

35 Q3217332 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANM **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - ANM - Especialista em Recursos Minerais - Especialidade: Qualquer Área de Formação (Fiscalização e Distribuição de Receita)

Uma empresa de mineração de ferro está analisando os dados coletados durante suas operações para melhorar os processos de extração e beneficiamento. O conjunto de dados inclui as seguintes variáveis:

• teor_de_ferro: percentual de ferro presente em amostras do minério.

• toneladas_extraidas: quantidade de minério extraída por turno.

Durante o estudo, foi utilizada a técnica de categorização de dados e, mais especificamente, a discretização de dados. Além disso, os conjuntos de dados presentes nas tabelas 22A6-I e 22A6-II, a seguir, serão utilizados como input de algoritmos de aprendizagem de máquina. Na tabela 22A6-I, as variáveis quantidade de minério e profundidade são dadas em toneladas e em metros, respectivamente, e, na tabela 22A6-II, as variáveis temperatura e precipitação são dadas em graus Celsius e em milímetros, respectivamente.

**Tabela 22A6-I**

| mina | quantidade de minério | profundidade |
|---|---|---|
| A | 1.500 | 200 |
| B | 4.000 | 350 |
| C | 2.800 | 500 |
| D | 3.600 | 300 |
| E | 1.200 | 150 |
| F | 10.000 | 100 |
| G | 10.000 | 100 |
| H | 10.000 | 100 |

**Tabela 22A6-II**

| dia | temperatura | precipitação |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 |
| 2 | 22 | 12 |
| 3 | 21 | 8 |
| 4 | 19 | 6 |
| 5 | 23 | 5 |

A partir da situação hipotética precedente, julgue o próximo item.

Para a variável *teor_de_ferro,* a discretização baseada em intervalos é adequada para classificá-la em categorias como *baixo, médio* e *alto*, utilizando faixas predefinidas de percentual de ferro.

◯ Certo

◯ Errado

36 Q3150495 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Na análise de dados, a curtose é definida para medir:

Ⓐ a dispersão dos dados em torno da média, sendo mais sensível a outliers do que a variância.

Ⓑ o grau de achatamento ou pico de uma distribuição, ajudando a identificar caudas pesadas.

Ⓒ a assimetria da distribuição dos dados em torno da mediana.

Ⓓ a relação entre os quartis superior e inferior de um conjunto de dados.

37 Q3150503 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

O coeficiente de assimetria é uma medida importante em Estatística Descritiva. Dentre as opções a seguir, qual melhor representa como ele é calculado e o seu significado?

(A) O coeficiente de assimetria é calculado como a razão entre o desvio padrão e a média, representando a dispersão dos dados em torno da média.

(B) O coeficiente de assimetria é calculado utilizando a terceira potência das diferenças entre os valores e a média, dividido pelo desvio padrão ao cubo, e indica a simetria ou assimetria da distribuição dos dados em relação à média.

(C) O coeficiente de assimetria é calculado como a média dividida pela variância, representando a uniformidade dos dados.

(D) O coeficiente de assimetria é calculado usando a mediana e a moda dos dados, e representa o grau de achatamento da distribuição.

38 Q3154554 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PI **Provas:** FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e Segurança (Manhã) ...

Um analista do Tribunal de Contas realizou um estudo para tentar prever o gasto com passagens áreas com os servidores do tribunal.
Nesse estudo, ele levou em consideração as seguintes variáveis: 1. A distância entre o local de origem e o local de destino. 2. Se o servidor é de nível médio ou superior. 3. Se o servidor tem direito a bagagem ou não. Essas variáveis são dos seguintes tipos, respectivamente:

(A) Quantitativa contínua, qualitativa ordinal e qualitativa nominal.

(B) Quantitativa discreta, qualitativa nominal e qualitativa ordinal.

(C) Quantitativa contínua, qualitativa ordinal e quantitativa discreta.

(D) Quantitativa discreta, qualitativa nominal e qualitativa nominal.

(E) Quantitativa contínua, qualitativa nominal, qualitativa nominal.

39 Q3162148 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

**Ano:** 2025 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2025 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação / Área: Ciência de Dados

Termos como variáveis numéricas, categóricas, binárias, contínuas e discretas são comumente usados para diferenciar os tipos de dados. Em relação às variáveis qualitativas, qual das opções abaixo apresenta um exemplo de variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal, respectivamente?

(A) Altura e peso.

(B) Cor dos olhos e número de filhos.

(C) Tipo de veículo e nível de escolaridade.

(D) Cor do cabelo e temperatura (em graus Celsius).